




P  
C  
M  
E  
D  
I  
A  
M  
E

TOM - I



11106











11106

11106 1106  
PHARMACO-  
LOGIA, 11106

SEU  
MANUDUCTIO

AD  
MATERIAM MEDICAM,

IN QUA

*Medicamenta Officinalia Simplicia,*

HOCEST

Mineralia, Vegetabilia, Animalia  
earumque partes in Medicina Officinis  
usitata, in Methodum naturalem digesta  
succinctè & accuratè describuntur.

CUM

*Notis generum Characteristicis, Specierum  
Synonymis, differentiis & viribus.*

Opus omnibus Medicis, Philosophis,  
Pharmacopœis, Chirurgis, & Phar-  
macopolis utilissimum.

a  
SAMUELE DALE.

Hippocrat. Lib. 1. Aphor. 1.

ο βίος βεαχὺς ἢ δε τέχνη μακρή.

Editio in Germania secunda.

Cum Supplemento ipsius Autoris.

BREMÆ,

Apud PHIL. GODOFR. SAURMAN.  
M. DCC. XII.





Collection of 11 mass 1879

CELEBERRIMO  
COLLEGIO REGALI

*Medicorum Londinensium,*

HÆC,

NATURÆ SPOLIA

ET

ARTIS ORGANA,

CONSECRAT

Devotissimus AUTOR.

---

P R Æ F A T I O.

**S**cientia *Materiae Medicæ* est Res maximi momenti, tam Medicis quàm Pharmacopolis & Chirurgis, sine quâ quanti errores, quantæ strages; Quis enim medicamenta *Ægrotantibus* præscribere, propinare, & administrare valet, spe obtinendi beneficia iis adscripta ab *Antiquis*, si penitus rudis, & ignarus sit, vel in dubio hæreat, an sint ipsa, quæ nobis tradita sunt. Non fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum quid *Natura* faciat aut ferat, morente *Oraculo* illo *Verulamio* Nostro; Quod si à *Sæculis* *Hippocratis*, *Theophrasti*, *Dioscoridis*, *Galen*i, *Aliorumque Artis Medicæ* Principum, per cuncta postera hoc observatum



## P R Æ F A T I O.

tum fuisset, *Materia Medica* nobis incorrupta & perspicua mansisset, omni Mercatorum fraude, & Negotiatorum mysteriis purgata, & sine controversiâ facilis, & luculenta; sed pro dolor, tantus stupor & ignavia *Reipublicam medicam* hodiè opprimit, ut quamplurimi mallent otiosè errare, & eruditè necare (periculosis imposturis avidorum Mercatorum, Pharmacopolarum, Sepiasiariorum, Anicularum, aliorumque ejusdem farinae Veneficorum, nimis fidendo, & indulgendo) quàm elaborare, examinare, & distinctè addiscere ipsa *Simplicia Medicamenta* quotidiani Usus; disertè scribit *Galenus*, Lib. I. de Antidot. Cap. 15. Medicus omnium (inquit) Stirpium, Fossilium, & Animalium peritiam habeat, consulo; sin minus, plurimorum saltem, quibus frequenter utimur, & *Aristoteles* haud ineleganter; Prima laus est humanæ Sapientiæ, valdè similis posse distinguere. Magnus ille *Medicinæ Parens*, Sapientissimus *Hippocrates* ubique ferè inculcat, Medicum Rerum Naturalium peritum esse debere. Aspera sane censura quamplurimorum apud nos hodiè Medicantium.

*Hæc mihi stimulum & ansam dederunt investigandi, inspicendi & cognoscendi Simplicia Medicamenta, Libros Botanicos, & Scriptores naturales pervolvendo, Res ipsas colligendo, examinandoque, summâ quâ potui diligentia. Primò initiatus sub Auspiciis Excellentissimi Viri, & Republicæ Philosophicæ Principis Dignissimi, Johannis Raii, progressus feci, & militavi non sine fructu; Testes sint Elucubrationes meæ Botanicae Anglicè scriptæ, & lucem, favente Numine, aliquando visuræ;*



## P R Æ F A T I O.

*visura; taceo opusculum hoc leviusculum, & impolitum, sed Tyronibus haud inutile.*

*De Divisione, & Methodo hujus Libelli alibi descriui. Quoad finem, hoc mihi negotii credidi solum dari, Populo ut inservirent quas fecissem Tabulas; nam pro Deum atque Hominum fidem! Quanti Lusus de Corio humano! Quanti lethales Ictus, ab imperitis Blateronibus, & vaftris circulatoribus, qui nugis & strophis suum captant questum, Materiam Medicam nunquam prælibantes; Ignavum & sordidum Pecus.*

*De Ortu, & Progressu Simplicium Medicamentorum scribere, majoris molis est, quam Romanam condere gentem. Quædam Casu, quædam Instinctu, alia ab experienciâ effluxerunt; Multa ab Indis, Multa à Brutis derivamus; Barbari enim, & Fera commodissimas Res invenerunt, quæ Gentes humanissimas latuerant.*

*Restat solum ut grates persolvam debitas Amicis nostris, quorum operâ & consiliis usi fuimus in concinnandâ hæc Materie Medicæ Historiolâ. Hi sunt Viri Clarissimi, meum supereminentes Præconium, Johannes Raius, Vicinus & Amicus noster, de quo jure glorior. D. Tancred Robinson, M. D. D. Hans Sloan, M. D. D. Leonardus Plukenet, M. D. Hortorum Regionum Custos Oculatissimus. D. Martinus Lister, M. D. in Re Naturali Sagacissimus. D. Samuel Doody, Horti Botanici apud Chelseianos Præfectus meritissimus. Et D. Jacobus Newton. Sic orta est Fabrica nostra, rudis indigestaque Moles; Sublimioribus Ingeniis incudenda, formanda, poliendâ & perficienda. Tentamini & Cœptis aspirate, Lectores Benevoli.*

*Nominum*



*Nominum Abbreviatorum  
Dilucidatio.*

- A**ct. Philos. & Transact. Philos. Philosophica Regiæ Societatis Londinensis.  
**Agricol.** Agricola.  
**Aldrov.** Aldrovandus.  
**Amman.** Pauli Ammanni Manuductio ad Materiam Medicam.  
**Bellon.** Bellonius.  
**Boet.** Boetius de Boot.  
**Bonan.** Bonanni Recreatio Mentis & Oculi.  
**Bont.** Bontius  
**Breyn Cent.** Jacobi Breynii Centuria. *idem* Prodromus  
1. & 2. Prodromus primus & secundus ejusdem.  
**C. B.** Caspari Bauhini Pinax.  
**Cæs. & Cæsalp.** Andreas Cæsalpinus.  
**Cam.** Camerarius.  
**Clus.** Carolus Clusius.  
**Colum.** Fabius Columna.  
**Diosc.** Dioscorides.  
**Dod.** Dodonæus.  
**Ephem. German.** Ephemerides Germanicæ.  
**Flo. Lug Bat. Flo.** Floræ Lugduno - Batavæ Flores.  
**Gal.** Galen.  
**Ger. & Ger. emac.** Gerardi Historia emaculata.  
**Gesn.** Gesnerus.  
**H. M.** Hortus Malabaricus.  
**H. Ox.** Roberti Morisoni Historia Plantarum Oxoniensis.  
**Herm. Cat.** Horti Lugduno - Batavi Catalogus Pauli Hermanni.  
**Hoffman.** Casp. Hoffmannus.  
**J. B.** Joannis Bauhini Historia.  
**Jons.** Joannis Jonstoni Historia Animalium. *Jons. E*  
*ejusdem de Arboribus.*  
**List.** Martini Listeri Historia Animalium. *idem Icon*  
*& H. Conch.*

## Nominum Abbreviatorum Dilucidatio.

- Historia Conchyliorum ejusdem.  
*Marg. & Marck.* Marckgravius.  
*Matth.* Matthiolus in Dioscoridem.  
*Mer. P.* Merreti Pinax.  
*Mouf.* Mouffettus.  
*Munt.* Muntingius.  
*Offic.* Nomina usitata in Officinis denotat.  
*P. B.* Phytologia Britannica.  
*P. B. P.* Paradisi Lugduno-Batavi Prodrromus.  
*P. P.* Leonardi Plukeneti Phytographia.  
*Park.* Parkinsoni Theatrum Plantarum, *idem.* *Parad.* Paradisus ejusdem.  
*Plin.* Plinius.  
*Pis.* Gulielmi Pisonis Historia *idem.* *Mant. A.* Mantissa Aromatica ejusdem.  
*R. Cat.* Joannis Raii Catalogus Plantarum.  
— *H.* Historia Plantarum ejusdem.  
— *Meth.* Methodus Plantarum nova ejusdem.  
— *Ichth.* Francisci Willoughbei Ichthyologia, à Joanne Raio edita.  
— *Ornith.* Francisci Willoughbei Ornithologia, ejusdem.  
— *Synop. Animal & H. Animal.* Synopsis Animalium ejusdem.  
— *Synop.* Synopsis Plantarum ejusdem.  
*Rondel.* Rondeletius.  
*Salv.* Salvianus.  
*Scalig.* Scaliger.  
*Schrod.* Schroderus.  
*Turn.* Turnerus.  
*Usu.* In usu sunt.



*Hunc Librum (cui titulus est  
P H A R M A C O L O G I A)  
dignum censemus, ut typis  
mandetur.*

Thomas Burwell, *Propræses.*  
Samuel Collins.  
Edvardus Hulse.  
Richardus Morton.  
Joh. Bateman.

Datum 5. Septembris A. D. 1692.  
in Comitibus Censoriis ex ædibus  
Collegii Nostri,

# PHARMACO- LOGIÆ

SEU

## MANUDUCTIONIS

AD

Materiam MEDICAM

Prolegomena Hægogica.

### CAP. I.

**P**armacologia est descriptio rerum  
medicamentarium ad bene medi-  
candum; objectum est res natura-  
lis medicinalis quæcunque ad  
medicandum adaptabilis, siue fi-  
guram ea obtineat nativam, siue elaboratio-  
nem aliquam officinalem sustinuerit; verum  
enim verò; quia nomina plurima occurrunt,  
quæ vel minus vulgaria, vel æquivoca, operæ  
pretium duxi Pharmacopœias tyronibus syno-  
psi brevi inservire, & nomina alphabetica serie  
exhibere.



# Terminorum quorundam & vocum generaliorum Interpretatio & Explicatio brevis.

A.

**A** Cetum, in genere liquorem quemcunque acidum notare potest.

**Acinus**, non pro uvæ vinaceo apud idoneos auctores, sed pro uva ipsa seu fructu toto accipitur, qui ex succo, & ex ambiente cute seu folliculo constat. *Acinosa uva Bollbe richt. Columel. lib. II. cap. 2. Cum expresseris vinacea, quæ acinis celantur, eaq; jam infuscata, & propemodum nigra fuerint, &c. Extenditur & hoc nomen latius ad fructus minutiores arborum fruticumve spissius crescentes & coactius, ut Hedera, &c. & sic à bacca distinguitur, quæ rarius crescit, ut in Olea, Lauro, &c. Jun. Medici recentiores pro gigarto seu vinaceo accipiunt, cum dicunt uvæ exacinate.*

**Acus, eris**, purgamentum frumenti, palea. **Sprenu.** Porro *Acus* Plinio dicitur cum per se spica pinsitur; *Palea* verò ubi cum stipula teritur in area.

**Adeps**, generaliter tam Axungiam quam Sevum denotat, usitatiùs tamen pro Axungia usurpatur.

**Ala**, caulis est angulus, quem cum caule vel ramo vel folium, vel pediculus folii constituit, qui semper ferè acutus est, vel rectus saltem, quia

quia pediculi sursum nituntur. *Jung.* Non raro etiam accipitur pro ramulo, ut cum dicimus caule multis alis brachiato, vel in multas alas diviso, quia rami veluti totidem alæ cauli adnascuntur.

*Alabastra*, sunt folia illa viridia, herbacea quæ flores sepiunt. *Junius* exponit *alabastrum* Rosæ globum nondum explicitum totum, sed conniventem. *Rosen-Knobben.* In Mineralogiâ *Alabaster* lapis est.

*Alburnum*, *Plinio* dicitur exterior ligni pars mollior & teredini obnoxia, à colore albo. Das Weiße am Holz/zu nechst der Rinden.

*Alica* vel *Halica*, interdum accipitur pro certo frumenti genere: Vide *Plinium* lib. 18. cap. 7. & *Celsum* lib. 3. cap. 6. sed frequentius pro re factitia, quæ fiebat ex *Zea* quæ semen appellatur, cui admiscebatur creta, quæ transibat in corpus, coloremque ac teneritatem adferebat. *Graupen.* Hæc propria & genuina *Alica* res *Romana* à *Plinio* dicitur, apud quem lib. 18. cap. 11. modum conficiendi vide. Differt autem *Alica* latè sumpta à *Græcorum Chondro*, ut genus à specie; siquidem *Chondrus* non creta sed gypso & arena repurgaretur, quemadmodum altera *Zea* species memorata *Plinio*, adulterina cognominata, ex *Zea* in *Africa* degenerante confecta.

*Amylum*, dicebatur quod *χweis μύλας* sine mola pararetur: cujus conficiendi modum vide apud *C. Baubinum* in *Theatr.* lib. 1. Mace-



rabatur scilicet sæpius quotidie Triticum aut Siligo aquâ effusâ & affusâ, donec ita mollesceret ut cremor exprimi posset, qui deinde in Sole siccabatur, & hunc Amylum vocabant. Hujusmodi Amylum ex avena paratum apud Wallos in cibis æstimatur, & *LLummary* dicitur. G. *Krafftmehl*.

*Antheræ* Offic. sunt summitates seu cacuminula in florum medio staminibus incumbentia, q. *άνθ* & *ρόδ*, i. e. flos rosæ.

*Apices*, idem significant quod *Antheræ*.

*Arbor* [*Δένδρον*] est planta lignosa, crassitudine & altitudine inter omnes maxima, cui caudex pro superficie est perennis & naturâ simplex, qui in multos ramos majores, quos *αἰρέμονας* & *ὄζ* Græci vocant, & deinde in ramusculos complures, quos iidem *κλάδ*, Latini furculos appellant, dividitur. Ein Baum.

*Arilli* Offic. Vinacea, gigarta, q. aridula, quod sicci sint, & nullum succum præbeant.

*Arista*, Acus exilis ac longa è gluma extans. Die ganze åhr.

*Aroma*, est odoramentum quodvis, ut Caryophylli, Cinamomum, &c.

*Asparagus*, dicitur primum germen herbarum, quod edendo est, vel oleris cujusque turio antequam in folia explicetur, *ἀσπείρω*. Was zu erst von der Wurzel hervor kompt/ ehe dan es Laub gewinnet. Hinc per Antonomastian dicitur herba quædam, quæ grandes profert & edules asparagos. Spargen.

*Axungia*

*Axungia*, est pinguedo | Sevo mollior. *Schmeer/*  
*Schmalz.*

B.

*Bacca*, dicuntur qui sparsim arboribus fruticibus-  
que adnascuntur fructus parvi rotundi,  
*Beeren /* & sic ab *Acinis* distinguuntur; qui  
sunt racematim dependentes *baccæ*. Nos  
in hoc opere restrictiore, acceptione voce  
*Baccæ* utimur pro fructu minore pericarpio  
seu pulpa carneve molli & humida semina in-  
cludente, & membrana tenuiore tecto.

*Balaustum*, sylvestris mali *Punicæ* flos. Die  
*Blut eines wilden Granatapfels.*

*Balsamus* vel *Balsamum*, denotat genus quoddam  
odoriamenti crassiusculi instar unguenti.

*Bitumen*, est sebum aut resina *Macrocosmi*.

*Bulbus*, est radix subrotunda, vel pluribus tunicis in orbem se amplexantibus, vel pluribus squamis intricatim ferè dispositis coagmen-  
tata, fibras plurimas ex ima sede seu basi emittens. Interdum latius accipitur pro radice quavis uno tubere constante etiam solidâ & substantiâ continuâ, nec divisâ in squamas aut tunicarum involucria, fibras ex ima sede aut basi emittente. Sic *Croci* & *Colchici* radices bulbosæ censentur.

C.

*Cacumina*, sunt idem quod summitates.

*Cacuminula*, idem quod *Antheræ*.

*Calyx*, folliculus seu involucrium floris priusquam dehiscat, præcipuè *Rosæ*: interdum flos ipse *rosæ* connivens & nondum expan-



**fus.** At nunc frequentissimè accipitur pro folliculo, quo flos primùm, deinde semen herbarum & fructus arborum cooperitur. Worin die Blume / Saamen / oder Frucht / verborgen.

**Capillamenta,** sunt filamenta illa tenuia, in florum medietate surgentia, apicibus plerumque donata. Die Fäsen an den Blumen.

**Capita,** in Phytologia rotunda illa seminum receptacula, quæ capita referunt. In Zoologia quid sint notum est,

**Capitulum,** est quod constat ex pluribus floribus & staminibus arctè in globosam aut circularem sive disci figuram congestis, ut in *Cyano*, *Scabiosa*, *Carduis*, &c.

**Capitatae** plantæ, nobis in hoc opere dicuntur, quarum flores ex flosculis, etiam marginalibus, fistulosis componuntur, quoniam calyx eorum squamosus in ventrem plerumque extumescit grandiusculum & subrotundum; cujusmodi sunt *Carduus*, *Centaureum Majus*, *Bardana*, &c.

**Capreolus**, est pars quædam auxiliaris, filamenti aut funiculi æmulus, cincinni in modum contortus, quâ planta quævis vicinis stirpibus aliisve stipitibus se implicans, in altum enititur. Hujusmodi cernuntur in Vite & Leguminibus.

**Caro,** in Phytologia substantiam illam molliorem fructuum succulentorum notat, quam aliàs pulpam vocamus, ut pulpa seu caro *Cassia*; caro *Prunorum*, &c. *Schrod.* In Zoologia vox nota.

*Catulus*, apud recentiores Botanicos idem sonat quod *Julus* aut *nucamentum*, ut *catuli Salicis* aut *Juglandis*, id est *Juli*.

*Caudex*, idem est in arboribus & fruticibus, quod *caulis* in *Herbis*.

*Caulis*, est quod supra terram simplex assurgit, unde *folia frondésque* seu *ramusculi* emicant: vel, definiente *Jungio*, est pars herbæ *superna*, ita in altitudinem exprorecta: ut *anteriora à posterioribus*, vel *dextra à sinistris* non differant. In arboribus & fruticibus *caudex*, in frumentis *culmus* appellatur. Der Stengel.

*Cicus* & *cicum*, membrana tenuis acinos in *Malo Punico* discriminans. Hinc proverbialis locutio *Cicum non interdum*, id est, Non curo, perinde mihi est.

*Clavicula*, idem quod *Capreolus*.

*Come*, sunt plantarum summitates vel arborum frondes. Die Knospen.

*Conus*, in *Phytologia* dicitur fructus ex compactili lignosarum squamarum strue compositus, coni figuram æmulans, hoc est, à lata & circulari basi in mucronem desinens, qualis est *Pini*, *Abietis*, &c. Zirbel Nuß.

*Cor*, sive *corculum seminis*, est *portiuncula seminis* unde tum *radix*, tum *germen* enascitur. In *Zoologia* quid sit notum est.

*Cornua*, non nisi in *Zoologia* locum habent.

*Cortex*, exterior arboris quasi *crusta*, Die Rinde. Interior tunica ipsi ligno adhærens *Liber* dicitur.



citur. *Cortex* autem à *corium* & *tego*, quia quasi corium tegit, ut Isidorus ἐτυμολογίζει.

*Corymbus*, in genere significat quodvis summum. Nam prima notio τῶ κορύμβου est in capite Veterum Atticorum tutulus seu meta suggestus capillorum, autore Scaligero. Verum apud plantarum scriptores *Corymbo* propriè *Hederæ* racemi appellantur. Plin. lib. 16, cap. 34. in descriptione *Hederæ* ponit, *Racemis in orbem circumactis qui vocantur Corymbi*.

*Corymbi* nomen extendit Jungius ad significandam extremitatem caulis, ita subdivisam, & floribus aut fructibus onustam, ut sphærica figura inde oriatur, ut in *Cepa*, *Porro*, &c. Alii *Umbellæ* synonymum faciunt.

*Corymbus* etiam aliàs sumitur apud recentiores Botánicos pro flore composito discoide, qui in pappos non resolvitur: qualis in *Chrysanthemo*, *Bellide*, &c. cernitur: Nam hujusmodi flores in latum extensi umbellam seu corymbum quodammodo æmulantur.

*Croci* idem sunt quod apices. Est enim *Crocus* nihil aliud quàm apex croci herbæ floris stamini incumbens.

*Culmus*, frumenti (aut etiam Graminis) calamus à radice ad spicam. Der. Halm.

*Cyma*, α, & *Cyma atis*, q. κύημα, id est, partus novellus qui prima germinatione producit, est ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus, & dicitur præcipuè de *Brassica*; Verum & in genere *Cymæ* sunt cauliculi teneriores delicatiorésque scaporum, quos à  
prima

prima sectione præstant: imò Cymæ apud Botanicos adhuc latius sumuntur pro summatibus quarumcunque herbarum. Die Sprossen.

*Cytinus*, flos mali *Punicæ sativæ*. Die Blüt der Granatapffel.

D.

*Dactylus*, Palmula, caryotis, *Palmæ arboris* fructus, à digiti similitudine sic dictus. Datteln.

*Digitatum* folium nobis cum *Jungio* dicitur, in quo plures laciniaë seu plura simplicia folia quasi ad unum petioli punctum sive terminum aptata sunt, ut in *Pentaphyllo*, *Lupino*, *Cannabe*, *Vitice*, *Trifoliis*, *Fragaria*, &c.

*Discus*, est media pars floris compositi ex compressis & confertis flosculis, ita ut unam quasi apparentem superficiem constituent, ut in *Caltha*, *Flore Solis*, &c. à similitudine disci cujus figura plana erat ac rotunda, ut ex veteri statua apparet. Hinc Sol Græcis *Discus* appellatur. Erat autem *Discus* moles aliqua è plumbo aliòve metallo quam jacentes athletæ inter se decertabant.

E.

*Echinus*, asperum & spinosum *Castanæ* operculum, & in genere quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, sive tegmen, sive caput, sive cacumen fuerit, à similitudine *Echini animalis*. Stachlichte Frucht. In Zoologiâ *Quadrupes*, & *Insectum marinum crustaceum*.



**Fibræ**, sunt veluti stamina rebus nonnullis intertexta, v. g. ligno, foliis, &c. sic fibras ligneas vocamus corpora seu filamenta in longum extensa, ex quibus maximam partem lignum componitur, vid. lib. 1. cap. 8. Item fibræ dicuntur minutissimæ & extremæ radiculæ.  
**Die Härlein an den Wurzeln.**

**Flos**, est pars plantæ tenuior, colore vel figurâ vel utroque insignis, fructui prævia, eique plurimum cohærens, & tenello tegendo fovendôque inserviens, quæ postquam explicatur brevi aut decidit aut inarescit. Flos simplex & compositus seu aggregatus, uniformis & difformis, discoides, radiatus, &c. quis sit vide, *Raii H. P.* lib. 1. cap. 11. pag. 18, 19.

**Folia**, in Mineralogia folia Auri & Argenti, dicuntur laminæ tenuissimæ eorundem metall. seu Aurum & Argentum in tenuissimas laminas diductum.

**Folii differentias**, quidque per folium digitatum, pennatum & triangulatum intelligamus, vide *Raii* lib. 1. cap. 9. p. 13.

**Folium**, definiente *Jungio*, est quod à sede cui adhæret ita in longitudinem & latitudinem extenditur, ut tertiæ dimensionis termini inter se differant, hoc est, superficies folii interna seu superior caulem respiciens ab externa seu inferiore.

**Folliculus**, est theca tenuis quæ granum, vel semen continet involutum. **Das Samen Haus.**

*Frit.* *Varroni* quod in summa spica matura minus est quàm granum. Das oberste in reiffen Aehren.

*Frontatum* petalum, seu floris folium nobis dicitur quod in extremum latius & non rarò rectâ lineâ terminatum desinit, ut in *Calendula* & similibus,

*Fructus*, sunt grandiores illi ac succulenti plantarum foetus, seminum receptacula, ut *Poina*, *Pyra*, *Pruna*, &c. à fruendo, sed & latius extenditur nomen fructus ad omnem agrorum proventum. *Jungio fructus* dicitur pars plantæ annua, flori coherens & succedens, qui ubi maturuerit, id est, ad perfectionem suam pervenerit, sponte à planta abscedit, & terrâ aliâve commodâ nutrice exceptâ, novæ plantæ fit initium. *Die Frucht*. Sunt ergo fructus, vel *Pericarpia* integra cum seminibus contentis, vel *Semina* sola in iis quibus pericarpium deest.

*Fruges*, quicquid de terræ proventu in alimoniam cedit. Errant ergo qui discriminant legumina à frugibus.

*Frumenta*, sive frumentacea Botanicis dicuntur quæcunque geniculato culmo & arundinaceis foliis constant, seménque pultibus aut panificio aptum in spicis aut jubis producunt, ut *Triticum*, *Hordeum*, *Milium*, *Panicum*, &c. *Frugum* enim duo sunt summa genera, *Frumentacea* & *Legumina*. Cæterum & *Ficum* grana illa exigua *Frumenta* dicta sunt *Plinio*.

*Frutex*, definiente *Bodeo* à *Stapel*, est stirps inter



ter lignosas altitudine ac crassitudine medio-  
cris, cui pro superficie stipes perennis, na-  
tura multiplex, quique facile in naturam ar-  
borum stolonum abscissione transcendit. Eis-  
ne Staude.

*Fundus*, plantæ (*ωδφύλω*) *Jungio* est limes com-  
munis, in quo radix & pars superna cohærent.  
G.

*Gemma* in Phytologia idem est quod *Oculus*.  
*Ein Auge*. Id quod in arboribus tumescit  
cum parere incipiunt. *Gemmæ* plenior  
descriptionem vide *Raii* lib. 1. cap. 8. p. 12.  
in Mineralogiâ *Lapis pretiosus* est. *Ein*  
*Edelgestein*.

*Geniculum*, est nodus quidam herbarum in caule.  
*Die Knotten und Gelencke an Halmen und*  
*Stengeln*.

*Glans* dicitur, quod cortice constat crustoso uni-  
cum tantum semen continente, cujus pars  
posterior, quæ arbori adhæret, calyce pro-  
ximè cooperitur, parte superiore nuda,  
*Spiegel. Isag.* Rectius *Glans* dicitur ipse fru-  
ctus calyce contentus.

*Gluma*, *utriculus*, folliculus grani seu involu-  
crum seminum in frumentis; à glubendo,  
quod eo folliculo deglubitur granum. *Der*  
*Balck*.

*Granum*, propriè semen frugum dicitur, indè ge-  
neraliùs quicquid minutum est, & similitu-  
dinem aliquam habet cum grano frumenti.

*Gummi*, est succus plantæ concretus, qui in aqua  
facile dissolvitur, in igne non liquefit, nec  
flam-

flammam concipit, sed duntaxat crepitat; cujus generis sunt *Gummi Arabicum*, *Gummi Cerasi*, &c.

H.

*Herba* (definiente *Bodeo à Stapel* ex Antiquorum sententia) est stirps, cujus superficies est ex foliis tantum, vel etiam ex caule sed illo annuo, carnosio qui diutius durare nequit, lignosusque non est nisi cum exaruerit. In praxi medica pro foliis solis ut plurimum usurpatur.

I.

*Internodium*, est intervallum inter bina genicula, quale in culmis & arundinibus cernitur.  
Der Raum zwischen den Gliedern am Rohr.

*Juba* in Phytologia, est arundinacea coma laxè effusa, qualis in *Milio* est.

*Julus*, nucamentum, quod in *Corylo*, *Juglande*, &c. velut praelongus vermiculus dependet, & nihil aliud esse videtur quam florum stamineorum series. Die Dratseln oder Nußblüt. *Salicum Juli à Juglandis*, &c. diversi sunt; nam in fertilibus plantis numerosis vasculis seminalibus constant.

L.

*Lachryma*, est humor è plantis, tum sponte effluens (sive is concreascit v.g. in oleum, resinam, gummi, sive non) tum facta incisione emanans. *Schrod. Spigelius* lachrymam in eo distinguit à succo, quod liquor qui ex contusa herba exprimitur aut elicitur, succus vocetur.

cetur, qui verò vel sponte, vel incisione manat *lachryma*.

*Lacinia*, est portio folii inter duas fissuras (fissura est profundior scissura) inclusa.

*Lanugo*, in Phytologia est mollis foliorum aut fructuum lana, ut *Cydoniorum*, &c. *Jun.* vel (ut *Schröderus* definit) filamenta tenella cuticulæ extimæ instar pilorum aut lanæ adnascencia. Die Wolle am Kraute.

*Lapides*, in Mineralogia sunt corpora terrea, dura, inductilia: in Phytologia cortices duriores, nucleum includentes, qui quandoque lapides referunt: in Zoologia calculos exhibent in animalibus repertos.

*Legumen*, legumentum, quicquid ex terræ satis in filiqua nascitur, ut *Faba*, *Pisum*, *Cicer*, *Lens*; à legendo, teste *Varrone*, quoniam id non secatur, sed legitur manu vellendo. *Allerley Gemüß*. Nos in hoc opere leguminibus accensemus herbas omnes, quæ florem producunt papilionaceum.

*Liber*, interior tunica arboris ipsi ligno adhærens. *Jun.* Unde liber adhuc dicitur, in quo scribitur ex quacunque sit materia, quia ante repertum chartæ vel membranæ usum de libris arborum volumina compaginabantur. Die innerste Rinde am Baum.

*Loculamentum*, est camera quædam seclusa & distincta in seminum vasculis, uti videre est in capitulis *Papaverum*. *Jun.* Eine Zell. Interdum ipsa capsula & seminis involucrum.

*Lucusæ*, in Phytologia sunt Avenacæ glumæ singula-



gulares cum seminibus ex longis filis dependentes, ob quandam similitudinem cum locustis dictæ. Extenditur hoc nomen ad Graminum paniculatorum grana glumis involuta significanda. In Zoologiâ Insectum est.

### M.

*Malicorium*, Mali Punici cortex.

*Matrix* arboris, idem est quod ejus medulla sive Cor. In Zoologia Uterum significat.

*Medulla*, in Mineralogia partem molliusculam denotat, quæ in saxis nonnunquam reperitur. Steinmarck. In Phytologia mediam cujuslibet plantæ partem molliorem & spongiosam significat, quam & Cor matricemve appellant, cujus descriptionem pleniorē vide *Raii* lib. 1. cap. 4. p. 7. In Zoologia adipem significat in Ossium medietate contentam: vel molliorem illam substantiam, quæ in spina dorsi ac cranio est.

*Malleolus*, definiēte *Columella* lib. 3. cap. 5. novellus est palmes innatus prioris anni flagello, cognominatusque à similitudine rei, quod in ea parte quæ deceditur ex vetere sarmento prominens utrinque Malleoli speciem præbeat.

*Merges*, manipulus spicarum, quantum scilicet semel instrumentum messorium, mergus dictum, inter metendum capit. *Eine Garbe.*

*Minera*, est terra sive materia, ex qua mineralia & maximè metallica fiunt.

*Mineralia*, sunt ea quæ non sunt Vegetabilia  
nec

nec animalia, ut Metalla perfecta & imperfecta.

*Mutica* spica dicitur quæ aristis caret, quasi mutila.

## N.

*Nervus*, in Phytologia, prælongum & continuum filamentum folia perreptans, ut in Plantagine, quæ inde quinquenervia & septinervia dicitur. In Zoologiâ, est pars fibrosa, longa, rotunda, alba, instar Cannæ Indicæ porosa, Spirituum animalium diductioni inserviens, ut hoc ritu partes corporis mobiles & sensibiles sint.

*Nucamentum*, idem quod *Julus*, quædam scilicet quasi panicula dependens è ramis nucum aliarumve arborum: Die Nuß-Blut.

*Nucleus*, Veteribus *Nuculeus*, id vésctum quod sub putamine nucis latet, & generalius semen quodcunque nucibus vel fructibus inclusum & occultatum. Der Kern.

*Nux*, agriculturæ scriptoribus dicitur omne Pomum quod foris duro tegitur cortice, intus verò continet, quod est esui. *Macrob.* Hi nempe existimarunt Pomum cum Malo haud idem esse, sed Pomi nomen Nuces atque Mala continere. *Nux*, fructum denotat cortice lapideo nucleum occludentem. Die Nuß.

## O.

*Oculus*, *Gemma*, tuberculum in arborum surculis unde germinant. Das Auge. Hinc *inoculatio* insitionis species, cujus descriptionem vide

*Raii H. lib. 1. cap. 19. pag. 37. Schröderus* oculos exponit florum prodromos, inque flores explicabiles, nimis restrictè, nam Oculus æquè latè patet ac Gemma.

*Olea*, sunt pinguedines fluidæ.

*Olus*, quæcunque herba esculenta, ab olla nomen sortita, quod in cibum veniat *Junius*. *Holus Julio Scaligero* ab ὅλῳ, claro indicio priscae frugalitatis, quæ ad victum nihil obsonii sibi deesse existimaret, modo ne deesset olus. Hoc enim ὅλῳ est sicut Panis *wāv*. *Jos. Scaliger* in notis ad *Varronem* olus deducit ab oleo cresco, quod olera in hortum translata ex agrestibus culta fiant. *Allerley Küchen Kraut*.

*Ossa*, in Zoologiâ notissima sunt. *Knochen*.

*Ossiculum*, O, penetrale fructuum carne contentum, in quo nucleus est, ut in Cerasis prunisque. *Das Harter/damit der Kern beschloffen wird*.

## P.

*Palmula*, *Dactylus*, caryotis. *Datteln*.

*Panicula*, est lanosa coma unde semen dependet, ut in Arundine. Milio, Gramine, &c. seu (ut *Jungius* definit) Spica laxè diffusa præsertim propendentibus petiolis, ut in Milio. Idem valet quod Juba & opponitur Spicæ.

*Pappus*, lanugo è floribus veterascentibus decidua & volatica, qualis in Carduis, Eringio, Hieracio, &c. cernitur. Hinc Herbarum classis Papposa seu Pappiflora dicta. *Die weissen Wullichen so im Herbst fliegen*.



*Pecten arboris*, linearum tractus qui in longum excurrit in materia seu ligno, cujusmodi in pectine conspiciuntur dentes. Wie das Blat am Weber-Zeug.

*Pennatum folium* est, in quo bini lobi seu mavis folia partialia, è regione sibi ad idem quasi costæ punctum sive ad eandem costæ distinctionem opponuntur, ut in *Fraxino*, *Juglande*. &c. seu folium compositum ex foliis partialibus binis sibi invicem ad costam mediam oppositis.

*Petala*, nobis *F. Columnam* sequutis dicuntur floris folia, seu laminæ illæ tenellæ colore insignes & fugaces. Hoc autem nomine partim ob brevitatem, partim ad Homonymiam evitandam pro floris folio utimur. Hinc monopetalæ herbæ nobis dicuntur, quorum flos unico folio seu lamina constat, tripetalæ, tetrapetalæ, pentapetalæ, &c. quorum flos tribus, quatuor, quinque &c. foliis componitur.

*Pediculus*, est à quo folium, aut flos, aut fructus dependet. Die Stiele an der Blüt oder Früchten. In Zoologiâ Insectum est.

*Perianthium*, est quod florem tegit, & dicitur etiam calyx.

*Pericarpium*, nonnullis restringitur ad significandam pulpam mollem seu humidam semina ambientem, ut in *Pyris Pomis*, &c. Alii latius extendunt id nomen, ad significandum thecam, aut involucrum seminis quodcunque, sive membranosum id sit, ut in vesicis

*Ulmis*,

*Ulm*, *Staphylodendri*, &c. sive durum, ut in *Castanea*, sive carneum, ut in *Pomis*, &c.

*Petiolus*, idem est quod pediculus. *Der Stengel*.

*Pinguedo*, idem est quod adeps. *Fett*.

*Planta*, est vegetabile integrum.

*Pomum*, generale nomen est, quo continetur omnis fructus arboris esui aptus, sive is molli corio tegatur, sive duro, ut scil. Nucem & Malum sub se complectatur. Nos cum arbores quasdam *Pomiferas* dicimus *Pomi* nomen strictius accipimus pro fructu, cujus caro esculenta, nec duro putamine includitur, nec ossiculum in se continet. *Ein Apffel oder Birn*. Alii *Pomum* à Nuce distinguunt, ut *Pomum* sit quicquid foris habet quod edendo est, & durum intus includit. *Nux* quicquid foris duriore corio tegitur, intus habet quod est esui.

*Pulpa*, est caro seu substantia fructuum succulentorum inter corticem ac nucleum comprehensa, v.g. *Pomorum*, *Cerasorum* & similia. Primario significat partem carnosam in corpore animalis.

R.

*Racemus*, est integra uva è multis constans acinis. *Ein Trauben; Zweig*. Ad alios etiam fructus extenditur, qui uvæ in modum ex pluribus acinis sunt conglobati.

*Radix*, definiente *Jungio*, est pars plantæ inferior, quæ intra corpus solidius, quod plantæ sedem præbet, abdita (sive illud terra sit ut plerumque, sive saxum, sive calx, sive arena,

sive lignum, sive quodcunque aliud) & alimento attrahendo destinata est. Nonnullæ ex plantis submarinis radices habent expostas & minimè intra corpus aliquod solidius abditas, sed duntaxat saxa in fundo jacentia amplectentes.

*Ramus*, est in quem caulis dividitur, estque velut brachium plantæ. Ein Ast oder Zweig.

*Resina*, est liquor pinguis & oleaginosus ex arbore seu sponte seu eâ vulneratâ destillans, quæ in aqua non dissolvitur, sed in oleo duntaxat, & flammam faciliè concipit.

S.

*Sagitta*, dicitur superior pars surculi aut flagelli. Vid. Raii lib. 1. cap. 18. pag. 33.

*Scapus*, est caulis rectus in columnæ modum. *Jun.* Est enim scapus ipsum corpus columnæ inter basin & epistylum. Die Stiele. Vel Scapus est pars caulis ramosi, qui à fundo ad cacumen unâ quasi lineâ extenditur, cui rami utrinque adhærent. *Jung.*

*Scobs*, quod serra de ligno deteritur. Feilsstaub oder Sägmehl. Sic etiam dicitur limatura, seu illa velut farina quæ limâ abraditur: à Scabendo.

*Semen*, in Officinis minutiores plantarum fructus denotat, ex quibus simile nasci potest. *Schröd.*

*Sevum*, est pinguedo duriuscula. Unschlitt.

*Siliqua*, est folliculus oblongus, cui Leguminum & similium grana includuntur. Die Hülssen.

*Spadix*, Ramus Palmæ una cum fructibus revul.



vulsus; inde color quidam Spadiceus denominatur. *Rastanien braun.*

*Spica*, est quod culmus extulit, continetque granum, glumam & aristam, ein *Kornähre*. Verum hoc nomen latius extenditur; unde rectè à *Jungio* definitur, quod ex floribus vel seminibus spissè compositum est, ita ut conus erectus sed oblongus, sive admodum acutus inde evadat, ut in *Plantagine*, *Bistorta*, *Secali*, *Hordeo*, &c.

*Stamina*, idem sunt quod *Capillamenta*, quæ sic describit *Spigelius*. *Isag.* lib. 1. cap. 6. Sunt autem stamina in floris medio, quod umbilicus appellatur, partes oblongæ, tenues veluti capillamenta, interdum paulò crassiores, paululum prominentes in summitate, apicibus frequenter præditæ, quæ stylum, partem similiter oblongam, sed paulò crassiore, atque è centro umbilici emergentem, ambiunt.

*Stercus*, est excrementum animalium per anum excretum.

*Stirps*, planta firmitate prædita *Jun.* in genere Plantæ *Synonyma* est.

*Stolones*, sunt cauliculi inutiles à radicibus aut caudicis lateribus succrescentes. Ein unnützer Zweig am Stamme oder Wurzel des Baums. *Jo. Bodeus* à *Stapel* *Stolonem* dici vult, quæ nascitur circa stipites & avellitur cum radice & corporis parte; quo à *Viviradice* differt, quæ integra ex arboribus è

longinquo extrahitur. Vid. *Raii* lib. 1. cap.

19 p. 33.

*Stylus*, in *Phytologia* est pars floris medium ejus occupans & rudimento fructus aut seminis cohærens. Dicitur *stylus*, quia in longitudinem tenuem plerumque extenditur, *Jung.* Vid. *Raii H.* lib. 1. cap. 19. p. 33.

*Succi*, in *Officinis* vocantur expressi liquores, ex radicibus, foliis floribus, fructibus, &c.

*Suffrutex*, est planta humilior, lignescens & perennis, à radice non foliata, & ab imo statim ramosa; vel Planta inter lignosas minimæ & altitudinis, & crassitudinis superficie perenni, non gemmipara, ut *Salvia*, *Ruta*, *Lavendula*.

*Summitates*, sunt cacuminula herbarum; dicunturque de herbis foliorum minutiorum.

*Surculus*, est quod in ramis simplex assurgit, tenerum & exile. Est etiam ramulus novellus, qui inspicatur ad ferendum. Ein junger Eßchoß oder Reiß / germen arboris anniculum.

## T.

*Tesca*, vel ovorum cortex externus appellatur, vel concharum tegumenta.

*Thyrsum*, est quod virgulæ in modum, aut in telæ rectitudinem in planta consurgit: Caulem autem medium fruticis qui vulgo *thyrsum* dicitur: *Servius*. *Vossius* exponit, quicquid sic consurgit ut in gracilitatem attenuetur, ut arbores confere, vel coni piceæ Apud Botanicos cum *Spica* confunditur. Item *Hastula* frondibus

bus vestita , quam solebant Bacchantes ferre.

*Tomentum*, est lana brevis forpicibus desecta, aut in poliendo à fullone de pannis rudibus aut interpolatis deducta , quâ inferciuntur culcitæ qualescunque. *Jun. Scheer: Wolle.* Hinc ad plantas transfertur, quæ molli & lanosâ comâ in capitulis eminente præditæ sunt, ut *Carduus tomentosus*, *Gramen tomentosum*, &c.

*Truncus*, caudex arboris ramis & frondibus destitutus.

*Tuber*, est fungus subterraneus, à tumeo. Hinc dicitur de plantarum radicibus prætumidis, rotundis. Radices tuberosæ, *Tuberosen/ knollichte Wurzeln.*

*Turiones*, tenella arborum, fruticum aut herbarum cacumina, quasi teneriones; vel ut *Vossius* vult, quia faciliè teruntur. Teneritates summitatum ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt. *Schröd.*

## II.

*Venæ*, in phytologia sunt, quæ in plantarum foliis apparent, fibræ in ramulos divisæ: in Zoologia quid sint ignotum non est.

*Verticillatæ* plantæ dicuntur, quarum flosculi caulem articulatim velut verticilli amplectuntur foliolis interspersis, ut in *Pulegio* & *Marrubio* cernitur. Sunt autem Verticilli instrumenta quædam rotunda, quæ fusis adhibentur, ut faciliùs vertantur; *G. gewirbelt* dicimus.



*Villi*, idem quod fibræ. & pili.

*Vimen*, omne virgultum lentum ac flexile, ad ligandum aptum, à Viendo. Allerhand schwache Reiser / so sich flechten lassen.

*Vinaceum*, granum acini, γίγαρον. Traubenstein.

Vide *Acinus*. Accipitur etiam nonnunquam pro tortis uvæ expressæ reliquiis.

*Umbella*, vocatur floris seminisve velut pedamentum, in pluris divisum longiores pediculos, qui simul ex eodem fastigio orti in latius continuò radiantur, singuliq̃ue florem sustinent in orbem circumactum, ut in *Fœniculo*, *Anetho*, *Apio*, &c. vel, ut *Jungius* definit, est extremitas caulis permultas subdivisiones in coni universi figuram aptata; à similitudine umbellæ, qua mulieres faciem à Sole arcent. In Umbelliferis enim summus caulis, summique ramuli in plures ab eodem puncto ortos radios dividuntur, singuli radii itidem in plures pediculos qui flores sustinent.

*Umbilicus*, 1. quod in Pomis vel prominet, vel reconditur ab adversa pediculi parte. 2. media pars floris unde stylus & stamina emergunt.

*Unguis*, pars ima folii Rosæ albida. Extenditur etiam ad florum aliorum petala. In Zoologiâ *Ungues* sunt corneæ extremitates digitorum & pedum. Die Nägel an Händen und Füßen.

*Ungula*, sunt cornea tegumenta, quib⁹ pedes nonnullorum animalium conteguntur. Ein Hufe.

Uni-

*Uniformem* florem dicimus, cujus anterior pars posteriori & dextra sinistra similis est. Vide *Raii* lib. 1. cap. 11. pag. 18.

*Urina*, est excrementum serosum à sanguine in renibus secretum, per ureteres ad vesicam delatum, donec convenienti tempore & loco, excernatur. *Urin.*

*Volva*, Pomi medium, in quo ceu loculo latent semina. *Scribon.*

*Uruncus*, quod in infima spica ad culmum stramenti est minus quam granum.

*Ufnea*, vide *Mulcus* in *Phytologia*.

*Utriculi*, sunt seminum in frugibus involucra & operimenta, quæ trita & cribro excussa Glumæ sive Acus dicuntur.

*Hæc Terminorum explicatio maximâ ex parte à Clarissimo Raio mutuata est.*

---

## CAP. II.

### *De Instrumentis Pharmacopœticis.*

**I**Nstrumenta medicamentorum præparationi inservientia varia sunt, differuntque non modò ratione Officii, sed & materiæ formæque inde dependentis diversitate. Officii ratione alia medicamentorum præparationi, alia asservationi inserviunt. Materiæ respectu, fiunt alia ex lapidibus, alia ex terris, vitris, metallis, lignis, corio, linteo, panno, &c. Forma instrumentorum varia existit, prout illorum offi-

cium requirit materiaque permittit. Nos usitatio-  
tiora Synopsi damus.

*Agitaculum.*

*Ahenum.* Kessel. Est vas cupreum, medicamentis coquendis destinatum.

*Alembicus.* Ein Helm. Est instrumentum chymicum, quod cucurbitis & vesicis destillatoriis superimponitur, habet formam galeæ, intus concavum, extus convexum, circa infimam partem rostrum habet cucurbitale, per quod vapores descendunt: Conficiuntur ex ære, stanno, vel vitro,

*Ampulle.* Phiol Gläser. Sunt vitra rotunda, quibus collum in summitate est.

*Arcule.* Diversæ formæ ad reponenda simplicia.

*Catillus, vel Catillum.* Pfänlein / Topff.

*Catinus, vel Cupella.* Test oder Kapelle. Est ex cineribus ossium aut aliis rebus compositum, in quibus Aurum & Argentum à sordibus suis depuratur.

*Circulatorium.* Ein Glas zur digestion. Est vas virreum, ubi infusus liquor, ascendendo, quasi in circulo rotatur. Varia sunt hujus generis vasa, ut Alembicus Cæcus, Pelecanus Gemina, Diota, &c.

*Cochleare, Eine Kelle.* Quod majus est, & ex ære conficitur, vel ex argento aut stanno; & minus, quod dicitur. G. Ein Spehn.

*Colatorium.* Est cribrum, pannus, linteum aut aliud quid, per quod aliquid colatur.

*Cribrum.* Ein Sieb,

*Crucibulum.* Ein Tiegel. Est vas fusorium ex terra



terra igni contumacissima, factum, acutiore basi, & ferè in ampliorem capacitatem forma triangulari vel rotunda desinens.

*Cucurbita.* Ein Kolben. Est vas Chymicum turbinatum ex terra vel vitro confectum, distillationibus, per alembicum instituendis aptum.

*Fistula.* Erdene Gefäß. Variæ formæ.

*Forceps.* Ein Zange.

*Infundibulum vel Tritorium.* Ein Trichter. Est vas transmittens, in summitate latum, quod paulatim in fistulam cuspidatam desinit, & ex metallo vel vitro fabricatur.

*Lebes.* Ein eherner Diegel oder Pfanne.

*Lima raspatoria.* Eine grobe Feile.

*Malleus.* Ein Hammer.

*Manica Hippocratis.* Hippocratis Sieb. Est sacculus laneus, figura pyramidali, quo vina aromatica & medicamentosa, aliique liquores percolantur.

*Matracium.* Est vitrum circulatorium, habetque formam fere rotundam, cum collo satis longo.

*Mensura vel Lagena.* Allerhand Maasß. Variæ magnitudinis, pro mensurandis vel Spiritibus vinosis, vel Aquis tum Simplicibus tum Compositis, vel vino, &c. In Medicina tamen usitatiores sunt *Cochleare*, quod, in Syrupis, continet Unciam dimidiam; in Aquis Stillatitiis, drachmas tres. *Cyathus* qui comprehendit Unciam unam cum semisse; & *Congius* qui Libras octo continet. V. *Autores de Men-*

*Mensuris, præsertim Greavium, Bernardum, & Cumberlandum Nostrâs.*

*Mortaria. Mörser.* Vasa sunt ex ære, marmore, ligno, aut vitro confecta, in quibus pistillo ferreo, aut ligneo vel vitreo, res quædam contunduntur.

*Olla & Ollula. Töpffe.* Variæ formæ, & magnitudinis.

*Pistilla. Die Stösser im Mörser.* Instrumenta sunt Pharmaceutica, ex ferro, ligno, aut vitro confecta, quibus res in mortariis tunduntur.

*Pondera. Allerley Gewicht.* In usu medicinali sunt Granum, Scrupulus, Drachma, Uncia, Libra.

|           |                 |       |
|-----------|-----------------|-------|
| Granum    | } Cujus signum, | [ Gr. |
| Scrupulus |                 | ☉     |
| Drachma   |                 | ℥     |
| Uncia     |                 | ℥     |
| Libra     |                 | ℔     |

|                |             |     |            |
|----------------|-------------|-----|------------|
| Grana viginti  | } constitu- | unt | Scrupulum. |
| Scrupuli tres  |             |     | Drachmam.  |
| Drachmæ octo   |             |     | Unciam.    |
| Unciæ duodecim |             |     | Libram.    |

De his consulantur Autores varii de ponderibus & Mensuris, in hisce enim maxima est confusio, & obscuritas, adeò ut Antiqui in multis rebus nobis haud intelligendi sint.

*Porphyrites, Roht Marmelstein.*

*Prelum, vel Prelum, Eine Presse.*

*Pyramis. A figura.*

*Pyxides.* Blecherne Büchsen. Capsulæ sunt, in quibus nempe Medicamenta asservantur.

*Receptaculum vel Excipulum.* Ein Empfang Glas/ oder Vorlage. Est vas amplum in quo guttæ & vapores destillantes excipiuntur.

*Retorta sive Cornuta.* Die Retorte. Vas Chymicum est, ex vitrō, terra, vel ferro conflatum, figura rotunda, ad cuius latus rostrum est, flexum, retortum, & cavum, per quod destillanda ingeruntur & egeruntur.

*Rudicula, Spatula, vel Spatha.* Ein Spahthen oder Rühr Schaufflein. Instrumentum est oblongum, ex argento, chalybe, Cupro, ligno, aut ebore confectum, inferius latum, quo medicamenta varia absque manuum iniquatione commodè tractantur.

*Rutabulum.* Ein Rühr-Naken. Instrumentum, quo Pharmacopœi utuntur in proruendo igne.

*Sacculi.* Kleine Beutel. Ex charta, &c. confecta.

*Separatorium.* Scheideglas. Vas est Chymicum vitreum oleis ab aqua separandis destinatum.

*Tegula.* Diegel.

---

### CAP. III.

#### *De Collectione simplicium.*

**T**Ametsi in peregrinis simplicibus certum collectionis tempus sciri nequeat, eorum tamen color, odor, sapor, ac species iudicium nostrum subeunt, ex quibus omnibus  
ac



ac singulis , collectionis debito modo & tempore factæ , notas desumere possumus. Ea porò , quæ nostris terris innascuntur , tum demum colligere ac in usum medicum congerere oportet , cum maximè vigent aut matura sunt , vel ad propriæ virtutis perfectionem plus minus accedunt.

*Ex Mineralibus* , optima Metalla censentur quæ maturuerunt.

*Ex Vegetabilibus* , radices evellantur inclinante verè aut æstatis initio , post primorum foliorum eruptionem , tunc enim succo probe concocto turgent : quo tempore eas summæ virium , & maxime medicamentosas esse Authores affirmant. *Herbæ* colligendæ sunt , quando folia magnitudine , colore , & odore vigent , præsertim quæ cacumini sunt propiora , idque cælo sicco , & sereno , atque tempore meridiano. *Flores* colligendi , quando expliciti pulchritudinè suâ luxuriunt , non dehiscences aut decidui : Flores verò Rosarum , pro conficiendâ conserva , avellendi sunt , priusquam aperiuntur. *Fructus* priusquam decerpantur , probe maturi sint , oportet : nisi datâ operâ immaturi expetantur , ac deinde exsiccantur aëre , vel sole , & si opus sit , in clibanò post panis extractionem. *Semina* colligenda sunt , cum siccati cœperunt & antequam excidant , & in loco sicco , non calido , ad usum reponantur. *Cortices & Ligna* avellantur , quando arbores in pleno vigore sunt.

Animalia eorúmque partes sumi debent ex iis quæ ad ætatem consistentiæ pervenerunt.

## CAP. IV.

*De Asservatione & Duratione  
Simplicium.*

**S**implicia collecta asservari ad usum debent, sicut tamen, ut asservatio non extendatur ultra terminum durationis, quia vires cum tempore languescunt.

*Mineralia* pleraque, quia durabilioris ac solidioris sunt substantiæ, diutius ideo integris viribus durare possunt.

E *Vegetabilibus*, *Flores* quamdiu odorem, colorem, & saporem retinent, asservari possunt; quod tamen spatium vix ad annum extenditur; mutandi igitur singulis annis. *Herbæ* diutius validæ durare possunt: tamen singulis annis, præsertim indigenas, mutare convenit. *Semina*, quo calidiora, acriora, & magis aromatica, eo durabiliora sunt, eoque per biennium aut triennium, servari possunt, minutiora tamen, ac frigida minora, singulis annis renovare expedit. *Fructus* quotannis mutandi sunt; exotici tamen, duriori cortice, ac crustâ vestiti, per duos tresve annos & plures durant. *Radices* parvæ, tenues, raræ, anno quolibet mutandæ: magnæ, crassâ substantiâ præditæ, biennium vel triennium integræ manent. *Cortices*, in annum & ultra perdurant. *Ligna*, biennium, triennium vel quadriennium & ultra asservantur. *Gummi & Resinæ* durabilioris sunt naturæ,

*Animalia eorumque partes*, vires suas vegetas, obtinere creduntur, quamdiu incorrupta servantur, id quod rancido foetore, sapore, situ, atque coloris mutatione, dignosci potest: molliores tamen partes singulis annis mutare præstat.

---

## CAP. V.

*De modo adaptandi Simplicia ad  
Asservationem.*

**M**odus adaptandi variat, prout res integra in partes dissecta, repurgata vel secus asservari postulat, vel prout diverso situ est collocanda, aliudve expetit, cujus auxilio à corruptione conservetur.

*Flores* asservantur ut plurimum à caulibus ac foliis suis herbaceis segregati. *Herbæ* seu *Folia* si grandiora fuerint, caulibus crassioribus, seorsim à caulibus decerpta reponuntur: sin caulibus sint tenuioribus, una cum iisdem asservantur, nec rarò unà cum floribus. *Radices*, aliæ servantur integræ, aliæ in taleolas dissectæ, similiter adimitur nonnullis lignosa matrix.

*Carnose animalium partes* lavantur primum pro libitu, cum vino vel decocto convenienti, hinc exsiccantur in furno. *Res pingues* & *oleosæ* lavantur in aqua aliquoties, donec puræ evaserint: hinc lento igne liquantur, colantur, effundunturve super frigidam, ut sordes ad fundum subsidant, vel in spumam colligantur, post reponuntur in locum frigidum, quo servantur.



vantur. *Membranose partes*, ut intestina, secundum longitudinem secantur, abluuntur vino vel decocto convenienti, in frusta dissecta exsiccantur in clibano ac servantur. *Sanguis* repurgatur à sero, hinc exsiccat in furno. *Fella*, detrahuntur à jecore præligatisq; filo viis introitus & exitus, siccantur in camino suspensa. *Coagula* exiccata fumo aut sole asservantur.

---

## CAP. VI.

*De Loco Asservationis Simplicium.*

**L**ocus in genere eligendus est purus, asservandoque medicamento conveniens, sublimis, siccus, pervius, septentrionem meridienque spectans. Vitandus è contra locus impurus, pulverulentus, subterraneus, uliginosus, insolatus, infumatus, &c. Custodiendæque sunt res ne à radiis solis urantur, neque squalore tecti vel murorum madesiant. Quin, imò non abs re foret, in peculiari camera seu hypocausto, super scamnis ac asseribus, herbas rara stratificatione, blandi caloris beneficio siccare, postmodumque vasis mundis asservare.

E Mineralibus; *Terræ, Metalla & Lapidés*, Scatulis vel arculis ligneis asservari poterunt. *Salina*, ligneis custodiuntur vel vitreis, reponunturque loco sicco. *Aquea* vitris vel urceis vitreatis.

E Vegetabilibus, *Flores & Herbæ* siccantur in umbra imponunturq; sacculis chartaceis vel arculis ligneis, ut à pulvete tutæ sint. *Semina &*

*Fructus* asservantur loco sicco vasculis ligneis, pyxidibus, chartisque, ut eò diutius & sine impuritate perdurent, involvuntur. *Radices* asservandæ sunt in aëre sicco, vasculis ligneis. *Cortices & ligna* arculis ligneis, locoque sicco asservantur. *Gummi*, ac *Resinæ* siccæ, sicco loco atque ligneis vasis includuntur; liquidiores in urceis.

Ex animalibus. *Animalia* eorumque partes sicciore in pixidibus ligneis reponuntur. *Adipes & Medullas*, vasis, aut urceis, vel singulis vel vitreatis recondere convenit, locoque frigido ac sicco asservare.

De Collectione & asservatione simplicium v. plura apud *Laurenbergium Horticult.* & apud *Simonem Pauli in Quadripart. Botan.*

## CAP. VII.

### *De Viribus, & Usibus Fossilium, Vegetabilium, & Animalium in genere.*

**H**IC maximus differendi campus, universam ferè Creationis faciem complectens; sine his nec lautè nec commodè nec omninò vivitur, quæcunque ad ædificium, ad vestitum, ad victum, ad medicinam, ad navigium, oblectamenta sensuum, & delicias, quæcunque ad vitam humanam necessaria sunt, è vastissimo & locupletissimo hoc Naturæ thesauro abundè suppeditantur. Verum, his missis, de eorum tantum viribus seu usibus in medicinâ verba faciam; tam Antiqui quam Neoterici

terici hæc vires & usus diversimodè investigârunt; Alii, à temperamentis seu primis rerum naturalium qualitatibus, calore, frigore, humiditate, siccitate. Alii à Saporibus, ut *Grevius* & *Floyerius*. Alii à Signaturis, & Aspectu Planetarum. Aliqui ab esu & pastu Insectorum. Quidam à Loco & Tempore crescendi; sed hæc incerta omnia; optimus investigandi horum vires nobis modus esse videtur, experientia faciendo in corporibus Animalium, quos effectus & Phænomena res ipsæ produciunt in machinis nostris vel purgando, movendo Diaphoresin, Urinam, Vomitus, Narcosin; vel specificè & alterativè agendo in humores. Horum ferè omnium illustria experimenta dedit *Wepferus de Cicutâ aquatica*.

De Chymica materiæ medicæ Analyfi vide *Wedelii* & *Etmulleri Opera*, item *Raii Histor. Plant.* pag. 55, 56. & *Dodarti Memor.* ad inserviendam Academiam Regiam in concinnandâ Historiâ vegetabili, in octavo. *Parisiis 1679.*

## CAP. VIII,

### *De Divisione & Methodo hujus*

#### *Operis in genere.*

**M**ateriam Medicam in tres partes dividimus, viz. 1. *Mineralogiam*; 2. *Phytologiam* (sub quâ *Botanologia* & *Dendrologia*) 3. *Zoologiam*.

Prima Pars Fossilia, Aquas Minerales, Terras, Sales, Sulphura & Bitumina, Mineras



Metalla, & Lapides comprehendit, non vulgaribus methodis, sed novo ordine naturæ vestigiis insistente disposita, Tabulis Synopticis & notis Characteristicis distincta, adeò ut Tyrones facili operâ res ipsas certò ediscant, easque memoriæ mandare possint. Hæc Mineralium dispositio maximâ ex parte nostra est, licèt egregios viros, *Kentmannum*, *Gesnerum*, *Fallopium*, *Casalpinum*, *Agricolam*, *Svenckfeldum*, &c. in hac palestrâ sudasse fateamur.

Secunda, de Vegetabilibus, Herbis, Fruticibus, Arboribus, eorumque partibus in officinis usitatis, agit; in quorum dispositione nec *Schroderum* nec ullum materiæ medicæ scriptorem imitati fuimus, sed ipsos naturæ libros & fontes adivimus, optimosque Botánicos, *Andream Casalpinum*, *Fabium Columnam*. *Bauhinos*, *Morisonum*, *Rajum*, *Plucenetium*, *Horti Malabarici Autores*, *Hermannum*, &c. pervolvimus. A Flore, semine, & conceptaculis, Tabulas & Characteres nostros præciquè formavimus; vulgares methodos Alphabeticas, & dispositiones à locis, florendi tempore, vel à qualitatibus desumptas negleximus, ut incertas & frivolas.

Tertia, de Animalibus differit. Insectis, Piscibus, Avibus, Quadrupedibus, Homine, eorumque partes usui Medico accommodatas tractat; in hisce digerendis non *Gesnerum*, non *Aldrovandum*, nec *Johnstonum* sequuti fuimus: sed summum Philosophum *Joannem Raium*, *Britanniæ nostræ Lumen & Ornamentum*, consultavimus. Qui non solum Plantas, sed Animalia par-

tim in operibus editis, partim in Codicibus Manuscriptis, accuratissimè & felicissimè disposuit.

Hæc de Divisione & Methodo nostrâ in genere, pro subdivisionibus subalternis & horum unicuique subordinatis ipsæ Tabulæ per totum librum sparsæ consuli possunt. Ubique Methodum (Memoriæ Matrem) maximè naturalem facilemque observavimus, sine hâc confusio, obscuritas, & difficultates insuperabiles oriri solent.

...§§§...§§§...§§§...§§§...§§§...§§§...§§§...§§§...§§§...

# PHARMACOLOGIÆ

SEU

MANUDUCTIONIS

AD

Materiam MEDICAM

LIBER PRIMUS.

---

## *De Mineralogia.*



*Mineralogia est rerum Macrocosmicarum enodatio. Res Macrocosmicas voco, quæcunque extra familiam Vegetabilium & Animalium collocantur; sunt tum primariæ, i. e. ad naturam Ele-*

mentorū propiūs accedentes, ut *Aqua* & *Terra*: cum *secundaria*, i. e. è perittomate *Macrocosmi* procreata, ut *Sulphura*, *Salia*, *Metallica* & *Lapides*.

*Fossile* est corpus perfectè mixtum, peculiari formâ & virtute seminaria à Deo in primâ creatione dotatum, ut sibi simile procreare suamque speciem propagare possit. Generatur modo germinationis & quasi vegetationis in terræ utero, & interdum in ipso aëre; de quo *V. Jordanum nostrum de Thermis* & *Aquis Mineral.* *Websterum de Metall.* *Boylium de Occult. Qualitat. Aeris* & *de Augmento Minerarum*. Metallum perfectum, interitus haud capax est, in varias formas transit vi *Ignis* vel *Artis*, vel *Ævi*; Metallum tamen manet, & pristinam faciem promptè induere potest; nobis non licet esse tam felices.

Materiam Medicam ad tres classes referimus, viz. *Mineralium*, *Vegetabilium*, & *Animalium*. A primo genere initium facere lubet, ut ita ab ignobilioribus ad nobiliora, ab imperfectioribus ad perfectiora, ab inferioribus seu subterraneis ad superiora & altiora paulatim ascendamus.

*Fossilia* dicta, quod major eorum pars fodiendo è terrâ eruatur. Ab aliis *Mineralia* vocantur, qui fodinas *Minas* volunt appellatas, & *Venas Mineras*. *Metallica* etiam à quibusdam, à potiore specie, *Metallis* nempè.

Horum propagatio non minùs admiratione digna est, quam *Vegetabilium* & *Animalium*; est enim multiplicativa, & regenerativa, (detur verbis venia) ut cuique in rebus subterraneis seu fossilibus versato notum est; hæc etiam  
causa



causa est, quòd quanquam formæ externæ fiat mutatio, ut in liquore, pulvere, vitris, &c. in metallicum nihilominus, nullo negotio redigi possint, ut in Mercurio, Auro, Antimonio, &c. videre licet; stupenda sanè & incorruptibilis natura, Plantis & Animalibus non concessa; Homo ipso metallo vilior.

*Fossilia* multifariam dividuntur ab Autoribus. *Dioscorides* omnia subterranea Metallica vocat. *Avicenna* quatuor statuit, Lapidem, Metallum, Sulphur, Sales. *Albertus Magnus* tria, Lapidem, Metallum, & media Mineralia, quo nomine reliqua omnia accepit, quia mediam quandam naturam inter lapidem & metallum habere videntur. Alii omnes divisiones reprobant præter Lapidem & Metallum. Quidam sunt pro solâ Terrâ, & succo concreto. *Wormius* fossilia dividit in media Mineralia, Lapides, & Metalla; Media Mineralia illa vocat, quæ mediam quasi naturam habent inter Lapides & Metalla; hæc rursùm sunt vel Terræ, vel Sales, vel Sulphura, vel Bitumina. Divisionem fossilium uberiores v. in Tabulâ *Schwenckfeldi* præfixâ *Lib. de Fossilibus Silesiæ.*

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Nobis Mineralia sunt vel corpora | { | Fluida, pellucida, non ardentia : AQUA Medicata.  |
|                                  |   | Densa & solida.                                   |
|                                  | { | Non ardentia.                                     |
|                                  |   | Friabilia.  |
|                                  | { | Dura & ponderosa.                                 |
|                                  |   | { Ex particulis terreis consistentia : LAPI-      |
|                                  | { | DES.  |
|                                  |   | { Metallis accedentia. MINERALIA.                 |
|                                  | { | Leviora & friabiliora.                            |
|                                  |   | { Pellucida, in aqua solubilia, sapore pungen-    |
|                                  | { | te : SAL.   |
|                                  |   | { Non pellucida, sapore astringente. TER-         |
|                                  | { | RA.   |
|                                  |   | { Non friabilia, ductilia, fusilia, splendentia : |
|                                  | { | METALLA.  |
|                                  |   | { Ardentia, in aqua non solubilia : SULPHUR.      |

Cruda, succis, terris, lapidibus permixta, nondum excocta, aut purgata, ut *Vena & Minera*.

Humida, ut *Succi Minerale*.

Residua ex metallis dum liquantur. *Scoria*, *Pompholyx*, &c.

Lapidum divisionem & Tabulam proprio in loco inveniet Lector, viz. præfixam Sect. VI.

## SECTIO PRIMA.

### *De Aquis Medicamentosis.*

**A**que nativæ, quæ usui Pharmaceutico inserviunt, tum simpliciores sunt, tum minerales.

#### *I. Aquæ Simpliciores.*

1. **A**qua fontana. Offic. Brunnen-Wasser. Est omnium purissima & usitatissima.

2. Aqua

2. Aqua marina Offic. See: Wasser. Prep.

Sal marinus. Offic. Niger Quibusdam. Schwarz  
Saltz. Evaporatione Aquæ marinæ in calidis  
regionibus fit. Ex Hispania & Francia ad nos  
transportatur. *Vires*. Calefacit, exiccat, abster-  
git, dissolvit, adstringit leniter, consumit su-  
perfluitates, penetrat, digerit, aperit, incidit.  
Venerem stimulat, putredini, venenisque re-  
sistit: Hinc convenit internè in cruditatibus  
ventriculi, appetitu prostratu, obstructionibus  
alvi & urinæ, colicis doloribus, &c. Externè,  
in ulceribus putridis ac serpentibus mundifi-  
candis, in tumoribus simplicibus ac pestilentia-  
libus discutjendis, in Pruritu & Scabie exic-  
canda, &c. Schröd. Pro modis conficiendi Sa-  
lem vel simplici Evaporatione Aquæ Marinæ  
in Regionibus calidis, vel coctione fontanæ  
Salsæ, V. Transact. Philosoph. N. 51. N. 53. N. 54.  
N. 142. V. Collinum de Sale & Piscaturâ. Ut etiam  
Clarissimum Raium de vocabulis Anglicis inusitatis.

3. Ros Offic. Rhau. Reliquis omnibus subti-  
litate, adeoque & penetratione antecellit.  
Præfertur Majalis.

## II. Aqua Minerales.

**S**ub aquis mineralibus comprehendimus Acidulas  
& Thërmas, quæ nihil aliud sunt, quam aquæ, mi-  
neralibus essentiis in Terræ abyssò, imprægnatæ. Est-  
que substantia hæc mineralis varii generis, viz.

1. Metallinæ vel Diureticæ, celebriores sunt  
Tunbrigenses in agro Cantiano, Astropienses in Nort-  
hamtonio, Knarsburgenses, & Scarburgenses in agro  
Eboracensi, Spadana in Episcopatu Leodiensi, &c.



2. *Salinae* vel *Catharticae*, celebriores sunt, *Epsamensis* in *Surreia*, *Barnetina* in *Middelfexia*, *Northallensis* in *Hartfordia*, *Strettamensis*, *Dullechensis*, *Adoniensis*, &c.

3. *Sulphurea* seu *Therma*, *Bathonienses* in *Summerseto*, & *Buxstonienses* in agro *Derbiensi*; *Aquisgranenses* juxta limites *Ducatus Juliacensis* & *Limburgensis*, *Borbonenses* apud *Gallos*, *Hungaricae*, &c. *Vires*. *Aquarum mineralium Vires*, pro diversitate commixtorum mineralium discernendæ, in quibus tamen, cum impossibile sit, in accuratam earum devenire mixtionem, experientiæ potiores partes dandæ sunt. *Schröd.*

Qui particulares usus variarum *Aquarum Medicinalium* scire desiderat, adeat prolixas dissertationes Autorum de iis expressim scribentium, viz. *Gab. Fallopius*, *Gesnerus*, *Joannem Baubinum*, *Henricum ab Heers*, *Baccium*, *Jordanum*, *Autores Venetiis impressos*, *Blondellum*, *Wittium*, *Closium*, *Listerum*, *Boyleum*, &c.

## SECTIO SECUNDA.

### *De Terris Medicamentosis.*

**E**X mineralibus sunt, quæ terræ faciem adhuc quidem retinent, à communi tamen terra quodammodo recedunt.

*Terræ medicamentosa* sunt corpora friabilia, & arida, indurabilia, opaca, si in aqua soluta fuerint, per filtrum separabilia.

Hæ in quatuor Classes dividi possunt, viz. 1. *Boli*. 2. *Argilla*. 3. *Margæ* vel *Lutræ*. 4. *Cretæ*. De quibus suis locis.

Terræ variis modis ab authoribus dividuntur, ratione qualitatum, colorum, saporum, odorum, mixturarum, & locorum: vel ratione usus; sic Figuli & Plastræ sibi seligunt Argillas & Cretas. Fabri lignarii Rubricas. Pictores Ceruleonium, Melinum. Fullones Cimoliam & Terram Saponariam. Fabri Argentarii Cretam argentariam. Alii alias. Medici Terras preparatas & sigillatas. *V. Casp. Svenckfeldium de fossilibus pag. 394. ad pag. 398.*

### *I. De Bolo.*

*Est terra ex pallido rubra, pinguis & parum Stiptica, & ad linguam promptè adhaerens.*

1. Bolus Armena *Offic.* vera quibusdam. *Kohlststein.* Est substantia terrea, ex flavo pallidè rubicunda, ponderosa, pinguis, facile friabilis, saporis astringentis. Eruitur ex terræ fodinis in Turcia & ad nos adfertur. *Vires.* Alexipharmaca est, inhibendo acidum in Sanguine; astringit aliquomodo & hinc in Fluxionibus adhibetur. Externè siccatur, ac cicatriculam inducit vulneribus.

2. Bolus Bohemica *Offic.* *Teutscher Kohlststein.* Est substantia terrea, ex flavo pallidè rubicunda, sed minus intensè quam præcedens, cum aliquot venis flavescentibus, ponderosa, facile friabilis, saporis astringentis. Ex fodinis Bohemiæ eruta ad nos advehitur. *Vires.* Easdem habet vires cum præcedente, & in Officinis nostris vulgatissima est.

## II. De Argillis.

**S**unt terra ponderosa, unctiosa ac pingues, quae lingue promptè adherent, & in ore detenta è sevo quasi constare videntur.

A. 1. Argilla Offic. Töpffer-Erde oder Thon. Variæ sunt species & colores, in usu Figulorum & aliorum Mechanicorum, sed quænam ex omnibus in usum medicum veniat me planè nescire fateor. *Kentmannus* enumerat Argillas candidas micis argenteis internitentes: Cineræas, ex quâ Noribergæ cum terrâ arenosâ fiunt vasa liquationis, in quibus Orichalcum conficitur. Luteas, Fulvas. Rubras micis argenteis nitentes. Ferrugineas quibus tinguntur Fornaces, quæ ex ferro fiunt. Bohemicas friabiles, ex quibus eximuntur Granati.

Apud *Wormium* Porcellana Chinenfis est Argillæ purissimæ species. V. fusè differentem pag. Mus. 3. *Vires*. Omnes Species Argillarum dicit *Avicenna* siccant, astringunt, & abstergunt.

2. Terra Lemnia Offic. Erde aus der Insel Lemnus. Est substantia argillacea, sebacea, pinguis, & ponderosa, ex flavo rufescens. Eructa ex terræ fodinis in Insula Lemno & alibi in Turcia, unde ad nos adfertur. *Vires*. Sanguinem aliquomodo incrassat & astringit, præsertim si particulæ acidiores in Sanguine abundant, nam cum acido effervesceat: Alexipharmaca ac Sudorifica est, alexipharmaca, inhibendo motum Sanguinis Pestilentiali aliquo fermento excitatum; sudores ciere potest con-

strin-



stringendo vasa & sic exprimendo serum aliquod.

A. 3. Ochra Offic. Ocher: gelb / Bergegelb. Est substantia argillacea, coloris flavi, seu lutei-  
saporis astringentis. *Vires.* Siccat, adstringit,  
discutit, excrescentias reprimat. Usus ejus ra-  
rissimus est, & non nisi externus, ac præcipue  
in vibicibus & collisis, tum quoque in tumori-  
bus duris discutiendis. *Schröd.*

4. Terra Silesiaca Offic. Sigillata vulgò, Sie-  
gel-Erde.

Terræ Sigillatæ 9. species apud Pharmacopo-  
las nostros, Druggistas vocant, venales observa-  
vi, 1. *Argillam* quandam seu terram pinguem, ci-  
neream, in orbiculos seu placentulas coactam  
Constantinopoli, unde ad nos adfertur, & cha-  
racteribus Turcicis seu Arabicis inscriptam.  
Hæc (quamvis rarius apud nos inveniatur) spe-  
cies illa est, quæ nostrâ sententiâ usurpari de-  
bet, cum in formulis medicamentorum *Terra*  
*Sigillata* præscribitur, ut quæ Terræ Lemniæ  
veræ vires possideat, ideoque pro ea substitui  
possit, ut Succedaneum. 2. *Terræ Lemniæ* fru-  
stula seu fragmenta pulverisata, & cum mucil-  
lagine gummi Tragacanthæ in massulas com-  
posita. Hæc etiam rarius in Officinis inveni-  
tur. 3. Est Terra quædam pinguis cinerea, Ci-  
molix purpura sc. perquam similis, si non ea-  
dem. 4. Margæ species è fusco flavescens. 5.  
*Bolus Germanica.* 6. *Bolus Armeniaca* vera, sed  
rarius. 7. *Rubrica* quam ochram rubram vo-  
cant Angli, 8. *Cimolia alba*, Hippiatræ & Ve-  
teri-

terinariis *Weisse Kreide* dicta. Hæc pro *terra Samia* vera vulgò venditur, ut suo Loco ostendamus. 9 Ex Officina D. R. B. Terram quandam *Terræ Silesiacæ* titulo accepi è *Rubrica & Cimolia alba* in pulverem redactis & commixtis compositum. Hæ sunt omnes, quas hæctenus observavi *Terræ Sigillatæ* species, quamvis minimè dubitem quin & aliæ multæ inveniantur aquod *Pharmacopolas* fraudulentos in urbe *Londinensi*, quibus imperitos fallunt, credulisque & incautis imponunt. Quocirca liceat mihi fratres & Symmistas *Pharmacopœos* amicè admonere, ut (quod jam antea dixi) quandocunque in *Receptis* quas vocant, *Terra Sigillata* præscribitur, vel primo hîc discriptam, vel ejus loco *Terram Lemniam* adhibeant. Vide *Historias & Characteres Terrarum sigillatarum* apud *Wormium* in *Musæo* à p. 5. ad p. 15. Major pars illarum, sunt varia luta & limi siccati & signati, observante *Cesalpino*.

A. 5. *Cimolia purpurascens* *Offic.* *Braunroht.* Est substantia argillacea, pinguis & ponderosa è cineritio purpurascens. Ex fodinis *Angliæ* eruta est. *Vires.* Usus ejus internus vel nullus vel rarus in *Medicina* est. Externè siccatur & astringit.

A. 6. *Cimolia alba* *Offic.* *Weisse Kreide.* Est substantia argillacea, unctuosâ, pinguis & ponderosa, colore albo. Effoditur è fodinis *Angliæ*. *Vires.* Siccatur & astringit, vel internè vel externè. In placentulas coacta & Sigillo aliquo notata, *Terra sigillata alba* in *Officinis* dicitur.

tur. Eandemque pro *Terra Samia* non infrequenter à *Pharmacopolis* vendi observavimus.

7. *Terra Samia* *Offic.* Erde aus Samos. Est substantia argillacea, sebacea, pinguis, & ponderosa, albi coloris seu potius pallidè ochroleuci, saporis astringentis. Ex *Insula Samo* ad nos transportatur, sed rarò in *Officinis nostris Pharmaceuticis* invenitur. *Vires.* Cum *Terra Lemnia* viribus convenit, cui succedaneum est.

### III. *De Marga.* Mergel oder Steinmarck.

**M**arga, est substantia terrea, friabilis, levis, mediae substantiae inter *Argillas*, & *Cretas* h. e. non ita sebacea & pinguis ut *Argilla*, nec tam plastica ut *Creta*.

A. 1. *Rubrica Fabrilis* *Offic.* Röthelstein. Est substantia terrea, ponderosa, intensè rubra, saporis astringentis. *Vires.* Siccat & astringit. Usus ejus medicus est in *Emplastris vulnerariis* & siccantibus. In *Laterculos* coacta pro *Bolo communi*, *Gemein rohten Bolus* in *Officinis Pharmacopolis* venditur, in *placentulas* coacta & sigillo aliquo signata *Terra Sigillata rubra*, *Röhte Siegel-Erde*, dicitur. *Nostratibus* audit *Ruddle* & *Marking stone*, multis in *Locis* reperitur, in agris *Hereford*, *Hauton*, *Lancast.* *Rutland*, &c.

A. 2. *Terra Tripolitana* & *Tripolis* *Offic.* *Englisches Ocher Gelb*. Est substantia terrea, facile friabilis, coloris citrini, intensi, saporis astringentis. Eruta est ex fodinis: *Vires.* Siccat & astringit, Usus ejus in *Pharmacopœia* vel nullus



nullus vel rarus est: nisi quòd pro distillandis Spiritibus salinis, salibus admisceatur, quò minus ea fluant.

Apud *Kentmannum* variæ Margarum species occurrunt. Candida, pinguis, mollis. Subcinerea, lapidosa, quâ artifices utuntur in effigendis imaginibus. Fulva, crustacea, quæ reperitur in terrâ arenosâ, aurum in se continens. Dura, lutea, arenosa Belgica, quâ Incolæ, sicut aliis in locis, agros stercoreant. Apud *Swenckfeldium* & *Wormium* invenio Margam Saxatilem incarnatam ex Montibus Lybiis & Bohemicis; prodestructionibus, fracturis, & fluxibus; Subluteo colore tingit.

#### IV. De Creta.

**E**ST terra durior, emplastica & candida, non sebacea neque pinguis, & quæ ad linguam promte hæret.

A. 1. Creta Offic. Kreide. Ex terræ fodinis variis in locis effossa. Vires. Siccatur & abstergit, Emplastica est. Usus ejus internus nonnunquam in ardore Stomachi, Cardialgia falsò dicta, Externus in Vulneribus, Ulceribus, &c. siccandis. *Præp.* Calx viva Offic. Ungeleschter Kalck. Est substantia lapidosa ex albo cinerea, facta, ex Creta, ignis violentia in Calcem exusta, saporis acris & mordacis. Usurpatur externè solum in ulceribus sordidis, Cancro, Gangrænâ, &c. Internè siccatur. *Calx extincta.* Offic. Geleschter Kalck. Est Calx viva cum sufficienti quantitate Aquæ soluta. Vide cap. de Lapide Calcario in Sect. Sextâ de Lap. minus pretiosis.

2. Terra

2. Terra Melitæa *Offic Sigillata Sancti Pauli*, vulgò. Erde von Maltha. Est substantia cretacea, ponderosa & emplastica, colore exalbido, sapore astringenti. In tabellas coacta, & capite Divi Pauli cum vipera signata ex Insula Melitæa ad nos transportatur, sed rarò aut nunquam in Officinis Pharmacopolarum nostrorum invenitur. *Vires.* Ut in externa facie ita & viribus cum præcedente convenit.

*Melitenfis etiam terræ*, mentionem facit Schröderus in sua *Pharmacop. lib. de Terris*: inquit Paulus Ammannus, quæ an virtutis sit Alexipharmacæ, & quidem tantæ, quantæ vulgò æstimatur, breviter videndum. *Propriè terra Melitenfis* dicitur, corpus illud globosum, quod in Spelæo S. Pauli in Insula Maltha reperitur vel effoditur; *impropriè* verò corpus aliquod petrosum, linguam serpentinam referens, & huic glebæ adhærens. De utroque referunt Historici sequentia; Postquam Apostolus varia edidit in Insula Maltha miracula, statim omnia venenata animalia suam vim nocivam exuerunt, adeò quidem, ut hodienum nulla venenata animalia ibidem reperiantur, imò si quæ forsitan importentur, statim venenum, & lædendi potentiam perdunt, ex eo, quòd, cum Apostolus Melitæ famenta in ignem conjiceret, viperâ manui adhærente, omni reptilium generi maledixerit, terræ contrà benedicendo. Hinc tanta virtus terræ Melitenfi & glossopetris attributa. Ast quoniam hæc præter narrationem factam aliàs nullibi leguntur, vel firmo etiam experimento

stabiliuntur, fidem hanc historicam tam facile in nostra Praxi vix admittimus, præprimis cum ipse *Niederstedius* in *Descript. Ins. Melit.* p. 25. hæc de re dubitet. Accedit, quòd glossopetræ falsò credantur esse viperarum linguæ, miraculò Divi Pauli petræfactæ, inferius hæc pluribus demonstraturus.

Cretas diversimodè coloratas enumerat *expertissimus Kentmannus*, 1. Cretam Argentariam, in quâ micæ argenteæ internitent. 2. Luteam mollem, quæ facilimè lineas ducit. 3. Cæruleam, quæ fabris in pingendis parietibus in usu est. 4. Viridem duram. 5. Nigram mollem & duram, argenteis maculis nitentem. 6. Fabrillem candidam, ex quâ *Cataloni* ad *Matronam* parietes & muros extruunt, undè etiam *Algeriæ* portus extructus dicitur. Apud *Wormium* invenio Cretam *Umbriam* coloris fusci, pictoribus maximè expetitam, eâ enim Umbras in picturis exprimere solent.

Terra Japonica improprie sic dicta non huius classis est, non enim præparatio Terræ Indicæ, sed Vegetabilis seu fructus *Cassu* vel *Catsu* (an *Acajou*?) dictæ. V. *Tractatus Anglicos* *Wobentliche Memorials*.

A. 3. Plumbum nigrum *Offic.* Nigrîca fabrilis *Men. Plin.* In Creta nigra mollis & dura argenteis maculis nitens *Kentmann?* *Gediegen Bley.* Invenitur in fodinis. Mollis est, sed tamen consistentiæ firmioris, lævis & splendens, non petrosa, in frustra variæ magnitudinis divisa. *Vires* Refrigerat, siccatur, repellit. *Ullus* præcip. adver-



adversus strumas, tumoresque frigidos & phlegmaticos.

NB. Optima censetur quæ invenitur in Anglia, quæ ex Hispania affertur fragilis est, pessima, quæ ex India Orientali advehitur.

---

## SECTIO TERTIA.

### *De Sulphuribus Medicamentosis.*

**S**ulphur est resina seu terræ pinguedo inflammabilis, sitque ex perittomate macrocosmico pingui, respondente in Phytologia, Oleis, & Resinis: in Zoologia, pinguedini, axungiaque. Sulphur in Oleo solubile est, & gravem odorem præbet, ex Pyrite efflorescere videtur, observante Schwemkjeraius.

#### 1. *De Sulphure.*

**E**st Resina sive pinguedo terræ chalcantosa, aciditate gravida. Schröd. pag. 501.

Sulphur nativum & vivum Offic. Lebendiger Schwefel. Ex terra effoditur, purum, solidum, interdum scissile & ignis expers. Vires. Calidum & siccum est, pectori dicatum; aperit, incidit, putredini, veneno, venenatorumque Animalium moribus resistit, provocat sudorem, &c. Hinc conducit in Phthisi, Tussi, Asthmate, Peste, Pestilentialibusque Febribus, Extrinsecus discutit tumores duros, sanat Lichenes duros, Pruritus, &c. Schröd. Præp. lunt.

1. *Sulphur factitium* Offic. Gelschter oder getödrer Schwefel.

**Schwefel.** Vel ex Sulphure vivo impuriore vel ex Pyrite vi ignis educitur. Est substantia flava, pinguis, ponderosa, condensata, facile inflammabilis, luculenter ardens, fumumque magis cœruleum halans. 2. *Sulphur Caballinum* Offic. Roß Schwefel / schwarzer Schwefel. Nihil aliud est, quàm fæces è coctione Sulphuris vivi impuriore relictae & in urceos admixtis nonnunquam squammis martis transfusæ. 3. *Sulphur commune.* Gemeiner Schwefel Ex Sulphure vivo & Resina communi fit & in rotulas coactum in Officinis ab Aromatopolis venditur.

Apud *Wormium* Sulphur fossile Vivum seu Nativum multiplex est. 1. Planè aureum instar Crytalli pellucidum. 2. Purum ex Goslariæ fodinis. 3. Impurum & fixum è montibus ardentibus. 4. Subviride nativum Suecicum. Factitium vel ex aquâ decoquitur ad *Budam*; vel ex effossâ glebâ coactâ sublimatur & concrescit variâ figurâ. Ex Pyrite variæ excoquuntur & fiunt quam plurimæ Sulphuris species. V. *Kentmannum* p. 20, 21.

## II. De Arsenico.

**Arsenicum** sive Fulige, est succus Mineralis pinguis, inflammabilis. *Schröd.* p. 489.

Auripigmentum Offic. Goldgelb Operment, Hüttenrauch. Est substantia metallica, vel potius Minera Auri, ut vult Doctissimus *Martinus Listerus M.D.* coloris ex viridi flavescentis cum aureis micis, saporis acris, odorisque ingrati. Effossa ex fodinis. *Præp.* 1. Arsenicum album Offic.

**Offic.** Weisser Arsenick / oder Ragen Pulver. Est substantia metallica albicans, facta ex Auripigmento cum Salis communis ana p.æ. sublimato, saporis acris & exurentis. 2. *Arsenicum rubrum*, Risigallum & Sandaracha Græcorum **Offic.** Citrinum Pharmacopolis. Rohter Schwefel / Feuer-Schwefel oder roth Operment. Est substantia matallica è flavo rubescens, saporis acerrimi & exurentis, facta ex Auripigmento ad rubedinem excocta; nativi etiam species sunt apud Autores. *Vires.* Inter Venena loco haud ultimo Arsenicum recensetür, nec immerito.

3. *Aurum* **Offic.** Gold. Quod non solum ex hac Minera fusa elici possit ut testatur *Plinius*, sed frequentissimè in parvis granulis inter arenulas multis in locis invenitur. Metallorum cunctorum est nobilissimum, solidissimum, colore fulvum, compactum ex principiis summè digestis adeoque fixis. *Vires.* Balsami seu calidi nativi cordisque summum corroborans nonnulli esse volunt sed credat quicunque vult. *Præp.* Aurum foliaceum geschlagen Gold. Eodem modo factum quo Argentum foliatum. Prostat ornatûs gratia & ad Pilulas obducendas.

Auripigmentum apud pictores in usu est; item in causticis medicamentis locum habet.

Æs Arsenici albi fumo tingitur argenteo colore.

### III. De Bitumine.

**B**ituminis nomen generaliter denotat quodcunque Minerales pingue. Unde & diversas sub se Species comprehendit, concretas vel liquidas.



A. 1. Terra ampelites *Offic.* An Lapis Obsidianus *Cesalp?* Succinum nigrum *Schwenckfeldi?* Erd-Harz / Harz / Erde / Harz / Pech. Bituminis terreni genus est fossile, lapideum, friabile, nigrum. *Vires.* De usu ejus medico nihil adhuc quod addam habeo. Vermes, vitium oculos rodentes, enecat. V, *Wormii Mus.* pag. 31.

2. Gagates & Succinum nigrum *Offic.* Bergwachs. Est genus terræ nigræ lapideæ crustosæ, adeo Bitumine prægnans, ut Bitumen redoleat, & accensum picis terè modo flagret, nigerimumque emittat fumum. Differt à Terra ampelite, quod hæc nec flammam emittat nisi foliis excitetur, nec Bituminis odorem spiraret; Gagates verò igni admotus flagrat, odoremque bituminis exhibet. *Vires.* Emollit, discutit, Colicum morbum sanare creditur, &c. *Schröd.*

3. Asphaltos & Bitumen Judaicum *Offic.* Zuden Pech. Est sebum seu resina Macrocosmi, picis instar durum &c. Supernatare primum aquis conspicitur seu lacubus, hinc ad littora propulsum concrescit, densatur, tenacissimumque redditur. Præfertur reliquis quod Mortui Maris genitura est. Ejus verò probatio est, ut purpuræ modo splendeat (scilicet in nigrore sitque ponderosum & validum, odorem vibret. *Vires.* Discutit, glutinat, emollit, Sanguinem coagulatum resolvit, & Menses ciēt. Adulteratur cum Pice, unde quod nigrum & sordidum vitiosum est. Rarissime in Officinis nostris reperitur, imo ob dese-

defectum Asphalti genuini, cogimur uti mixtura picis & bituminis Pissasphaltos dicta.

4. *Naphta Offic.* Est colamen bituminis Babylonii, consistentiâ liquidum, ignis rapacissimum, colore nunc albo, nunc nigro. Hæc quoque in Officinis nostris rarò aut nunquam invenitur ideoque loco ejus Petroleum usurpare solent. *Vires.* Cum Bitumine viribus convenit. Sunt qui Camphoram veterum per sublimationem ex Naphta factam esse volunt, teste *Agricola*. Alii sunt qui Naphtam & Petroleum unum & idem esse contendunt, verum cum Naphta quid sit nondum certo sciamus, non audemus determinare.

5. *Petroleum Offic.* Oleum Petræ vulgò. *Stein-Dehl* oder gemein *Peter-Dehl*. Est liquamen pingue, liquidum, colore nigro, odoris fortis. Duplex est, vel Nativum, quod ex Petris & saxis effluit, vel Artificiale destillatum ex carbonibus fossilibus. *Vires.* Calefacit & siccatur, tenuium partium est, digerit & resolvit, cerebro & nervoso generi confert. *Schröd.* Petroleum varii coloris est, candidum præstantius.

6. *Oleum Terræ Offic.* Erd-Dehl. Duplex est, vel rubrum, vel nigrum. Rubrum ex India Orientali adfertur, estque coloris pellucidi rubicundi, odoris fortis Petroleum æmulantis, sed gratioris, inquit *Schöderus*. Attamen nobis à Petroleo vel non differt vel Officinis nostris incognitum est. Nigrum est *Pisselæon*

*Indicum* & ex India Occidentali advehitur. *Vires.* Arthritidi vagæ maximo est solamini inunctum. *Schröd.*

Hæc Bituminis genera non nisi secundum magis & minus differunt, ut quidam statuunt; Ita ut pars ejus spirituosior & subtilior sit *Naphtha*, huic proxima *Petroleum*, crassior & sæculenta *Asphaltum*; non secus ac videmus ex *Succino* per destillationem primò elici spirituosum & limpidum oleum, quod *Naphtam* repræsentat, mox oleum flavum & crassius, quod *Petroleum* simulat; demùm materiam nigram & sæculentam, quod *Asphaltum*.

7, *Succinum* & *Carabe Offic.* *Alstein / Bernstein.* Nihil aliud est, quam succus bituminosus seu *Resina* terræ optimè digesta, exinde iu mare tradducta, atque ibidem præcipuè concreta. Dum bituminosa illa substantia adhuc liquida est, varia sese involvere solent, ut *Muscæ*, &c. Duo *Officinis* nostris eo nomine veniunt, *Album* sc. & *Flavum* seu *Citrinum*; utrumque quamvis laudibus suis haud destitutum sit, attamen præstat *Album*, utpote magis digestum. Eligendum id ipsum candidum, sincerum, suave, fragrans. Huic succedit *Flavum*, quod præstat pellucidum, quodque præ aliis attritu, suavemhalat odorem. *Vires.* Calefacit, exiccat, roborat, adstringit leniter, *Capiti* ac *Utero* imprimis dicatum est, Hinc adhibetur utiliter in *Catarrhis*, *Epilepsia*, *Apoplexia*, *Lethargo*, *Vertigine*, *Suffocatione* ac *Inflatione Matricis*, profluvio *Sanguinis* ac

Semi-



Seminis quod ad naturalem statum reducit:  
In fluore albo mulierum. Cæterum globuli  
è Succino ad Oculorum defluxiones miro suc-  
cessu auxiliari dicuntur, annexi occipitio. Usus  
præcipuè albi, tam internus quàm externus esse  
potest. *Schrod.*

Pro Succini Historiâ V. *Gæbelium*, *Hartman-*  
*num*, *Wigandum*, *Hessum*, &c. qui de illo fusè  
scripserunt.

8. Ambra grisea *Offic.* grauen Amber. Duo  
in Officinis nostris Pharmacopolis eo nomine  
veniunt, Grysea scil. & Nigra; optima cense-  
tur Grysea, seu coloris cinerei à sordibus purga-  
ta, odorata, lævis, quæque acu calidâ leviter  
perfossa succum pinguem ac odoratum, resudat,  
In littore ex mari ejecta invenitur. Sed quid  
sit inter Authores controvertitur. Nobis au-  
tem bituminis quoddam genus esse censetur,  
ex fontibus ac alveis maris ad littus eructatum.  
*Vires.* Calefacit, siccatur, resolvit, Cor Cere-  
brumque roborat, spiritus vitales ac animales  
sulphurea sua ac suavi exhalatione suscitatur refi-  
citque, &c. *Schröd.* Ambra Nigra, *schwarzer*  
*Amber.* Ex India Orientali ad nos transpor-  
tatur, de qua maxima est Authorum inter se  
dissensio. Sunt enim qui veræ Ambrae nativæ  
speciem faciunt, quæ reliquis sit imbecillior.  
Alii Factitiam statuunt ex Moscho, Zibeto, Li-  
gno Aloës, Styrace & Labdano, quomodo  
Pharmacopolas nostros Anglicanos eam con-  
ficere, certior factus sum, quæ facilis cognitu  
est, odore scil. quo res ex quibus confecta est

prodit, tum quoque colore, & quod aquæ immposita citius mollescat, quàm nativa.

Pro Historiâ Ambræ-Griseæ V. *Tractatus Anglicos*, wöchentliche Memorials dictos. Item Ephem. German. & D. Trapham de *Insulâ Jamaicâ*. Conf. etiam Fallopii & Klobii Libell. de *Ambrâ*.

A. 9. Halcyonium & Spuma maris *Offic. Seeschaum*. Oleosa quædam aut bituminosa & tenuis substantia est, maris superficiei innatans, verùm unde ortum habeat mihi hætenus incognitum fateor. Nonnulli ab excrementis lacte seu spermate piscium aliorumque marinorum animalium partibus originem ejus deducunt: Alii ab aliis animalibus, quæ gelatinam referunt Zoologis *Zoophyta* dictis: Alii è succis plantarum marinarum: Alii denique in quorum sententiam maximè propendeo, mineralibus bituminosis submarinis ortum suum debere arbitrantur, effluviis maris æstu & agitatione in spumam conversis.

## SECTIO QUARTA.

### *De Salibus Medicamentosis.*

**S**alia nihil aliud esse videntur, quàm corpora mineralia pellucida, in aqua solubilia, ac in crystallinam formam coagulabilia. Salia quæ medicusui inserviunt, adeoq; preparatis inde parandis materiam suppeditare apta sunt, triplicis quidem sunt generis pro triplici scilicet mundi regno, Minerali, Vegeta-

tabili, Animalis: attamen hoc loco non nisi de Mineralibus agere convenit.

NB. Titulus cum rebus subjectis, inquit *Aulus Ammannus* non convenit accuratè, nisi mechanicè. Nam e. g. *Vitriolum* & aliæ species Salis hic enumeratæ non tam sunt Salia, quàm Metalla ipsa, soluta cum totâ suâ substantiâ. Nam si quis vel *Cupri* vel *Ferri* metalla in *Aqua Forti* solverit, illa, abstractò menstruo nonnihil, convertuntur in *Vitriola*, & denuò violentiori igni commissa, in pristina Metalla redeunt. Porro si quis vel *Auri* vel *Argenti* metalla in *Aqua Regis* vel *Aqua Forti* solverit, illa evaporato menstruo aliquousque, convertuntur totaliter in *Vitriola*, & denuò violentiori igni commissa in pristina Metalla, eodem pondere eademque substantia redeunt.

### I. De Sale Communi.

**S**AL communis Offic. *Küchen-Salz*. Nihil aliud est quàm salugo Aquæ salis Fontanæ, quæ humiditatis aqueæ evaporatione inspissata in granula hexædrica concrevit, colore albo. *Vires*. Eisdem viribus cum Sale marino pollet. NB. In culinis nostris præter hunc *Salem* non rarò utimur Sale ex aqua marina cum Sale marino coddione facto. Sal deterius notæ ad carnes & pilces condiendos adhiberi solet. V. A. quam marinam.

### II. De Sale Gemma.

**S**AL Gemmæ Offic. *Steinsalz*. Est substantia CrySTALLINA hexagona, quæ in fodinis lapidum



dum invenitur, saporis acris & falsi. Ex Italia & aliunde ad nos transvehitur. In minori Poloniâ Salem instar ingentium saxorum, adeo duritie lapideâ solidum, ferro exscindi constat ut nec dum molâ teratur ad hominum usum sed ex illo domos & oppida ædificari. V. *Croemerum de Poloniâ. Vires.* Hoc etsi easdem vires cum Sale communi obtineat, substituique eidem queat, rarioris tamen usus est in Praxi Medica; crebrioris in Chymica, ubi in Solutionibus Metallorum Sali communi antecellit. Commendatur tamen peculiariter, *Foresti* experientiâ, ad stercora dura eliquanda, adeoque ad Colica tormina arcenda. *Schröd.*

Sal indicum *Offic.* De quo mentio fit non apud veteres tantum, sed etiam neotericos, sed quid sit non auserim determinare, nam in Officinis nostris nunquam invenitur, nec unquam quod sciam in nostras regiones adfertur, ejusque loco Sal Gemmeum in Medicamentis recipitur. NB. Sunt qui peculiare genus Salis Fossilis faciunt; alii, qui non esse Salis genus, sed Saccharum, Salis ob similitudinem nomine insignitum contendunt.

### III. De Sale Nitri.

**S**AL Nitrum *Offic. Salpeter.* Est substantia CrySTALLINA, alba, saporis acris & amari-cantis, figuræ pyramidalis ex terra pingui excocta. Eligendum Nitrum est CrySTALLINUM, purum. *Vires.* Vim diureticam obtinet, bilem temperat, sitim sedat, & malignas sanguinis Phlogoses suppressit, dolores mitigat. Ful-lones

anes maculas vestium eo abluunt. Insectos cum eodem coquunt lanas, ut sorbeant colores.

Nitrum Antiquorum quid fuerit non auesim determinare, Recentiorum Nitrum Sálne Fossilis an Animalis sit, à multis nunc dierum controversitur. Qui Animalis originis eum esse volunt, affirmant nullibi in India (unde maxima ad nos copia adfertur) quam in locis illis quos *Vespertilioes maximi* frequentant, inveniri. Sententiæ etiam suæ favere existimant, quòd qui in Anglia literis Regis patentibus Salis Petræ conficiendi jus habent, terras illas omnes circa Londinum in quas latrinarum stercora projici solent, annuo pretio conduxerunt. Ex altera parte qui Nitrum Recentiorum, Salem fossilem esse opinantur, aquas pluvias terram perluentes in causa esse volunt, quòd non ubique inveniatur. Quod ad me attinet, quamvis agnoscam Salem Petræ in Columbariis locisque consimilibus copiosissimè inveniri, observavi tamen Salem quendam nativum in vetustis areis terrenis, locisque ejusmodi opacis, longè diversum à Sale calcario ingeniosissimi viri D. Martini Lister, M. D. qui ibidem etiam invenitur, eaque propter cum eo à nonnullis confunditur, qui & figura sua & sapore & deflagrandi modo, aliisque accidentibus, cum Sale Petræ communi exactè congruebat. Apud Kentmannum invenio Nitrum candidissimum plumosum, & stalacticum ex parietibus, & cellariis, Flavum plumosum in cellariis; Nitrum etiam

etiam efflorescens ex terrâ nigrâ ; Item *Sa-  
niter* quotidiani usus in culinariis.

Pro modis conficiendi Nitrum, V. *Histô-  
riam Regiæ Societatis. Item Transact. Philosoph.  
N. 6. & Lazarum Erckerum. Cont. etiam Penco-  
tum, Clarck, Mayow, &c.*

NB. *Sal petra* prout frequenter ex India O-  
rientali ad nos advehitur. coloris est canescen-  
tis & in granula concretus & *salis petra* dictus  
inque culinis nostris in frequenti usu est. Qu-  
in Anglia depuratus, duum est generum, 1. In  
massas coactus, qui scilicet figura irregulari  
doliilateribus adhærescit. 2. Crystallifatus,  
qui in dolii medio, in crystallos ut vocant, fi-  
guræ regalis concrevit. Est autem uterque  
candidus.

#### IV. De Alumine.

I. **A**lumen rupeum *Offic. commune vul-  
gò. Gemein Alaun.* Est substantia alba  
Crystallina, saporis acris, urinosi, austri & ad-  
stringentis: Invenitur vel in venis per se, vel  
excoquitur ex aquis Mineralibus; vel ut in An-  
glia, ex lapidibus seu Mineris aluminosis ustis  
(addita Urina, & Kali) extrahitur; ex Pyrite  
aluminoso, observante *Swencfeldo de fossil. p. 362.*  
*Vires.* Exiccat, adstringit, incrassat, &c. Usus  
Aluminis crudi præcipuus externus est (quam-  
vis ab Empiricis & interne pro febrifugo ex-  
hiberi soleat,) ac imprimis in Angina & Colu-  
mella laxata. *Præp.* Alumen Zuccarinum, &  
Saccharinum, *Offic.* Ex Alumine rupeo, albu-  
mine ovorum & aqua rosacea fit. Alumen



magni & varii usus est apud Aurifices, Tinctores seu Infectores, Librarios, Coriarios, &c.  
*Wormii Mus*, p. 23. 24.

2 Alumen Rochi Gallis. *Offic. Romanum*  
*quibusdam*, *Rog. Maun.* Rupeo simile est, sed  
 pallidè rubens. Ex Italia, Smyrna, &c. ad nos  
 transportatur. Conficitur eodem modo quo  
 rupeum, sed sine additione Urinæ & Kali, ut  
 nos monuit eruditissimus D. *Tancredus Robinso-*  
*us* M. D. in literis ad me datis. *Vires.* Cum  
 superiore viribus convenit.

Pro modis conficiendi Alumen V. Clarissimum  
*Raium de Vocabulis Anglicis inusitatis*, p. 201.  
*tem Transact. Philosoph. N. 142.*

### *V. De Borace.*

**B**Orax, Chrysocolia factitia, Santerna Plinii  
 & Tincar *Offic.* Borras. Est substantia  
 Crystallina alba, glaciei instar & Alumini non  
 dissimilis, saporis acris, salinis, & Nitrosi. Du-  
 plex est, *Nativa* & *Factitia*; *Que Nativa dicitur*  
*facta est ex Chrysocolia nativa, calcinata, soluta, cocta*  
*& Crystallifata.* Factitia etiam duplex est, vel sim-  
 plex, vel composita; simplicem conficiunt ex Nitro  
 & Urina puerorum invicem commistis & coagulatis.  
 De composita vide Schröderum p. 280. *Vires.*  
 Vim habet Urinam, Fœtum, Secundinas, &  
 Menses pellendi, & ad Venerem stimulandi.  
 NB. Chrysocolia nativa tantum in Ærariis Metal-  
 licis invenitur & solum ex ære fit. Si quandoque  
 in Aurariis, Argentariis, aut Plumbariis invenitur,  
 vene illorum cum ære miscentur. Utuntur illa Au-  
 rifices & Pictores. Bonitatem ejus ex colore & vi-

res aestimant, nam nativa omnis viridis est & ad saturitatem, quoque magis ad Smaragdi accedit viriditatem, eo melior censetur; alia dilute viret, quæ pessima.

## VI. De Vitriolo.

*V*aria sunt ejus genera, pro natura Mineræ, quantum in se continent, differentia. Præcipua autem quorum hoc tempore est existimatio, sunt.

1. Vitriolum cœruleum seu Romanum Offic. blau oder Römisch Vitriol. Est substantia Crystallina, cœrulea, seu Saphiri instar, compacta, ut saccharum candum, saporis acidi, austeri, acris & adstringentis, fitque vel ex Solutione & Crystallizatione Cupri: vel ex Cypro aut ex India Orientali ad nos adfertur. *Vi-*  
*res.* Calefacit, siccatur, adstringit vehementer, constipat, vomitum ciet, Lumbricos fugat. *Schröd.* Basis est Pulveris Sympathetici Digb. Scabiem & lepram sanat.

A. 2. Vitriolum viride Offic. Grün Vitriol. Est substantia Crystallina, herbacei coloris, magis granulatum, grumosumque instar Salis communis, saporis præcedentis, in Anglia variis in locis facta, ex solutione & Crystallizatione quorundam lapidum ferrugineorum cum aliqua parte ferri, V. *Raium* de vocabulis inusitatis, pag. 197. Item *Transact. Philosoph.* N. 142.

3. Vitriolum album Offic. Weiß Vitriol, Salzigstein. Est substantia alba granulosa instar Sacchari albi concreta, saporis præcedentis,

& ex Germania ad nos adfertur. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Hic mentionem aliquam facere libuit colcotharidis, hoc est Capitis mortui Vitrioli, Chalcitis vulgò dicti, quia recipitur in nobilissimam illam Theriacæ Andromachi Offic. Venetæ vulgo, compositionem, ut nigro colore inficiat istam opiatam, inquit Ammannus. Negantium ratio sequens est; quòd non sine suspitione malignitatis vel corrosionis ingrediatur Theriacam, cum sit escharotica & caustica; adeò meo quali iudicio, præstaret illud in prædictâ Compositione planè omitti. NB. Colcothar aëri expositum, nobiliores exinde virtutes attrahit; notumque est, ex praxi Medicinæ quotidiana, quòd Dysenteriam Sympatheticè curret.

Goslarie quoddam Vitriolum album reperitur stirie figurâ, translucidum instar Crystal-  
li, hoc præ reliquis usum habet in Collyriis; præparatur quoque ex eo in aquâ dissoluto & coagulato Vomitivum eximium, de quo V. Crollium.

Vitrioli magnus usus est in Aquis stipticis conficiendis, in artetinctoria & atramentosa. V. Caneparium de Atrament.

Venas seu Mineras Vitrioli diversimodas Vid. apud Kentmannum in Catalogo & Swenckfeldum de fossil. qui Pyritas Atramentosas vocat.



---

 SECTIO QUINTA.

## De Fossilibus Metallicis Medicamentosis,

**M**ineralia sunt ea quæ non sunt Vegetabilia nec Animalia, attamen in hac Sectione agemus tantum de fossilibus Metallinis, i. e. Metallis perfectis & imperfectis. Quod ad alia Mineralia, attinet in prioribus Sectionibus ea tradidimus. Hæc dividi possunt in tres classes, scilicet, Mineras, Metalla, & Metallis affinia.

---

## I. De Mineris

**M**inera est terra sive Materia, ex qua Mineralia & maxime Metallica fiunt. Hæ Mineræ in infinitum ferè variant, quoad colores, figuras, mixturas, texturas, aliaque accidentia; pro quibus consulantur Musæa Curiosorum, & Catalogi Fossilium, præsertim verò illi à Kentmanno, & Swenckfeldo editi. Omnium Mineralium Pyrites feracissima esse videtur, omnibus ferè fodinis invenitur, omnia fere Metalla, Sales, & Sulphura ex utero suo ditissimo effundens; pro lusibus Piritis præter duos supra laudatos Autores V. Joh. Baubinum de Lapidibus figuratis.

## I. De Magnete.

**A** Magnes Offic. Mer. Pin. Magnet: oder Egelstein. Lapis est Polos Mundi ostendens, ferrum chalybemque attrahens, præsertim

tim ferreo circulo armatus. Reperitur circa ferri fodinas in diversis locis. *Vires.* Hæmatitis habet vires teste Galeno, adeoque astringit, sanguinemque sistit, ustus crassos & melancholicos humores educit, sed usus est rarioris. *Schrod.* Contra Hernias datur *Hoffman.* V. *Gilbertum.* de Magnete.

Magnetis Mineras seu Venas diversimodè coloratas & mixtas, V. apud *Kentmannum.*

## II. De Hematite.

**H**æmatites *Offic.* Nöchter Bluststein. Substantia est Metallica, mediæ consistentiæ inter lapidem & terram, ponderosa, fractus, instar ligni petrefacti fibras oblongas habet, & in modum acuum acutas, coloris obscure rubescens, saporis terrei & adstringentis. In ferri fodinis nonnunquam reperitur, cujus Minera quædam est, ex eo enim excoquitur ferrum, teste *Schrodero* & *Boyleo.* Optimus habetur friabilis, saturato colore rubro, qui per se durus est & æqualis, nulla forde admista, aut venis intermediis. *Vires.* Refrigerat, exiccat, adstringit, glutinat, adeoque convenit Ulceribus Oculorum & Pulmonum, oculis lachrymantibus, Sanguinis expuitioni medetur, profluvia, v.g. Hæmorrhagiam uteri, alvi, &c. compescit. *Schrod.* Hæmatitidi affine esse videtur.

Plumbum nigrum nostras Westmorlandicum, Nigrica fabrilis *Merret.*

## III. De Smiri.

**A.** Smyris & Smerillus *Offic.* Smiris *Mer.* Pin. Schmirgel. Lapis est ferrugineus, pon-

ponderosus, colore ad nigredinem tendente, adeò durus, ut gemmarii eo ad gemmas scalendas, & arma expolienda utantur. *Vires.* Abstergentem habet facultatem, adeò ut ad gingivas humentes, & dentifricia Smiris pulvis adhibeatur, *Dioscorid.*

Hæmatitidis species esse videtur, & in ferri-fodinis inveniri solet; de usu in Mechanicis Vid. *Scriptores de Lap. & Gem.* Item *Wormii Mus.* pag. 65.

#### IV. De Cinnabari.

**D**uorum generum Officinis in usu est, alia *Nativa* sive *Mineralis*, alia *Factitia*.

Cinnabaris *Nativa* *Offic.* Berg-Zinober. Est substantia Metallica seu potius Minera Mercurii, ponderosa, striata, friabilis, rubicunda, cum striis argenteis. Reperitur in diversis Europæ locis v. g. Ungaria, Germania, &c. Eligenda quæ gravida Mercurio & Sulphure præstantioribus, adeoque Ungarica, utpote quæ auro aliquantulum pollet. *Vires.* Ullus ejus internus, præterquam quòd Antiepilepticis nonnunquam permixta deprehendatur, quod sciam, nullus est. Exterius autem adhiberi potest ad sanandam Luem veneream, scabiemque in, Suffimentis, &c. *Schrod. Præp. Argentum vivum, Mercurius & Hydrargyrum Offic. Quecksilber.* Est Nativus, de quo hic, & Artificialis, i. e. è Metallis extractus. Nativus etsi nonnunquam per se, ipsa natura operatrice, separatus inveniatur, plerumque tamen ex Cinnabari, vi ignis hunc in modum elicitur.

Ollam



Ollam Cinnabari implent, eamque ollæ alteri, interpositâ laminâ ferreâ, ore converso imponunt, lutoque circumlito, vi ignis circularis Mercurium vivum ex olla superiori in inferiorem defluere faciunt, ad modum quo destillatio per descensum dicta perficitur. Censetur bonus, vel qui per retortam propulsus nihil recrementi relinquit; vel qui in cochleari argenteo evaporationi super prunis expositus, maculam in cochleari relinquit flavam, aut albicantem, non nigram aut fuscam. Pro modis separandi Mercurium è Cinnabari Nativa Vid. *Transact. Philosoph.* N. 2. & N. 45. *Vires.* Internè mundificat Sanguinem ab inquinamento, præcipue Venereo: Fugat ac necat Lumbricos, difficilem promovet partum &c. Externè inunctus sanat Scabiem omnis generis. Fugat atque necat Pediculos, resolvit duros tumores, &c. Imò quoad ejus præparata, nulla res in Officinis est, si Antimonium excipias, ex qua major Medicamentorum supellex elici possit, quàm ex Mercurio. Suppeditat enim purgantia, vomitoria, sudorifera, mundificantia vulnera, Acrimoniam lenientia, ut patebit in formis Medicamentorum inde paratis. Usus Mercurii crudi internus & externus est. Intrinsecus tamen rarius adhibetur, extrinsecus sæpius, &c. *Schrod.* Cinnabaris *Factitia Offic.* Gemachter Zinnober. Fit sublimatione Mercurii cum Sulphure, & non est hujus loci. NB. Cinnabaris *factitia* frequentissimè in Officinis reperitur, *Nativa rarius.* Mercurii usus varius in

Mechanicis & Metallicis. Vid. *Lazarum Erckerum*, *Alonsum Barbam*, *Acostam*, &c. Vid. *Michaelem & Hofmannum* de *Cinnabari Nativâ*. Item *Tilingium*, *Clauderum*, &c.

### V. De Cobalto.

**C**Obaltum Offic. *Cadmia nativa*, & *Metallica* quibusdam *Wormii* p. 128. *Kobalt oder Fliegen-Pulver*. Minerale terreum est, colore ferè nigrum, Antimonio haud absumile, æris vel argenti particeps. Foditur copiosè haud procul *Gosslaria*. In *Officinis nostris* ignotum est. *Vires*. Vi caustica & erodendi pollet tanta, ut fossorum manus & pedes exulceret; adeoque inter *Venena* recensetur, quippe intus haustum *Animalia* quæque perimit. *Schröd.* Vid. *Websterum de Met.* 340, 341. Flores dicti *Zaffery* ex hoc Minerali sublimantur, pro tingendo cæruleo colore.

### VI. De Marcasita sive Bismutho.

**M**arcasita sive Bismuthum Offic. *Weissmuth*. Excrementum est Metallicum, in generatione Metallum ex portione aliqua, ad generationem metalli inepta productum, inque corpus Minerale albicans, durum ac fragile mutatum. *Vires*. Recremento *Plumbi* respondet, *Ufus* rarissimus est & non nisi externus. *Schröd.*

*Pyriten lapidem à Mauritanis Marcasitam* appellant moderni; multâ varietate reperitur, quoad colorem, figuram, mixturam cum metallis lapidibus, cæterisque fossilibus, variâ proportionem miscetur cum *Ferri*, *Plumbi*, *Stanni*, *Argenti*, *Cupri* seu *Æris*, & *Aluminis Metallo*,  
item

item similiter cum ipso silice nigro, cum carbone fossili, cum lapide calcario, cretaceo, &c. Vid. Cap. de Mineris.

## VI. De Sory, Chalcitide & Misy.

Sory, Chalcitis & Misy Mineralia sunt inter se Origine & Viribus conjunctissima. Nimirum ex Sory fit Chalcitis, ex hac Misy: videatur Matthiolus in Dioscoridem, qui inter recentiores primus quid illa sint demonstravit. Verum adhucdum in Officinis nostratibus ignota sunt, & in usum non veniunt, quæ Chalcitis loco Colchotar seu Vitriolum calcinatum Theriacæ immiscent, cum tamen genuinum Sory, Chalcitis & Misy, monente eodem Matthiolo, in Ducatu Brunsvicensi inveniantur.

1. Sory Offic. Est Minerale lapidosius & vehementius compactum quàm Chalcitis aut Misy, sed & crassissimum, fricatum scintillas Miseos emittens.

2. Chalcitis Offic. Minerale est æri simile, friabile nec lapidosum, Sory tenuius, Misy verò crassius, tractu temporis ex Sory factum.

3. Misy Offic. Minerale est, aurum colore imitans, aureisque scintillis dum frangitur, splendens, natum super Chalcitim & ex Chalciti, non secus ac Ærugo nascitur super Æs & ex Ære, efflorescentia enim Chalcitis est. Vires. Adurunt & Escharas efficiunt, attamen & non nihil quoque adstringunt. Differunt tamen inter se tenuitate & crassitie. Schröd.

Pro hisce consul. Kentman. pag. 15, 16. & Wormii Mus. pag. 26.



## II. De Metallis Affinibus.

**I**Nter Mineras & Metalla ponimus Metallis finitima, quæ si Semi-Metalla appellare libet, non magni refert, & ad hunc locum pertinet Argentum Vivum, sed quoniam Minera ejus Officinalis etiam est, ad ea non separandum duximus.

### De Antimonio.

**A**Ntimonium Offic. Mer. Pin. & Spiesglas. Substantia est Metallica, solida, ponderosa, friabilis, plumbei coloris, cum striis longis, splendentibus. Eruitur ex Minera variis coloribus & in forma pyramidali effusa. Variis in regionibus eruitur Minera Antimonii, maximè tamen laudatur Ungaricum & Transylvanum, utpote quod Sulphure puriori dotatum aurique minera imbutum est. Artifices variis modis bonitatem explorant. Quidam Chartæ luteo colore tinctæ, denteque apri ritè lævigatæ id affricant, certitudinisque notam, rubram lituram, inductione illa post se relictam statuunt. Alii benè pulverisati, drachmas aliquot fortissimo Spiritu Aceti imbibunt, inque figulina ad lentum ignem, ne Antimonium fluat, evaporare sinunt: quòd si post evaporationem pulvis Antimonii rubens relinquatur, ulterius de ejus certitudine non dubitant. *Vires.* In Antimonio, inquit *Quercetanus*, sunt sexcentæ proprietates variæ ac præstantes, ut præ-

reparantes, expurgantes, vomitiones conciantes, & id genus alia, ut nunquam satis lauari queat hoc medicamentum. Crudo attriuerunt Veteres vim adstringendi, exiccandi, neatusque corporis obstruendi, excrescentias carnis absumendi, cicatrices obducendi, oculorum ulcera & sordes mundificandi. Sunt & qui ad Epilepsiam arcendam exhibent, etiam in ipso Paroxysmo. *Schröd.*

Pro usu Antimonii in purgandis Metallis, &c. Vid. *Transact. Philosoph.* N. 138. N. 142. *Varietates Mineræ Antimonii* v. apud *Kentmannum* pag. 88, 89. *Usus in Mechanicis* v. *Wormii Mus.* 25, 126.

## II. De Metallis perfectis, Quorum Mineræ in usu Officinis non sunt.

### I. De Ferro.

**A.** Ferrum Nativum *Offic.* Eisen. Metallum est ignobilius, constans ut vult Schröderus, ex Mercurio & Sulphure minus liquabili, crudiori, seu si mavis ex Sulphure ac sale, quæ partibus terreis crudioribus immixta sunt, vel potius ut *Hermannus*, ex Sale Alkalico terra Metallica incluso. *Præp.* Chalybs *Offic.* Stahl. Substantia est Metallica, ponderosa, ferro compactior, & solidior, facta ex ferro sæpius candefacto, & in aqua extincto. *Vires.* Diversis donatum est viribus,

adstringendi scilicet & aperiendi: ob salem alkalicum acidum astringit, obstructions aperit, & morbos chronicos inde ortos curat: ob terram Metallicam acida absorbet, eorumque cuspidēs obtundit.

Ferri venas seu Mineras varias Eisen: Erz v. apud *Kentmannum* sæpius laudatum. p. 89, 90. ad p. 92. & *Wormii Mus.* p. 123. Pro modo separandi ferrum v. *Transact. Philosoph. N.* 137. v. etiam *Raium* de vocab. inusitatis p. 186. &c.

## II. De Stanno.

**A** Stannum Offic. Mer. Pin. Zinn. Metallum est molle, album, splendens cum livore quodam, constans secundum *Schroderum* ex Mercurio puriore, molliore, fugaciorque, quàm Metalla duriora, fixiore verò quàm Plumbum, & Sulphure albo minùs maturo. Ex mineris diversis coloribus eruitur. *Vires.* Præterquam quòd Epatici conveniat, uteri & cerebri morbis peculiariter quoque dicatur, *Schrod.* Ex Stanno eruitur Aurum, inquit *D.* Merret in pinace suo, at parva quantitate. Argentum ex Minera Stanni quoque eruitur. Stanni Mineras varias Zinn Erz v. apud Editores *Museorum*, & *Scriptores Metallicos.* Pro modis separandi & conficiendi Stannum V. *Raium* de Vocab. pag. 180. Item *Transact. Philosoph. N.* 69. N. 138.

## III. De



## III. De Auro.

IN Capite de Arsenico (quod Vide) hoc Metallum tractavimus, cui sequentia addi possunt. Aurum vel reperitur in Mineris, viz. Auripigmento, lapide Lazuli, Silicibus candidis, &c. è quibus separatur Amalgamatione cum Mercurio; vel purum & Virgineum reperitur, vel (quod sæpissimè contingit) cum arena mixtum, & lotionem separatam; hinc Torrentes & fluvii & littora arenosa Auro abundant & ditantur. Vid. Plura apud *Casalpinum in Metall. p. 175, 176.* Item in *Museis Curiosorum editis*, & apud scriptores Metallicos. *Alonsum Barum, Acoftam, Agricolum, Erckerum, &c.*

## IV. De Argento.

**A** Argentum Offic. Mer. Pin. Silber. Metallum est nobile candidum, Auro imperfectius. Ex Minera Plumbea seu Molybdæa sive Plumbagine nativa Dioscoridis eruitur. Vires, Capitis corroborans perhibetur specificum, spiritusque Animales confortare, unde & in omnibus capitis affectibus peculiaris efficaciam censetur, quales imprimis Epilepsia, Apoplexia, &c. *Schröd. Præp. Argentum foliaceum* Offic. Geschlagen Silber. Fit sæpius calefacientibus laminas Argenti, quas inter duo coria tunc sunt ac cædunt in tantam tenuitatem.

Pro modis separandi & præparandi Argentum v. *Clarissimum Raium de Vocab. inutilitatibus*

tis p. 174. Item Lazarum Erkerum. Varias Argenti Mineras seu Venas Silber Erz v. apud Kentmannum p. 59. ad p. 64. Wormium, reliquosque Musæorum Editores. V. A. Barbam, Acoſtam.

## V. De Plumbo.

**A** Plumbum *Offic. Mer. Pin. Bley.* Metallum est vilissimum, constans inquit *Schröderus* ex Sulphure indigesto, Sale aluminoso, ac Mercurio naturam Antimoniam æmulante. Ex eadem Minera cum argento eruitur. *Vires.* Refrigerat, adstringit, incrassat, &c. Libidinem reprimat, ulcera carnibus implet, cicatrice obducit, excreſcentiisque liberat, ulceribus chronicis quæ vocant, malignis, canerosis, & putredinosis, tum per se, tum quibusdam permixtum, convenit. *Schröd.* Recrementa Metallica factitia Plumbi sunt. 1. Lithargyrus *Offic. Blette.* Spumosum excrementum Metallicum est, è purificatione Argenti, vel potius nihil aliud est quàm Plumbum. Duo ejus genera communiter statuuntur, videlicet aureus, qui flavi coloris existit, & argenteus qui coloris albi, verum non nisi coctione differunt, aureusque magis coctus est, quàm argenteus. *Vires.* Siccat & refrigerat, moderatissime adstringit, reprimat, occludit, cava explet, extergit. Sarcoticum est *Schrod.* 2. Molybdena, & Plumbago factitia *Offic. Blank / Bley Erz / oder Bleyſchweiff.* Recrementum illud est, quod in Argenti Aurique purificatione cum Plumbo,

3. *fornicis folio concretum*, & perustum ad-  
herescit. *Vires*. Similem Lithargyro vim possi-  
et, ad frigidum paululum recedens, sed nec  
stergentis facultatis est particeps. 3. *Cerussa*,  
3. *Sandix Offic.* Plumbum album quibusdā.  
Bleyweiß. Substantia est Metallica alba, fria-  
ilis, ponderosa, facta suspensione Plumbi la-  
tellæ supra Acetum, ut vapores ab Aceto ele-  
vati circumeant. *Vires*. Cum Lithargyro con-  
venit viribus, & potius externè quam internè  
curpatur. 4. *Minium Offic.* Plumbum rubrum  
vulgò Mennig. Pulvis est Metallicus rubicun-  
tus, ponderosus, vel Calx Plumbi igne rever-  
terata. *Vires*. Convenit cum Cerussa viribus.  
scilicet ad Tumores & Ulcera Gallica, ad  
parte ambustas, & ad lentigines. 5. Plumbum  
stum *Offic.* Gebrand Bley. Est Plumbum in  
alcem redactum vi ignis, viz. Fiat S.S.S. ex  
Plumbi bracteis & Sulphure pulverisato, ura-  
turque hac ratione Plumbum. *Vires*. Siccatur &  
refrigerat & cum Minio convenit viribus.

Pro modis separandi & præparandi Plum-  
um V. *Agricolam & Erckherum.*

Plumbi Mineras varias Bley: Erh v. apud  
Centmannum. à p. 84. ad 89. etiam aqua Editores  
Museorum, & scriptores de Metallicis.

## VI. De Cupro.

Cuprum *Offic.* Kupffer. Ex ignobilioribus du-  
riusculis est, constans (secundum Theophrastum) ex Sulphure purpureo, Sale rubro,  
ac Mercurio citrino, *Vires*. Præterquam quod  
partes



partes generativas peculiariter confortare credatur, variis abundare facultatibus æstimatur, adeò, ut sint qui dicere non vereantur, nullum Metallorum salubriorem spirare auram quàm Cuprum. *Schrod. Præp. 1. Æs Offic. Mëßing.* Metallum durius quàm Cuprum, colore fulvo. Conficitur ex fusione Cupri cum lapide calamini. 2. *Ærugo, & Æs viride Offic. Grünspan oder Kupffer Grün.* Substantia est grumosa, condensata, cæruleo-viridis, facta ex cupro & aceto hoc modo. Suspendantur laminæ Cupri, ut vapor acetici & racemorum obiectæ sint, sic adhærescet Ærugo. *Vires.* Constat sale falso plus minus caustico, habente virtutem acida quævis ulcerum & vulnerum infringendi. *Recrementa Metallica Ære conficienda sunt.* 1. *Diphryges. Offic.* Genus est recrementi Metallici, quod subsidet, dum Æs in fornace fustum aqua frigida perfunditur; nobis ignotum est & in Officinis rarissimè invenitur. *Vires.* Mistam habet facultatem, continet enim in se quiddam & mediocriter astringens & mediocriter acre: quamobrem ulcerum rebellium optimum Medicamentum est. *Schrod. 2. Cadmia factitia Offic.* Tutia vulgò, Tutien. Substantia est Metallica crustacea, corticis instar, intus lævis ex flavo cinerea, extus numerosis subcæruleis tuberculis asperata. Sed quid sit Tutia inter se non consentiunt Authores. *Garzias* enim ex cujusdam arboris cinere exustæ dicit, sed *Bontius* ex terra argillæ instar glutinosæ præparari scribit. Alii, quibus & nos con-

senti-

entimus, corpus quoddam ex fuligine aris, dum in fornace conficitur concretum esse volunt, adhærens lateribus, camerisque fornacum, vel & in partem infimam delabens. Trilicis id fit generis, Botritis, Ostracitis & Placitis, nominibus à re quam repræsentare videntur desumptis. *Vires.* Leniter desiccat, abtergit, ulceribus humidis confert, eademque ad cicatricem ducit. *Schrod.* 3. Pompholyx *Offic.* Nihil album quibusdam. *Weisser Nicht* oder *Gallmey Stuck.* Pulvis est metallicus, albus, sublimatus ex ære, in fornace coctus, seu favilla est tenuissima & volatilis, quæ dum Æs in fornacibus perficitur supernæ earum parti adhærescit. *Vires.* Convenit cum Tutia viribus. Singulare est in oculorum yitiis. 4. Spodium Græcorum *Offic.* Nihil gryseum quibusdam. *Brauer Nicht.* Favilla vel pulvis est eandem ob gravitatem in pavementum descendens, colore exalbido. *Vires.* Viribus cum Pompholyge convenit, sed in Officinis rari usus est.

Cupri Mineras seu Venas diversas *Rupffera* Erh v. apud *Kentmannum* à p. 65. ad p. 72. *Wormium* in *Mus.* p. 120, 123. reliquæque *Musea*, &c.

## SECTIO SEXTA.

## De Lapidibus in genere.

**L** Apides sunt corpora terrea, dura, indurabilia, vilapidifica, ex materia fluida lapidescente coagulata.

Lapides sunt vel

Minus pretiosi habentque figuram

Nullam, suntque vel

Opaci,

Duri & solidi ad Mechanicam utiles, colore

{ Albo: *Alabastrum*.

{ Viridi: *Ophitis*.

{ Cæruleo: *Lapis Lazuli & Armenus*.

{ Mollis & facile friabilis,

{ Porosi, leves.

{ Spongiæ similis: *Pumex*.

{ In Spongia repertus: *Lapis Spongia*.

{ Solidi & ponderosi, ad æs conficiendum  
utiles: *Lap. Calaminaris*.

Diaphani,

{ Plumosi: *Amiantus*.

{ Striati lucidi: *Talcum*.

{ Squamosi: *Lapis Specularis*.

Certam.

{ Mathematicam,

{ Rhomboidem: *Selenites*.

{ Sexangulam: *Cryſtallus*.

{ Rotundam, estque alius alio imprægnatus:  
*Ætites*.

{ Oblongam, superficiei

{ Aspera: *Lapis Judaicus*.

{ Plana: *Belemnites*, *Lapis Lyncis*.

{ Aliquam rem animatam repræsentans: *Osteo-*  
*-cola*.

Pretiosi,



Diaphani (quæ Gemmæ dicuntur) suntque vel

Integri,

{ Duri, colore aliquo imbuti.

{ Rubro, è

{ Cocco & Laeca Indica mixto: *Rubinus.*

{ Russo-nigricantes: *Granatus.*

{ Flavo-rubicundi: *Hyacinthus.*

{ Aureo: *Topasius.*

{ Viridi: *Smaragdus.*

{ Cæruleo

{ Cum viridi mixto quæ aquæ marinæ  
colorem refert: *Beryllus.*

{ Sine mixtura: *Saphirus.*

{ Purpureo: *Ametheus.*

{ Molles parvi, colore

{ Albi: *Asteria Gemma.*

{ Versicolores: *Opalus.*

Non integri, secundum

{ Partes: *Sardus.*

{ Totum: *Onyx.*

{ Opaci, pulchri, magni,

{ Molliores, versicolores: *Jaspis.*

{ Duri, colore viridi, sanguineis punctis vel  
venis distincto: *Heliotropium.*

In Herbis, Verbis, & Lapidibus magna est  
Virtus. Canon est notissimus Physicorum; de viribus  
Herbarum & Verborum agere non est hujus loci; quod  
attinet ad Lapides, hoc loco subjungemus duntaxat  
Pauli Ammanni verba. Si per virtutem intelligas  
molem, inquit, magna procul dubio inerit vir-  
tus; exemplo tibi sit motus Lapidum projecto-  
rum. Contra, si medicam facultatem conside-  
res, multa in illorum historiâ erunt, falsa, du-  
bia, & superstitiosa. Hinc etiam succinctam  
illorum Historiam trademus, qui pleniorē  
desiderat, adeat *Kentmannum de fossil. à p. 32.*

ad p. 57. Boetium de Boot, & Johan. de Laet. Edit. An. 1647. Item Doctissimum Wormium in Mus. à pag. 36. ad p. 112. & Casalpinum de Metall. à pag. 74. ad pag. 164.

---

## I. De Lapidibus minus pretiosis.

### I. De Arena.

**A**rena maris Offic. littoralis Mer. Pin. Das Sand am Meer. De usu ejus medico nihil adhuc quod addam habeo. Apud Mechanicos in usu ad vitrificandum & poliendum, V. Nerium de arte Vitriaria.

### II. De Spongiæ Lapide.

**S**pongiæ lapis Offic. Schwämme Stein. Lapis est prorsus friabilis, in Spongiis concretus, colore candido vel gryseo. Vires. Extenuat absque insigni caliditate, ad calculos renum vesicæque frangendos utilis est: valet etiam ad strumas discutiendas. Schröd. Vid. Plura apud Wormium in Mus. p. 54.

### III. De Pumice.

**P**umex Offic. Pimsen Stein. Lapis est erosus, porosus, spongiosus, exiguisque cavernulis seu foraminibus plenus. Invenitur in Germania, unde ad nos adfertur. Vires. Refrigerat, siccatur, extenuat, ulcera leviter purgat, cicatrices explet, & emendat. Schröd. In Vesuvio, Ætnâ, aliisque montibus æstuantibus copiosè reperitur cum Sulphure. Vid. Usus in Mus. Wormii p. 47.

### IV. De

## IV. De Osteocolla.

**O**steocolla Offic. Bruchstein oder Bein-Bruch.  
 Est substantia mediæ consistentiæ inter terram & lapidem, alba, friabilis, crustacea, sabulosa, ossisque figuram æmulans, excresecens in arena aliisque locis lapidosis. *Vires.* Celebratur ad Ossa citò glutinanda, quippe materiam Callo idoneo citissimè suppeditat, adeoque glutinationem maturat. *Schrödl.* Fluorem album sistit. Febres intermittentes arcet. Bene tamen monet *Hildanus* quòd in juvenibus laudabili corporis habitu præditis, cautè sint adhibenda, Callum enim non sine deformitate generare solet, ideò saltem in senioribus extenuatis, quibus languet calidum nativum adhibendum hunc lapidem esse censet. Vid. Plura apud *Wormium* in *Mus.* p. 53.

## V. De Lapide Calaminari.

**L**apis Calaminaris Offic. *Mer. Pin.* Cadmia fossilis quibusdam. *Gallmey.* Lapis est fossilis, subflavus, mediæ consistentiæ inter Lapidem & terram, sapore terreo, è terræ fodinis extractus. e.g. ex collibus Mendipensibus, &c. *Vires.* Siccat leniter, extergit, adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Adhibetur solum externè, creberrimòque usu infantum excoriationibus exiccationis ergo inspergitur. *NB.* Utuntur eo & *Ararii* ad consiciendum *As,* Curum enim pallere facit: unde ex hoc Lapide Cadmia botrytis, ostracitis, placitis, Offic.



## VI. De Lapide Hybernico.

**L**apis Hybernicus *Offic.* Iriländisch Stein. Lapis est fossilis, ex nigro subcæruleus, sapore terreo. In fodinis Angliæ & Hybernix reperitur. *Vires.* Cum Spermate Ceti viribus convenire creditur, & in contusionibus non infrequens usurpatur. Sanguinem enim coagulatum resolvit: Alii in Febribus quartanis valere ajunt. Usus ejus Mechanicus est pro inscribendis rebus memoriæ causâ, &c.

## VII. De Lapide Lazuli &amp; Armeno.

1. **L**apis Lazuli *Offic.* Lasur Stein. Lapis est opacus Sapphiri colore, aut florum Cyani, aureis punctulis aut flammulis exornatus. Armenio durior. In fodinis aureis & cupreis reperitur. Genera tantum duo sunt, fixus i. e. colorem in igne non mutans, qui ferè ex Oriente affertur, & non fixus, qui in Germania reperitur. *Vires.* Convenit viribus cum Lapide Armenio, sed imbecillius eas exercet. Purgandi facultate præditus est, præcipuè contra Melancholicos omnes affectus valet, Quartanam, Apoplexiam, morbum comitalem, lienis vitia, aliosque complures, à melancholico succo originem ducentes. *Schröb.* Quò jure recipiatur in nobilissimam compositionem *Confectionis Alkermes*, cum Doctissimo Paulo Ammanno ignoro, Nam purgare dicitur Melancholicum humorem cum tamen prædicta Confectio sit cordialis & confortativa.

2. *Lapis Armenus* *Armenierstein* oder *Bergs Blau*. Opacus est Lapis, maculis viridibus, cæruleis & subnigris, relucens, & sicut Lapis Lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se, nisi sola maturitate. In fodinis argenteis reperitur. *Vires*. Desiccatur mediocriter, extergitur cum levicula acrimonia & levissima adstrictione. Interne propinatus purgat sine noxa solum per inferiora humorem Melancholicum: Hinc conducit in Mania, Melancholia, Epilepsia & similibus. *Schrod.* N.B. Ex Lapide Lazuli fit color ille cyaneus, quem *Ultramarinum* vocant? azureum verò ex Lapide Armenio, vel cyano Germanico faciunt. Modum componendi *Smaltum* vulgò dictum. Vide apud Boetium de Boot in *Histor. Lap. lib. 2. cap. 123. 140, 141.*

### *VIII. De Amianto.*

**A** Miantus & Alumen plumosum vel plumæum, & Scissile *Off. c.* Quod ratione formæ tantum à plumoso differt, dicitur enim Scissile plumosum oblongum. *Feder. Weis.* Lapis est scissilis, & filamentosus: ignis injuriæ resistit, atque non solum uri non potest, sed ignitus purior redditur. *Vires*. Veneficiis resistere creditur omnibus, præcipuè tamen veneficarum, *Schrod.* In usu medico rarò occurrat.

In Cambro-Britanniâ reperitur. V. *Historiam in Transact. Philosoph. Oxon. Edit.*

## IX. De Tálco.

**T**Alcum *Offic.* Stella terræ quibusdam. *Talch.* Lapis est Speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiufculus, igni resistentens ac fixus. Optimum censetur, quod Venetiis ad nos transportatur. *Vires.* Potissimus ejus usus est externus & cosmeticus. *Schröd.*

## X. De Lapide Speculari.

**L**apis Specularis *Offic.* Muscovisch Glas. Lapis est fossilis instar Crystalli, pellucidus, ac in bracteas tenuissimas scissilis. Perperam creditur inquit Doctissimus *Paulus Annemannus* Mariæ glacies, non secus atque olim putabatur esse ἀφροσελιώνη vel σελενίτης; utrumq; enim fabulosum est. Prius quia dubium est, an Maria Θεοτόκη tali glacie fuerit usa; posterius quia nec imaginē Lunæ continet, nec ad motum ejus crescit vel decrescit. Ex Muscovia, Hispania & aliunde ad nos transportatur. *Vires.* Usus in medicina est rarioris, nec adhibetur faciliè nisi in cosmeticis.

## XI. De Selenitide.

**S**Elenites *Offic.* Frauen-Eiß oder Marienglas. Lapis est fossilis, rhomboides, pellucidus, ac in bracteas tenuissimas scissilis. Variis in locis invenitur, præsertim prope fontes. E. g. *Epsom* in Surria & alibi. *Vires.* De viribus hujus nihil habeo quod dicam; in medicina enim locum non habet, nisi in cosmeticis. N. B. In Catalogo Simplicium Pharmacopœiæ Collegii nostri Londinensis præfixo cum Lapide Speculari confunditur,

## XII. De



## XII. De Crystallo.

**C**Rystallus *Offic.* Crystall. Lapis est transpa-  
rens, hexagonus, aquam in glaciem con-  
gelatam omnino referens; quæ eligenda est  
purissima, pellucidissima ac eximie intensa. In-  
venitur variis in locis. In agro Derbiensi effodi  
scribunt Authores, sed doctissimus *Christophorus*  
*Merret*, M.D. solummodo Fluores esse credit  
quæ ibi effodiuntur. *Vires.* Facultatis est adstri-  
ctoriæ adeoque confert Dysenterici, Diarrhœæ,  
Coeliacæ, Cholerae, Fluxui Uterino, &c. *Schröd.*  
In Catalogo Simplicium omittitur. V. Plura  
apud *Stenonem* de solido intra solidum.

## XIV. De Alabaastro.

1. **A**labastrum & Alabastritis *Offic.* *Mer. Pin.*  
Alabaſter. Lapis est candidus, notissi-  
musque, Marmoris species sed mollior. In agris  
Staffordienſi, Derbiensi, & alibi reperitur. *Vi-*  
*res.* Combustus resina aut pice exceptus duri-  
ties discutit, Stomachi dolores cum Cerato le-  
vat, Gingivas comprimit. *Diosc.*

2. Gypsum *Offic.* *Mer. Pin.* Gypſ. Quid sit  
Gypsum inter Authores controvertitur, alii  
enim calcem Alabaſtri, alii Aluminis Scajolaë,  
alii lapidis Specularis, alii Selenitidis esse con-  
tendunt, nobis autem Calx est vel ex Alaba-  
stro, vel ex lapidibus quibusdam Alabaſtro non  
dissimilibus ultiſis, sed exigua, & brevi unctione,  
Præstantissimum reperitur secundum D. *Chri-*  
*stophorum Merret*, M.D. in agro Derbiensi, quo  
utuntur ad domorum areas & concameratio-

nes. *Vires*. Exiccat, Sanguinis fluxum sistit. *V. Wormii Mus. p. 46.* Usus in re statuariâ & pictoriâ, item in ædibus obducendis, ut *Parisiis, &c.*

#### XIV. De Ophite.

**S**erpentinus & Ophites *Offic. Ein Schlangenstein.* Marmor est instar Prophyritis durissimus, colore viridi saturato, dilutis ejusdem coloris maculis quasi aspersus. *Vires.* Veterum omnes alligant contra capitis dolores, ac serpentium ictus. *Dioscorid.*

#### XV. De Lapide Calcario.

**L**apis Calcarius grysei & varii coloris *Kalkstein.* Hujus plurimæ differentiæ; omnium verò illa communis nota est, in calcem uri posse. Item habitus & facies interna lapidis calcarii ferè lævis est & ad polituram spectans. *Officinalis* non est, nisi in Præparatis, quæ sunt, 1. Calx viva. 2. Calx lota. 3. Lixivium. 4. Spiritus.

Sub censu lapidis calcarii enumerantur Creta alba ejusque alba Argilla, item ipsi silices in montibus cretaceis inventi, ipsi enim igniti ex aquâ demissi dissiliunt: Item Selenites, ipsumque Gypsum, ejusque differentiæ plurimæ: Item Stalactites, aut quivis ex aquâ confectus, *V. Cap. de Cretâ.*

II. De

## II. De Lapidibus Medicamentosis formatis.

### I. De Aetite.

**A.** Aetites ☿ Aquilæ lapis Offic. Adlerstein. Lapis est veluti prægnans; alio in utero sonante, colore fusco, pullo, aut cinereo, externè scabro, & plerumque ovali: Præfertur orientalis. *Vires.* Partum promovet, si feminibus alligetur; sin brachio, eundem retinet: observare autem expedit, statim à partu esse removendum, ne uterus ad se trahatur, &c. Schrod. Aetitis effectum naturalem magnificiunt vulgariter, ob alicujus signaturæ vestigia, dum in partu difficili prodesse creditur; Quod non negabo. Ast naturali huic effectui superstitiones statim adjunxerunt Galenus, Plinius, & alii. Quis enim probabit 1. Aëtitem brachio alligatum abortum præcavere? Qui tamen effectus priori est contrarius; 2. Aëtitem tam vehementer trahere, ut uterus excidat? Observationes, quoad posterius, adducit Wormius p. 78. ☿ Valeriola. Verum meò judiciò, hæ Observationes vacillant. Notum enim est ex Anatomicis, quòd uteri par ligamentorum latum s. superius, factum sit à natura, & juxta communem, margini ossis Ilei mediante Peritonæò, alligatum, ne uteri fundus in sinum excidat. Quomodo ergò hic lapis præstabit? Profecto nisi laxandi vis, vel



rumpendi hæc ligamenta, tribuatur aëtiti ab allegatis Autoribus, non poterit admitti *Valeriole* observatio, quam refert de Muliere quadam Valentiana, nisi potius Obstetricis violentia (veluti sæpius contingere solet,) uterus simul protractus fuerit; & tamen hæc absurda Anatomicis Observationibus affatim inferuntur; 3. Probatio veneni admixti, hoc lapide facta, nulla est. 4. Fallibilis quoque character est, si pulvere ejusdem pani admittō, velimus fures deprehendere: interdum alias ob causas deglutitio potest impediri: 5. Nec amorem conciliat, vel divitias auget; quandoquidem contrarium exemplum suggererunt ante aliquot annos Novellæ Viennenses de quodam, qui quadrilibrum aëtitem in currum Archiducis Austriacæ non sine terrore projecit; 6. Si ergò dicere debeo, quod res est, *potius obtinebit aëtites terræ sigillatæ vires, in morbis malignis, & venenis adsumtis, &c.* Huc *Animan. Bauschius &c.*

## II. De Lapide Judaico.

**L**apis Judaicus *Offic. Judenstein.* Lapis est Olivæ simile, subrotundus, tener & friabilis, striis, secundum longitudinem discurrentibus, & æquidistantibus, ac si arte torno factæ essent; colore est exalbido, vel subcinereo. Reperitur variis in locis. *Vires.* Medetur difficultati urinæ, calculos vesicæ præcipueque renum pellit. Echini marini spinulæ petrefactæ esse videntur.

## III. De Lapide Lyncis.

**L**apis Lyncis & Belemnites Offic. Luchstein.  
 Lapis est teres, pyramidalis, variis coloribus repertus. Multis in locis reperiuntur. *Vi- res.* Communiter laudatur cum lapide Judaico & Nephritico pro summô medicamento lithon- triptico, sed, meô judiciô, sine ratione, vel experienciâ. Nam adhuc in quæstione est, an detur reverâ lithontripticum medicamentum? Dico  
 “revera; ut distinguam à diureticis, quorum  
 “effectum videmus, Lithontripticorum verò  
 “non item. Sive enim magisteria horum,  
 “sive alios liquores contra Lithiasin adhibea-  
 “mus, nullo tamen negotiô intentionem  
 “nostram adsequitur. Etenim, si tali virtute  
 gauderent, etiam extra corpus posset hæc pro-  
 bari. Dicis;  $\sim \Phi$ . hoc ab extra præstat; Cur  
 autem non ad intra? Forſan, quia in tantâ doſi  
 ad intra exhiberi nequit? Vel quia ſine alte-  
 ratione ad partem adfectam non pervenit? Si  
 ſuſtines, medicamenta lithontriptica in corpus  
 adſumpta demum virtutes, calculum immi-  
 nuendi, ibidem accipere, falſus es, & petis  
 principium; Sic enim perinde eſſet, utrum  
 diaphoreticum, vel lithontripticum exhibe-  
 rem. Cur enim diaphoreticum in corpus ad-  
 ſumtum, non poſſet hac ratione lithontripti-  
 cam induere virtutem? *Amman.*

### III. De Lapidibus pretiosis opacis.

#### I. De Sardo.

**S**ardus, Sarda, & Carneolus Offic. Carneol. Gemma est semiperspicua, loturæ carnis, seu carni sanguinolentæ similis. In Sardinia invenitur. *Vires.* Pulvis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Gestatus fertur animum exhilarare, timorem pellere, audaciam præstare, fascinationes prohibere, ac corpus contra venena quævis tueri. Imprimis autem sanguinem undecunque fluentem peculiari proprietate sistere, ventrique alligatus partum conservare. *Schröd.*

#### II. De Onyche.

**O**Nyx Offic. Onyx. Gemma est opaca vel minus lucida, humani unguis similitudine colore & splendore. *Vires.* Mentis passionibus conducere sensusque vivificare creditur.

#### III. De Jaspide.

**J**aspidis Offic. Jaspis. Gemma est opaca, colore viridi interdum sanguineo. Reperiuntur in India, &c. *Vires.* Cum Carneolo viribus convenit. V. *Schwenckfeldium de fossil. p. 381.*

#### IV. De Heliotropio.

**H**eliotropium Offic. Gemma est opaca, colore viridi, sanguineis punctis vel venis distincto. *Vires.* Venenis resistit, sanguinem undecunque fluentem sistit.



## V. De Lapide Nephritico. Lenden- Stein.

Est Lapis admodum variegatus, ex colore viridi, aliisque permixtus, plerumque ex viridi, albo, flavo, cæruleo, nigroque colore, semper tamen viriditatem refert; adfertur ex Americâ, nonnullis tamen Hispaniæ & Bohemiæ locis reperitur. *Vires.* Amuletum est adversus Nephritidis & Stomachi dolores.

---

## VI. De Lapidibus pretiosis diaphanis seu de Gemmis.

Pæfationis loco doctissimi *Pauli Ammanni* de Gemmarum nominibus, pretio, operationibus, (cujus sententiæ & nos subscribimus) verba proponemus.

Magna varietas hîc occurrit circa nomina Gemmarum, dum quasdam veteribus cognitâs, nunc planè vel ignoramus, vel aliis titulis indigitamus: Major varietas circa illarum est pretium, quod hætenus ex instituto hominum planè dependit; Maxima tandem circa earum operationes conspicitur, quæ infinitis adulteriis, superstitionibus & fabulis repletæ sunt. Primum & secundum, ad nos, ut sic, non pertinet. Ideò potiùs de tertio erimus solliciti, & quoniam intùs adsumuntur; non debent esse adulteratæ, debent etiam determinatum & naturalem edere fructum. Verùm adulteria gemmarum quis omnia novit, quæ Judæis,

dæis, Lusitanis, & aliis impostoribus in usu sunt? duo adducam hîc, 1. *quatenus Occidentales pro Orientalibus venduntur.* Præsuppono enim ex hypothese receptâ, gemmas Orientales cæteris præstare. Quod constat etiam ex lucis congenitæ in Orientalibus excellentiâ. Quis enim nescit, v. g. Adamantis Indici & nostratis differentiam? 2. *Quatenus fluores pro gemmis substituunt,* unô verbô, Vitrum pro Adamante. *Worm. p. 101.* Effectus gemmarum debet esse naturalis, qui etiam iisdem, juxta *Pet. Joh. Fabrum, l. IV. Panchym. S. 4. p. 521.* Revera inest, quamvis corporeâ mole non parum præpeditus. Quô ipso omnes excludo fabulas & superstitiones, quæ locô effectus determinati lapidibus pretiosis designaverunt Autores. Exempla habes in *Ik'ierio de Cur. Malef. læsor. p. 411. 412.* Quibus sequestratis, relinquentur pauci, de quibus nostra Praxis gloriari poterit. Exemplum sit Adamas, omnium gemmarum præstantissima. Quid est in illo (scil. Adamante,) quô praxis nostra gloriari possit? Parum, vel nihil. Nam falsum & fabulosum est, quod 1. *Resistat incudi & malleo innoxie:* 2. *Sit gemma reconciliationis simultates matrimonii,* ut sic, extinguendo. 3. *Pulvinari suppositus, index sit adulterii;* 4. *Intuitus hereditarii adamantis, statis temporibus factus, enixum prolis congneris producat,* &c. Remove nunc alia fabularum siparia; quid virium supererit in Medicina? Dicis: Curat Dysenteriam. Quî verò curabit eam, dum in communi dicitur, intestina exulcerare? Atque sit ita; quis

quis statuet huic remedio pretium? Nam infra 3j. quantitatem vix operabitur, supra hoc pondus *Adamas nobis est inestimabilis*. Idem judica de *Amethesto* qui resistere putatur Ebrietati, si intus adsumatur. Nam ut *Periapton* hoc impossibiliter præstabit. Jam verò constat, cum esse in numero pretiosorum lapidum, & si tantum 3ij. 6. Vallensibus venirent, Quis tam pretiosum remedium pro ebrietate præcavenda, exceptis Principibus, sibi posset comparare? Accedit, quòd nunc ebrietatem magis accerere, quàm averruncare, homines conentur. Fragmenta 5. Lapidum pretiosorum, scil. *Sapphiri, Granati, Smaragdi, Hyacinthi, Sardi vel Carneoli*, quod attinet, fateor, illa esse in officinis receptissima. Verùm si usum vel facultatem eorum examinabis, deprehendes, quòd tantum opinio lapides istos pretiosos praxi nostræ intulerit, ut Principibus & Magnatibus persuaderetur, in illis singulare confortans latitare; quod tamen citiùs in vilissimo filice, vel aliò Simplicium reperietur, quàm in istis. Ego dico, quod sentio. Qui contrarium sustinet, illi probatio incumbet. Nam *sine ratione vel experientiâ erubescat Practicus loqui*. Jam ratio, cur hi lapides pretiosi sint, vel debeant esse confortantes, deest: Experientia vacillat. Ergò plus est in titulò, quàm pyxide!

Pro formatione Gemmarum V. *Boylium de Gemmis & Transact. Philosoph. N. 18. 23. 102.*



## I. De Rubino.

**R**ubinus *Offic. Rubin.* Gemma est diaphana, rutilans, rubensque ac limam respuens. Nobiliores in Insula Zeilan. nascuntur. *Vires.* Tradunt gestatum vel ebibitum venenis resistere, ac in peste præservare, tristitiam arcere, libidinem coercere, malas cogitationes, & terrentia somnia avertere, animum exhilarare, corpus incolume conservare, &c. *Schröd.* In Medicina Officinis nostris præscribitur, verum nescio quomodo in Catalogo simplicium omitatur.

## II. De Granato.

**G**ranatus *Offic. Granat.* Gemma est pellucida, ex flavedine rubens, ignis instar, Cinnabaris nativi vel factitii colorem ferereferens. *Vires.* Exiccatur, corroboratur, medetur cordis palpitationi, Melancholiæ resistit, & veneno, exspuitionem sanguinis sistit; collo suspensus iisdem virtutibus vulgò celebratur. *Schröd.*

## III. De Hyacintho.

**H**Yacinthus *Offic. Hyacinth.* Gemma est pellucida, ex flavedine, aut croceo colore rubens, ignisque flammam imitans. *Vires.* Vim habet Cor corroborandi, & à Peste tuendi: Singulare quoque est specificum contra Spasum & Contracturas. *Schröd.* Adulteratur vitro Saturni, quod à vera Gemma pondere & duritie facile distinguitur.

## IV. De Amethysto.

**A**methystus *Offic.* Amethyst. Gemma est violacei coloris, qui ex mixtione rubri, & cœrulei coloris emanat. Reperiuntur in India, Armenia, Arabia, &c. *Vires.* Putatur gestatus ebrietatem prohibere, idque vini colore, quo præditus est, indicari, quasi illum pro facultatis characterismo habeat. *Boet.*

## V. De Saphiro.

**S**aphirus *Offic.* Saphier. Gemma est pellucida, colore cœruleo seu cyaneo constans, perquam translucido, cœlique sereni colorem referens, splendore & perspicuitate summâ. Invenitur in Zeilan, &c. *Vires.* Frigida est & sicca, astringens, consolidans, alexipharmaca cordialis & ophthalmica. *Schrod.*

## VI. De Beryllo.

**B**erillus *Offic.* Beryll. Gemma est pellucida, quæ marinæ aquæ colorem refert, ex viridi cœrulea. In India variis in locis reperiuntur. *Vires.* Contra hostium pericula, vitia hepatis, suspiria, eructationes, ac morbos oris, faciei & gulæ valere creditur.

## VII. De Smaragdo.

**S**maragdus *Offic.* Smaragd. Gemma est, quæ nihil viridius, pellucida & diaphana, tantique splendoris existit, ut oculos intuentium perstringat. Reperiuntur in India, &c. *Vires.* Omnem alvi sanguinisque fluxum, ac præcique Dysenteriam, ebibitus sistit; venenatis itemque

G  
morsu.

morsibus, Pesti, Febribus pestilentibus resistere creditur. Boet.

### VIII. De Topasio.

**T**wo ipsius sunt genera (viz.) Chrysopasius & Chrysolithus, Chrysopasius veterum Chrysolithus hodie appellatur, & Chrysolithus veterum Topasius & Chrysopasius Neotericis Gemmariis nuncuntur.

1. Chrysolithus Offic. Topasius & Chrysopasius. Vet. Chrysolith. Viridis est gemma ac diaphana, aureo fulgore splendens. Invenitur in India, &c. Vires. Sanguinis eruptiones sistit, bilem itemque & phrenitidem mitigat. Boet.

2. Topasius & Chrysopasius Offic. Chrysolithus Vet. Topaas. Gemma est diaphana & pellucida aurei coloris. Vires. Natura solaris ex signatura judicatur. Proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minuere, intellectum confortare, molestisque insomniis adversari, &c. Schrod.

### IX. De Opalo.

**O**palus Offic. Oball. Gemma est omnium pulcherrima, nam in eo apparent reflectione varii colores, ut in Iride. In India reperiuntur. Vires. Arbitrantur authores hanc omnium aliarum gemmarum vires habere.]

### X. De Asteria Gemma.

**A**Steria gemma Offic. Siegestein. Perspicua est hæc Gemma. Crystalloque similis, durior tamen. Vires. Gestata somnum conciliare, & somnia terrifica abigere creditur.

Ha-



Haëtenus *Mineralogia*, seu de *Fossilibus* in re Medicâ vulgariter usitatis? quorum omnium innumeras species seu varietates, (quoad mineras suas Er̃ dictas) colore, figurâ, mixturâ, aliisque accidentibus differentes enumerare hujus loci non est, ne tædio lectori sint, & opus hoc brevitati studens nimis intumescere faciant. Qui hos naturæ lusus observare gaudet, vel criticè distinguere in animo habet, adeat insignem Catalogum Ioannis Kentmanni à Gesnero inter Autores de re fossilii editum? item Olai Wormii locupletissimum Museum, Anselmum Boetium de Boot, & Joannem de Laet de Lapidibus, Gemmis, &c. Agricola de Fossilibus; Fallopius & Casius de Mineralibus, Borrichius de Metallicks, Aldrovandi Museum Metallicum, Becheri Physicam subterraneam, sagacissimum Cœsalpinum de Metallicis, Musea varia edita, Schwenckfeldum de Fossilibus &c. Hæc extra officinas sunt, & ad institutum nostrum haud pertinent; sic etiam apparatus & modi separandi varia fossilia à Mineris suis, eaque purgandi, & præparandi in usum Officinarum nihil ad nos; nudam enim & simplicem materiæ medicæ faciem, ut in nostris officinis apparet, hic describere & usus exhibere solum in animo habeo; qui prævias operationes accuratè scire desiderat, pervolvat magna Volumina Agricola, Erckeri, Alonsi Barba, &c. Nec variæ & multiplices præparationes & compositiones Medicamentorum ex Mineralibus, Ve-

getabilibus, & Animalibus in hoc opere descriptis nostri pensati sunt; Pharmacopœiam enim non damus. Cum *Zwelferiana*, sive *Augustana*, *Schroderiana*, *Londinensis*, *Bateana* &c. omnium manibus terantur; horum materiam seu partes simplices denudare, explicare & describere, totus sudo, & unicè incumbo; ubique brevis esse laboro, perspicuus tamen & nervosus, quantum in me est.

—❧—❧—❧—❧—❧—❧—❧—❧—

# PHARMACOLOGIÆ

SEU

MANUDUCTIONIS

AD

Materiam MEDICAM

LIBER SECUNDUS.

---

*De Phytologia.*



*Phytologia est pars illa Pharmacologiæ, quæ agit de Plantis.*

*Classes Phytologiæ sunt 3. viz. 1. Lithophytologia, quæ agit de Plantis sub-*

*Substantie lapideæ. 2. Botanologia, quæ enodat Herbas. 3. Dendrologia, quæ exhibet Arbores & Frutices.*

Expeditis Libro primo Fossilibus & subterraneis, quibus jam gaudent officinæ nostræ, ut pedem promoveamus ad ea quæ supra terram proveniunt, instituti nostri postulat ratio.

Hic verò Animus non est Historiam proponere, quod operis foret immensi, sed solummodò Plantas Officinales in vulgari usu novâ Methodo disponere, cum Tabulis, Notis Charactericis, Nominibus synonymis, Usibus & Viribus; ut Materia Medica hætenus neglecta & tenebris involuta clariùs elucescat, & Tyronibus pulchrior & illustrior appareat. Qui plenam & prolixiorē harum rerum Historiam desiderat, adeat clarissimos & diligentissimos scriptores, *Carolus Clusius, Joannem Bauhinum, Bodeum Stapelium, Joannem Raium, &c.*





## Phytologiæ Tabula Generalis.

Plantæ sunt vel substantiæ

Lapidæ; quæ Lithodendra nonnullis nuncupantur. CLASSIS PRIMA.

Herbaceæ: CLASSIS SECUNDA quæ sunt vel

{ Imperfectæ; quæ partibus præcipuis, flore scilicet &amp; semine, carere videntur. SECT. I.

{ Perfectiores; quæ flore &amp; semine donantur;

{ Hæ vel sunt semine

{ Minutissimo, &amp; nudis oculis vix conspicuo; quæ sunt vel

{ Caulisæ. SECT. II.

{ Dorsiteræ seu EPIPHYLLOSPERMÆ. SECT. III.

{ Majore; quæ vel sunt Plantula seminali

{ Bifolia, seu bivalvi, binisque Cotyledonibus instructa; sunt autem vel flore

{ Imperfecto seu stamineo, hoc est, solis staminibus, cum stylo &amp; calyce composito. SECT. IV.

{ Perfecto, seu petalode, foliis illis fugacibus instructo; Hæ vel sunt eodem

{ Composito, seu ex pluribus flosculis in unum totalem florem coeuntibus aggregato: qui vel

{ Planifolius, naturâ plerunque plenus, plantâ lactescente. SECT. V.

{ Discoides, hoc est, ex plurimis brevibus, compressis &amp; confertis flosculis, in unam quasi apparentem superficiem digestis compositus, succedente semine, vel

{ Pappo innascente alato. SECT. VI.

{ Solido &amp; pappo distincto, in CO- RYMBIFERIS. SECT. VII.

{ Fistularis, hoc est, ex pluribus concavis oblongis flosculis. HERBÆ CAPITATÆ. SECT. VIII.

b

c

Sim-

c Simplici, seu ex petalis tantum cum staminibus & Stylo constantem: Hæ sunt vel seminibus,

Nudis, hoc est, nullo præter perianthium vasculo aut tegmine donatis; ad singulos flores

Singulis. SECT. IX.

Binis, floribus

Pentapetalis, in umbellæ formam plerumque dispositis. UMBELLIFERÆ. SECT. X.

Monopetalis in quatuor lacinias dissectis, foliis caules ad nodos stellatim ambientibus. STELLATÆ. SECT. XI.

Quaternis, vel foliis in caule

Ex adverso binis, floribus labiatis, caules ut plurimum verticillorum in modum ambientibus, VERTICILLATÆ. SECT. XIII.

Alterno vel nullo ordine positis; floribus monopetalis, margine quinque partito; quæ ob folia in plerisque speciebus aspera ASPERIFOLIÆ denominantur. SECT. XII.

Pluribus quatuor, nullo certo aut definito numero. POLYSPERMÆ. SECT. XIV.

Conceptaculis propriis & à Perianthio diversis donatis, vel

Pericarpio molli, seu pulpâ per fructus maturitatem humidâ semina ambiente, vel fructu

Majore, cortice crassiore testâ, semine majore, POMIFERÆ. S. XV.

Minore, membrana tenui vestito, seminibus etiam minoribus. BACCIFERÆ. SECT. XVI.

Materia per maturitatē sicciorē, vel in

a

b

Conceptaculis pluribus & distinctis, eadem flori succedentibus semina continent **MULTISILIQUÆ**. SECT. XVII.

Solitariis & singulis, aut conjunctis, quas florum respectu dividimus in

Monopetalas. SECT. XVIII.

Tetrapetalas, flore

Uniformi seu **SILIKUOSAS & SILICULOSAS**. SECT. XIX.

Difformi, papilionem, alis expansis, quadantenus referente, quas idcirco **PAPILIONACEAS** vocant. SECT. XX.

Pentapetalas. SECT. XXI.

Unifolia aut aphylo, id est, singulis aut nullis Cotyledonibus donata, ideoque foliis succedentibus similibus, è terra exit; suntque vel

Flore perfecto, seu petalode, quæ vel sunt radice

Bulbosâ, hoc est, ex pluribus tunicis, exteriori interiore ambiente, contexta. SECT. XXII.

Tuberosâ, fibrosâve, in bulbosis affinis nobis dictis. SECT. XXIII.

Flore imperfecto seu stamineo, sunt vel

Caule geniculis nodosis non intercepto, vel non tereti. **GRAMINIFOLIÆ**. SECT. XXIV.

Culmiferæ, hoc est, quæ caulem teretem, geniculatum & concavum edunt, singulis foliis ad singula genicula eum involventibus. **FRUMENTA & GRAMINA**. SECT. XXV.

Lignosæ: **CLASSIS TERTIA**, in qua de Arboribus & Fruticibus, sunt vel caudice

[Simplici], non ramoso, hoc est, unicam tantum una vice in summo fastigio gemmam maximam

a



a mam producentes, folio Irino, i. e. striato & nervoso, nervis secundum longitudinem productis, flore tripetalo, & spathifero. SECT. I.

Ramoso, sunt vel fructu

{ A Flore sejuncto seu remoto. SECT. II. quæ vel

{ Nuciferæ, putamine duriore nucleum claudentes offeo & fragili. MEMB. I.

{ Glandiferæ, putamine coriaceo & molliore, exterius vel

{ Tegumento echinato undique incluso. MEMB. II.

{ Calyce excepto superiore parte nudo. MEMB. III.

{ Coniferæ. MEMB. IV.

{ Bacciferæ. MEMB. V.

{ Lanigeræ. MEMB. VI.

{ Flore contiguo, quæ vel

{ Flore fructuæ aggregato. SECT. III.

{ Flore simplici, nec è pluribus flosculis confecto: in quibus Flos vel

{ Summo fructui infidet, unde fructus à calyce floris velut umbilicatus est. SECT. IV. qui vel

{ Humidus; pericarpio seu pulpâ humidâ, atque vel

{ Major Polypyrenus seu plures nucleos continens. POMIFERÆ UMBILICATÆ. Membr. 1.

{ Minor Polypyrenus, BACCIFERÆ UMBILICATÆ. Membr. 2.

{ Siccus. Membr. 3.

{ Imo fructui adhæret; sunt vel fructu

{ Calyce seu cupula excepto: SECT. V. eoque vel

{ Monopyreno; fructu permatritatem vel

{ Humido majore: PRUNIFERÆ UMBILICATÆ. Membr. 1.

{ Siccio; NUCIFERÆ UMBILICATÆ. Membr. 2.

a b Dipyreno; GLANDIFERÆ UMBILICATÆ. Memb. 3.

Tetrapyreno; fructu humido BACCIFERÆ UMBILICATÆ. Memb. 4.

Non calyculato, hoc est, cujus Flos cum calyce suo decidit: Hæ vel sunt fructu

Subrotundo brevioris coque vel per maturitatem

Humido

Majore

Monopyreno; PRUNIFERÆ.

Se&. VI.

Polypyreno; POMIFERÆ. S. VII.

Minore; BACCIFERÆ. Se&. VIII.

Sicco; SECT. IX.

In longitudinem producto; SILIQUOSÆ. SECT. X. quæ sunt vel flore

Uniformi. Memb. 1.

Difformi. Memb. 2.

His addimus Partes Stirpium minus cognitarum,  
Ligna & Gummata; SECT. XI.

## CLASSIS PRIMA,

### SEU

## LITHOPHYTOLOGIA.

### De Plantis Substantiæ Lapideæ.

Plantæ Substantiæ } Fruticem: CORALLIUM.  
Lapideæ, referen- }  
tes, vel } Muscum: CORALLINA.

### I. De Corallio.

Substantiâ lapideâ, solidâ, & minimè porosâ aut spongiosâ, à Poro dicto reliquisq; lapideis marinis distinguitur.

Coral.

**Corallium album** Offic. C. B. J. B. Ger. R. H. p. 62. album majus Park. Weiße Corallen. In usu est integra Planta. In Mari Tyrrhæneo & Siculo invenitur. *Vires.* Appensum, ut Pectus contingat, Hæmorrhagiam mulierum sistit. Schrod. In fluxibus, Cardialgiâ, & morbis ab acido productis plurimum valere dicitur.

**Corallium nigrum** Offic. C. B. R. H. p. 61. nigrum sive Antipathes J. B. Ger. Park. schwarze Corallen. In mari Italico sed rarius.

**Corallium rubrum** Offic. J. B. Ger. R. H. p. 60. rubrum majus Park. Corallum rubrum, C. B. Rote Corallen. Usu venit integra Planta. Cum albo reperitur. *Vires.* Exiccât, refrigerat, adstringit. Ventriculum, & Jecur roborat, fluxus quoscunque sistit. Schrod.

## II. De Musco marino lapideo, seu Corallina.

**Corallina** J. B. R. H. p. 65. Anglica Ger. Muscus Maritimus, sive Corallina Officinarum C. B. Marinus, sive Corallina alba Officinarum Park. Meer-Muschel Corallen-Muschel. Rupibus marinis, petris, & etiam conchis accrescit, ubique ferè apud nos. *Vires.* In pulverem crassiusculum contrita ad interaneorum Vermes necandos atque etiam expellendos non immeritò celebratur.

De Corallio V. Baconem in Epistolis. Item Fer. Imperatum in Historia Naturali, & Gausium-



# CLASSIS SECUNDA, SEU

## BOTANOLOGIÆ

### SECTIO PRIMA.

#### *De Plantis Imperfectis.*

**P**lantas imperfectas voco, quæ flore & semine carere videntur.

Hæ ex loco natali distingui possunt in

- { Aquaticas, quæ vel
  - { Marinæ, consistentiæ tenerioris & herbaceæ; referentes Muscum seu Fungum: *Spongia*.
  - { Aquarum dulcium alumnæ, foliis trifidis: *Lens palustris*.
- { Extra aquas nascentes, quæ vel sunt substantiæ
  - { Crassioris ad carnes aut ligna accedentis: *Fungi*.
  - { Tenuioris & siccioris, ad herbæ naturam propius accedentis. Hæ vel sunt
    - { Cauliferæ & ramosæ: *Musci*.
    - { Caule carentes, crustæ modo in arboribus reptantes: *Lichen Arboreus*.

#### I. *De Spongia.*

**S**pongia globosa C.B.J.B.R.H.p.80. marina alba Ger. marina usualis Park. Bade Schwämme. Est substantia mollis, laxa, rara, porosa, levis, coloris spadicei, albicantis vel flavescentis, saporis & odoris nullius evidentis. Saxi, conchis, aliisque Marinis adnascitur. In *Uso* est integra Planta. *Vires*. Usus ejus internus vel nullus vel rarus est, quia non solvitur in ventriculo, unde ob intumescientiam rursus ejicitur vel supra vel infra, ac ideò pro veneno habetur;

potius in usu est Chirurgico ad sanguinem. assistendum. Vide Imperatum & Archigenis fragmenta apud Aetium de Spongiæ usu cap. 170.

## II. De Fungo.

**F**ungi nihil ferè habent commune cum plantis perfectioribus: nec enim color iis herbaceus, nec textura analogæ, neque flos ullus, aut folium propriè dictum. Brevissimo temporis spatio pleriq. oriuntur & brevis pariter ævi sunt. R. Synop. p. 8.

A. 1. Auriculæ Judæ & Fungi Sambuci Offic. Fungus membranaceus auriculam referens sive Sambucinus C. B. R. H. p. 106. F. Auriculæ Judæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambuci caudice nascens J. B. F. Sambucinus sive Auricula Judæ Ger. Park. Judas Dehrlein. Est imi trunci Sambuci veteris Excreſcentia spongiosa, lævis, coriacea, & membranacea, auriculæ instar, subtus incana & cinerea, supra nigricans, saporis terrei, & aquei, odoris nullius. Usus est integræ plantæ. Vires. In lacte decoctus aut aceto maceratus, in Angina aliisque oris aut gutturis tumoribus aut inflammationibus exhiberi solet ad gargarisandum, aut guttur eluendum. R. Cat. p. 22. Inhibet motum sanguinis, ergo astringit.

2. Agaricus Offic. Ger. Agaricum J. B. R. H. p. 107. Agaricus sive Fungus Laricis C. B. Agaricus ex Larice Park. Danner Schwämme. Est trunci Laricis excreſcentia fungosa, ex rotundo angulosa, inæqualis, pugni magnitudine, substantia internè candidissima, lævissima,

fimâ, friabili, paucis fibris intertexta ex cortice calloso; cinereo subrufo, cui inclusa exempta. Vel Notæ optimi Agarici hoc disticho continentur.

*Res frangi præsto pretiosus Agaricus esto.*

*Candidus & splendens, bonus in libra leve pendens.*

Optimus habetur hodie, qui in sylvis Tridentinis & Noricis oritur. Non ut reliqui Fungi nocte unâ prodit, sed annum integrum ad sui perfectionem requirit. *Usus* est integra planta.

*Vires.* Purgat pituitam, præcipuè crassam & lentam, & bilem utramque. Corrigitur cum Zingib. Caryophyll. Sal. Gemm. Crystal. Tart. &c. *Præp.* Agaric. Troch. Pil. de Agarico. V. Plura apud Bellonium de Arbor. Conif. & Campegium in Gall. Pentapharm.

Tubera Terræ Tartuffeln. Apud Gallos & Italianos in usu sunt non solum in Diætâ sed Medicinâ, Vide plura apud Cicarellum de Tuberibus. G. Hirsch, Brunst.

### III. De Musco.

**M**uscus autem, quamvis res notissima sit, ejusque species ab unoquoque primo statim aspectu agnoscantur, non tamen ita facile est eam definire, aut generalem aliquam descriptionem cudere, quæ omnibus Muscis & solis conveniât. Solent autem Musci censerî aridiores illæ & exuccæ, plerumque decolores, substantiæ, quæ oriuntur vel in opacis, vel in muris, tectis, arboribus, petris aliisque locis sterilioribus, immodico frigore aut calore perustis, aut etiam siccis, & squalidis, in quibus plantæ perfectæ non provenire, nec durare possunt; aut saltem plantis per-



*perfectioribus minus commoda & propitia sunt.* R. H. pag. 112.

1. *Musculus Offic. arboreus: Usnea Officina- rum C. B. R. H. p. 114. Arboreus villosus J. B. Arboreus vulgaris & Quercinus Park. Quer- nus Ger. Eichen Moos. Ex arboribus adul- tis, villi dependent incani, lignosi, tenuibus contexti filis, gustu adstringente. In Anglia rarior est. Nat. Offic. Integra planta. Vires. Musculus omnis astring.* Schröd.

2. *Musculus arboreus pulmonarius. C. B. R. H. pag. 116. Pulmonarius sive Lichen arborum, Park. Lichen arborum. Ger. L. Arboreus sive Pulmonaria arborea. J. B. Lungen-Kraut. Est planta imperfecta muscosa, conflata quasi ex foliis latis coriaceis, rugosis invicem incum- bentibus, supernâ parte viridantibus, internâ albicantibus, saporis terrestris & astringentis. Arboribus, præsertim Quercui, adnascitur. Nat. Offic. Integra planta. Vires. Siccatur & astringit; unde sanguinem profluentem com- pescit; vulnera recentia glutinat, alvum ac- menses sistit. Utuntur eâ vulgò ad Pulmonum affectiones, &c. Vide plura apud Fallopium de Musco, & Ephem. German.*

3. *Lens palustris Offic. Ger. J. B. R. H. p. 117. Palustris sive aquatica vulgaris Park. Lenti- cula palustris vulgaris C. B. Wasserlinsen. In aquosis frequens. Nat. Offic. Integra planta. Vires. Vis ei refrigerans, unde inflammatio- nibus, Podagræ, & Ignibus sacris convenit. Matth.*

## SECTIO SECUNDA.

*Herbæ semine minutissimo & nudis  
oculis vix conspicuo.*

Herbæ femine minutissimo sunt vel eodem

Canilibus ipsis aut pediculis privatis innascente  
insidentēve : Hujus generis sunt vel

Imperfectiores superficie perenni,

Caule carentes, foliis in subperficie terræ reptantibus latè se diffundentes, pediculis semina fuficientibus è foliis enatis: *Lichen*.

Cauliferæ, vasculis seminalibus

Caules terminantibus: *Polytrichum aureum*.

Ex lateribus caulium egredientibus: *Muscus*.

Perfectiones, superficie annua

[ Monophyllæ.

Spicatæ, folio integro simplici: *Ophio-*  
*glossum.*

*Paniculatæ, folio è multis segmentis com-  
posito: Lunaria.*

Polyphyllæ, foliis teretibus, caules ad nodos in orbem ambientibus multis, radiorum in modum; foliis & caulibus pyxidatim articulatis: *Equisetum*.

Foliis averfis adnascente; foliis

Integris & indivisis, oblongis, nullo ad basin fo-  
lii sinu: *Phyllitis*.

[Pinnatis aut laciniatis, simplici divifurâ.

[Majores, folio

Breviore & latiore, radice purgatrice:  
*Polypodium.*

Longiore & angustiore: *Lonchitis*.

Minores, folio

Crassiore laciniato dentato: Scolopendria.

Tenuiore pinnato: *Trichomanes*.

**Lă** | Surculosis ant femel duntaxat subdivisis

|   |          |
|---|----------|
| 2 | Majores, |
|---|----------|

- a { Majores, pinnis brevibus dentatis: *Filix Mas.*  
 { Minores, pinnis rarius dispositis, latioribus &  
 obtusioribus, pediculis longiunculis,  
 { Tenuibus, nigris, foliis tenuioribus: *Ca-*  
*pillus Veneris.*  
 { Crassioribus & viridioribus: *Adiantum*  
*album.*  
 { Ramosis aut bis subdivisis

- { Majores; pinnulis non dentatis, seminibus  
 { Advers. foliorum parti adnascantibus: *Fil-*  
*ix Foemina,*  
 { In furculis in summitatibus foliorum con-  
 gestis, palustrium alumnæ: *Osfunda*  
*Regalis.*  
 { Minores: pinnulis crassioribus, longioribus  
 & angustioribus: *Adiantum Nigrum.*

## I. De *Polytricho aureo.*

**P**Lanta est caulifera minor, vasculis seminalibus cau-  
 les terminantibus. R.M. p. 62.

*Adiantum aureum*, & *Polytrichum au-*  
*reum* Offic. *Adiantum aureum majus* Ger. R.  
*H. p. 123.* *Polytrichum aureum majus* C. B.  
*Park. Polyt. Apulei & majus quibusdam. J.B.*  
*Gulden Wiederthou oder Venus Haar. In palu-*  
*dosis. Nativa Officinalia. Integra planta. Vires.*  
 Ob signaturam commendatur ad capillos ge-  
 nerandos.

## II. De *Musco trichoide.*

**P**Lanta est caulifera minor ramosa, vasculis semina-  
 libus à lateribus caulium egredientibus. R.M. p. 62.

*Ulsnea Cranii Humani* Offic. *Musculus ex cra-*  
*nio Humano* Ger. *Park. Ulsnea seu Musculus*  
*cranio humano innatus* R. *Synops. Moos aus*  
*eines Menschen Hirnschal. In Hybernia frequens*  
 H est,



est, unde ad nos delatus est. *Nativa Officina-  
lia*. Integra planta. *Vires*. Celebratur à pluri-  
mis Authoribus in Hæmorrhagia. Ingreditur  
autem compositionem famosi illius *Unguenti Ar-  
marii* dicti.

Uinea humana duplex est, Prior in Offici-  
nis nostris usitata, ex Hibernia adfertur & nihil  
aliud est quàm Musci vulgaris terrestris species  
minor, Adianti aurei capitulis, nec ab eo dif-  
fert qui saxi & arboribus adnascitur, cui planè  
similem nec figurâ, nec odore distinguen-  
dum; ossibus equinis & bovinis in campis ja-  
centibus adnascentem observavit D. Doody,  
Pharmacopœus Londinensis, rei herbariæ ap-  
primè gnarus.

Altera crustacea est, Lichenis petræi in mô-  
dum craniis adnascens, in iisque se diffundens,  
quæ ab Autoribus præcedenti antefertur, &  
peculiari quadam virtute ad diversos morbos  
depellendos curandos dotata esse creditur.  
*Ephemer Germ. Ann.2. Observ.53.*

### III. De Lichene.

**L**ichen herbula est ex meris foliis in terræ superficie  
radiculis demissis se diffundentibus constans: è foliis  
autem oriuntur pediculi capitula sustinentes. R. Sy-  
nop. p. 20.

A. Hepatica & Lichen Offic. Lichen sive  
Hepatica vulgaris Park. R. H. p. 124. Sive He-  
patica fontana J. B. Petræus latifolius, sive  
Hepatica fontana C. B. Hepatica terrestris Ger.  
Stein-Leber Kraut. In saxi aquosis oritur. *Usus.*  
Inte-

*Integra planta. Vires.* Hepatica est insignis hæc plantula. *Ufus* præcipue in Obstructionibus Hepatis & Vesicæ, quorum signaturas in foliis gerit: hinc in Hectica, in Ictero, in Scabie & Lichenibus, in Gonorrhœa, in Febri, Extrinsecus sistit sanguinem in vulneribus. *Schrod.*

### *IV. De Ophiogloss.*

*PL*anta est singularis & sui generis, unifolia, spica linguam serpentinam imitante è medio folio egressa.

*R. Synop. p. 21.*

*Ophioglossum Offic. J. B. Ger. R. H. p. 126.* vulgatum *C. B.* Sive Lingua serpentina. *Park. Matter Zunglein.* In pratis & pascuis humidis Aprili vel Maio. *Ufu* Integra planta. Vulnerarium est insigne, tum intus sumptum, tum extrinsecus applicatum. *R. H. ibid.*

### *V. De Lunaria.*

*NO*tæ hujus sunt folium singulare pinnatum, adnatum cauliculo racemulis flosculorum & seminum onusto. *R. Synop. p. 22.*

*Lunaria Offic. Minor Ger. Park. R. H. p. 127.* Racemosa minor vel vulgaris *C. B.* Botrytis *J. B. Mohn-Kauten / Mohn-Kraut.* In montosis non raro. *Ufu* Integra planta. Ex Lunaria Walli Ungentum conficiunt, quod regioni renum illitum habetur inter certissima Dysentericæ remedia. *D. Needham.* Menses etiam sistit. *D. Eales.*

### *VI. De Equiseto.*

*E*quisetum folia habet setis similia rotatum circa caules ad genicula nascentia: tum caulis tum folia pyxidatim articulantur. *R. Synop. p. 20.*

*Cauda Equina*, & *Equisetum Offic.* *Equisetum majus* Ger. R. H. p. 128. *Majus palustre* Park. *Majus aquaticum* J. B. *Palustre longioribus setis.* C. B. *Schaafftau / Rosschwanz.* In palustribus & aquosis provenit. In usu sunt caules cum foliis suis. *Vires.* Vulnerarium est, inspissat, astringit. *Usus* præcipuè in Hæmorrhagiis sistendis, in exulceratione & vulneratione Renum & Vesicæ, &c. Schröd.

---

*Herbæ semine minutissimo, caule carentes, Epiphyllisperma.*

### I. De Phyllitide.

**F**oliis est integris & indivisis. R. Synop. p. 22. *Lingua Cervina*, & *Phyllitis Offic.* *Phyllitis* Ger. R. H. p. 134. Sive *Lingua cervina* vulg. J. B. Sive *Lingua cervina vulgaris* Park. *Phyllitis*, *Lingua cervina Officinarum* C. B. *Hirsch Zung.* Folio lato glabro, nullo ad basin appendice, saporis subastringentis. In umbrosis saxosis. In usu sunt Folia. *Vires.* *Usus* præcipuè in Lienis tumido, fluxu alvi, expuitione sanguinis. Extrinsicè mundificat vulnera ac ulcera. Schröd. Pulvis herbæ exiccatae in palpitatione cordis, in suffocatione uterina, in motibus convulsivis mira præstat. R. Cat. Angl. p. 232.

### II. De Polypodio.

**F**oliis laciniatis aut pinnatis à reliquis differt. R. Synop. p. 22.

Polypo-



*Polypodium Quercinum Offic. Polypodium*

*J. B. Ger. R. H. p. 137. Vulgare C. B. Park. Engelsfuß.* In muris & ædium tectis, inque aggeribus terrenis umbrosis ad radices aut truncos arborum. Quod Quercui innascitur reliquis in medicina præfertur. *Ufu.* Radix oblonga est, foris rufescens, intus herbacea, ex viridi pallescens, multis nodis & tophis quasi acetabulis geniculata, saporis subacris, dulcis, quodammodo astringentis, nauseosi. *Vires.* Educit bilem adustam & pituitam lentam. Hinc utilissimum in obstructionibus Mesenterii, Epatis, ac Lienis, & inde natis passionibus Hypochondriorum Scorbuticis. Rarò autem sola datur, sed aliis purgantibus ferè admiscetur, & quia segniter purgat, plerumque in decoctis vel infusionibus, rarò in aliis formulis adhibetur. *Schrod.*

### *III. De Asplenio sive Ceterach.*

*Parvitate sua & foliorum laciniis quæ breves sunt & obtuse, non conjugatim sed alternatim dispositæ, à congeneribus differt. R. Synop. p. 23.*

*Ceterach & Scolopendrium Offic. Asplenium sive Ceterach J. B. Ger. Park. R. H. p. 139. Sive Scolopendria, Ceterach Officinarum C. B. Zecht oder klein Mißkraut.* In Saxorum crepidinibus & antiquis muris. In *Ufu* sunt Folia, Septembri collecta. *Vires.* Saporis acerbi, absterg. spleneticum est. *Ufus* præcipuè in duritie Lienis, Ictero, Febri quartana: Urinam movet, calculum comminuit, Menses ciet. *Schrod. Præp. Syr. de Scolopendrio.*

## IV. De Trichomane.

**P**Arvitate suâ & foliis *Viciæ* aut *Securidacæ* æmulis à reliquis distinguitur. R. Synop. p. 23.

Polytrichum & Trichomanes Offic. Capillus Veneris Pharmacopolis. Trichomanes Park. R. H. D. 140. Mas Ger. Sive Polytrichum J. B. Sive Polytrichum Officinarum C. B. Steinh. bruch. In petris & aggeribus umbrosis & muris antiquis. *Ussu*, Folia seu Herba integra, Septembri collecta: saporis est subastringentis N. B. Officinis nostris *Adianti veri* seu *Capilli Veneris* succedaneum est, & in frequenti usu. *Vires* præcipuæ hujus plantæ, de quibus inter medicos ferè convenit, sunt Vitiis Pulmonis & Thoracis auxiliari, calculo renum & urinæ stillicidio subvenire. R. H. p. 140. Adianto, Capillo Veneris & Rutæ murariæ facultatibus omnibus respondet. Schrod. Vim nullam aperitivam in his plantis capillaribus invenio. Quando præmissa sunt aperiencia possunt usurpari, si & humores sunt tenues, absorbent illos.

## V. De Filice Mare.

**F**Oliis est surculosis aut semel duntaxat subdivisis, hoc est, in quibus mediæ costæ seu scapo surculi utrinque pinnati hinc inde adnascuntur; majoribus pinnulis, brevibus dentatis. R. Method. p. 63.

Filix mas Offic. Mas vulgaris Park. R. H. p. 143. Mas non ramola, pinnulis latis, densis, minutim dentatis Ger. *emac.* Non ramosa dentata C. B. Vulgò mas dicta, sive non ramosa J. B.

*J. B. Waldsarn / Farnkraut.* In aggeribus sepium umbrosis. *Uss.* Radix crassa, toris nigricans, intus pallida, fibrosa, multis appendicibus involuta & implexa, saporis amarulenti subastringentis. *Vires.* Planta hæc cum Filice Fœmina viribus convenit: peculiariter tamen Rachitidi morbo confert. *R. H. p. ib.* Expellit Vermes, & Calculos.

## *VI. De Adiantho Albo.*

*Pinnulis latioribus, obtusioribus, crassioribus & viridioribus Rutæ accedentibus, pediculis longiusculis à reliquis distinguitur.*

Adiantum album, Ruta muraria, & Salvia vitæ *Offic.* Album *R. H. p. 146.* Album murarium *Herm. Cat.* Ruta muraria sive Salvia vitæ *Park. Maur Naute.* In muris & pontibus, inque petrarum fissuris. *Ussus* est Herba integra. Sapore est subastringente, odoris nullius. *Vires.* Adiantho cæterisque capillaribus temperamento & facultatibus non multum absimilis est *R. Cat. Angl. p. 7.* Hæc sumenda est ubi Medici *Adiantum album* præscribunt.

## *VII. De Capillo Veneris vero.*

*Pinnulis tenuibus nigris, foliis etiam tenuioribus & priore differt.* *R. Method. p. 64.*

Adiantum vulgare, & Capillus Veneris *Offic.* Sive Capillus Veneris *J. B. R. H. p. 147.* Verum sive Capillus Veneris verus *Park.* Foliis Coriandri *C. B.* Capillus Veneris verus *Ger.* Frauen oder Venus Haar. Ex Gallia & Italia



advehitur. *Ufus* est Foliorum seu Herbae integræ; saporem & odorem habet præcedentis. *Vires*, Exiccat, attenuat, aperit, extergit, Pulmonum, Renumque vitiis medetur, Hepatis & Lienis obstructions reserat, Urinam & Menfes ciet. Pro Adiantho albo in Officinis Pharmacopolarum venditur. Hæc sumenda est cum medici *Capillum Veneris* præscribant, non *Trichom*.

### VIII. De Filice Fœmina.

*Nota* hujus folia ramosa seu bis subdivisa, magnitudo insignis, radix repens. R. Synop. p. 25.

1. Filix fœmina *Offic. Ger. R. H.* p. 149. Fœmina vulgaris *Park.* Ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis C.B. Major & prior *Trago*, seu ramosa repens *J. B. Groß Farn Kraut.* In pascuis sterilioribus. In *Uso* est Radix, longa, foris nigricans, intus albida, sapore amaricante & astringente. *Vires*, Splenetica est, subastringit, aperit. *Ufus* præcipuè in obstructionibus viscerum & imprimis Lienis & Uteri. Extrinsecus commendatur ad ambusta. *Schrod.*

2. Filix florida & Osmunda regalis *Offic.* Florida sive Osmunda regalis *Ger. R. H.* p. 151. Ramosa non dentata, florida C.B. Floribus insignis *J. B. Osmunda regalis sive Filix florida Park.* Blühend Farnkraut. In palustribus putridis & Sylvis humidis. In *Uso* est Radix crassa multas ex uno capite perplexas inter se convolutas

tas emittens radículas, foris nigricantes, intus albicantes, saporis subacris, & subamari, odoris non ingrati. *Vires.* Ad Hernias & Ulcera exploratissimi commodi est. Rachitidi morbo remedium præstantissimum & quasi proprium, aut specificum censetur.

## *IX. De Adiantho Nigro.*

*Folia firmiora & densiora glabra & Splendentia. R. H. p. 152.*

*Adiantum nigrum Offic. Nigrum Officinarum J. B. R. H. p. 152. Nigrum vulgare Park. Foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro C. B. Onopteris mas Ger. Frauenhaar. In aggeribus umbrosis ad radices arborum. Usu. Folia seu herba integra. Viribus cum Adiantho albo & Capillo Veneris convenit. Hæc sumenda est, cum Medici Adiantum nigrum præscribunt.*

## SECTIO TERTIA.

## De Herbis flore imperfecto seu Stamineo.

**F**lorem imperfectum voco, quicumq; foliis illis tennellis, fugacibus, coloratis caret, quæ nos petala dicimus, adeoque solo calyce & staminibus componitur. Sub staminibus etiam stylum comprehendimus, quo paucissimi flores carent. R. H. p. 154.

Herbæ flore imperfecto seu stamineo sunt vel

Sexu distinctæ vulgo dictæ, hoc est, in quibus ab eadem plantæ semine editis, aliæ flores absque semine producant, aliæ semine fecundæ sunt; suntque vel

Scandens, fructibus squamosis, in racemos congestis amaris: *Lupulus*.

Erectæ; seminibus solitariis; foliis

Ex adverso binis

Integris spinulis urentibus minax: *Urtica*.

Digitatis, è cujus corticibus linteamina fiunt; *Cannabis*.

Alternatim nascentibus, seminibus nunc muricatis, nunc levibus: *Spinachia*.

Sexu carentes, in quibus ab eadem specie semine editis nulla ejusmodi diversitas observatur; suntque vel semine

Flori conjuncto seu contiguo

Rotundo aut parvulum compresso, aliūve cujusunque figuræ præter triquetrum; hæ vel sunt flore floriq; calyce

Sedi seu basi seminis fructūve cohærente, semine vel

Nudo, nullo scilicet præter calycem vasculo clauso Monospermæ: *Blitum Sylvestre*.

Flosculo à Perianthio distincto incluso, herba in parietibus & ruderibus nascente: *Parietaria*.

Vasculo à flore distincto protecto, eoque vel

Bivalvi,



abc

Bivalvi, è duobus laminis seu valvulis conniventibus tantum, non cohærentibus composito: *Atriplex*.

Subrotundo, membranaceo, undique clauso, quod per maturitatem horizontaliter rumpitur, seminibus in singulis vasculis singulis: *Blitum*. Quæ coma est pulchriore: *Amaranthus* dicitur.

Summo semini aut fructui innascente, vel

Vasculo incluso

Verrucoso, osseo, in spicis prælongis, angustis, folio lato, glabro, radice esculenta: *Beta*.

Molliore & Membranaceo, nullis verruculis scabro

In terna loculamenta diviso, foliis rotundis, crassis, duris *Hederæ*: *Asarum*.

Simplici, nec diviso in cellulas, striato, flosculis & seminibus

In summis caulibus & ramulis foliis subrotundis eleganter crenatis: *Alchymilla*.

Ad latera caulium è foliorum alis exeuntibus: *Herniaria*.

Nudo, foliis angustis: *Knavell*.

Triquetro, vel

Lucido seu splendente; lateribus atq; etiam angulis æqualibus, florum calycibus

Hexaphyllis; foliis mollibus: *Lapathum*

Pentaphyllis; floribus in summis caulibus & ramulis in Spicas congestis, radice intorta: *Bistorta*.

Inæqualibus, foliis Persicæ, flosculis tetraphyllis in Spicas congestis: *Persicaria*.

Non splendente

Major & elatior, floribus Hexaphyllis, foliis amplis striatis: *Helleborus albus*.

Minor floribus pentaphyllis in foliorum sinibus, cauliculis, crebris geniculis interceptis, foliis parvis angustis: *Polygonum*.

a

In

a In eadem plantâ à flore aliquantulum remoto , fructu  
 echinato

Bina intus semina claudente foliis subrotundis :  
*Xanthium.*

Tricocco verrucoso

Elatior & arborescens, foliis laciniatis: *Ricinus.*

Pumila foliis integris : *Heliotropium Tricoccon.*

## I. De Lupulo Salictario.

**N**ota Lupuli characteristica sunt caules volubiles, fructus squamosi in racemis laxis. R. Synop. p. 28.

A. Lupulus Salictarius Offic. Mas & foemina

C. B. J. B. R. H. p. 156. Sativus & sylvestris

Park Lupulus Salictarius Ger. Hopffen. In se-

pibus. Floret Julio vel Augusto. Ufu Folia,

flores, & Turiones. Vires. Flores amari sapor-

is, anodynique sunt, discutiunt. Ufus præ-

cipue in ostructione Lienis ac Hepatis & in-

de in ltero, in Hypochondriacis affectibus, &c.

Ciet Menfes & Urinam Extrinsicus sedat do-

lores, auxiliatur contusionibus, luxationibus,

tumoribus. Turiones mundificant sanguinem,

adeoque à Scabie præservant. Schrod.

## II. De Cannabe.

**N**ota hujus characteristica sunt folia digitata, cor-  
 ticis filamenta valida & tenacia, ad funes & lin-  
 teamina texenda idonea. R. Synop. p. 28.

Cannabis Offic. Sativa C. B. R. H. p. 158.

Mas & foemina J. B. Ger. emac. Sativa mas

& foemina Park. Hanff. Seritur in agris. Ufu

semina subrotunda, parva, quæ sub tenui cor-

tice ex cinereo spadiceo lucido includunt me-

dullam albidam, sapore subdulci. Vires. Se-

men

men genitale imminuit (usu continuato) Tussis opitulatur. Ictero subvenit: & caput vaporibus replet. *Schröd.*

### *III. De Urtica.*

*Folia integra, spinulis urentibus minax.* R. Method. p. 65.

1. *Urtica urens vulgaris* Offic. Racemifera major perennis *Ra. Synops. p. 29.* Major vulgaris *J. B.* Major vulgaris & media Sylvestris *Park.* Urens *Ger.* Urens maxima & altera urens *C. B.* Brennessel. Ad sepes, & in locis ruderatis. In *Uso* sunt Radix longa lutea, Folia, & semina parva compressa, spadicea, quibus sapor subacris & tenuis. *Vires.* Diuretica & Lithontriptica est. Sanguinem depurat, Hæmoptys, Hæmorrhag. & Menses sistit. Peculiariter Cicutæ adversatur, ut & Hyoscyamo.

2. *Urtica urens Romana* Offic. Pilulifera folio profundius Urticæ majoris in modum serrato, semine magno Lini. *R. Synop. p. 29.* Romana *Ger. Park.* Urens, pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine Lini *C. B.* Romana sive Mas cum globulis *J. B.* Römische Brennessel. in arenosis. *Ufus.* Semina ferè orbicularia, compressa, lævia, splendentia è spadiceo nigricantia, saporis subacris, cum quadam tenuitate. *Vires.* *Ufus* crebri est in Pulmonum affectibus, Asthmate, Tussi contumace, Pleuritide, Peripneumonia. *Schröd.*



## IV. De Spinachia.

**N**otæ genericæ sunt: planta tota glabra, & innoxia, foliis singulatim alterno ordine positis, seminibus in nonnullis plantis muricatis R. H. p. 162.

Spinachia Offic. Ger. Park. R. H. p. ibid. Mas & foemina J. B. Lapathum hortense, seu Spinachia semine spinoso C. B. Spinat. In hortis feritur. In *Uso* sunt Folia seu Herba: culinaria potissimum est. *Vires*. Laxat alvum, lenit asperitatem Pulmonum, refrigerat Ventriculum ac Epar. Continuus usus Melancholicum generat sanguinem. Schrod.

## V. De Mercuriale.

**M**ercurialis notæ sunt folia in caule bina, adversa; semina bina, vasculis inclusa, testiculos imitata. R. Synops. p. 29.

Mercurialis Offic. Schrod. mas & foemina Ger. Park. J. B. Annua H. Ox. Testiculata sive mas sive femina Dioscoridis & Plinii C. B. Annua, glabra, vulgaris R. Synops. Bingel-Kraut. In hortis & incultis, æstate floret. *Uso*. Folia. *Vires*. Calefacit & siccant, abstergit, alvum movet, bilem & aquas purgat. Extrinsecus vulvæ adhibita menses & secundinas trahit, tumores emollit, creberrimi usus est in clysteribus. Schrod.

## VI. De Xanthio.

**C**haracteristicæ sunt, flores staminei, inutiles, nec fructui contigui: fructus durus, ecbinatus, binis  
intus

*intus cellulis bina semina, h. e. in singulis singula continens. R. H. p. 165.*

Bardana minor ☿ Lappa minor *Offic.*  
 Minor *Ger.* Lappa minor, Xanthium *Dioscoridis* C. B. Xanthium sive Lappa minor *J. B.*  
*Park.* Klein Kletten-Kraut. Ad rivulos viget  
 Julio & Augusto. *Ufu.* Radix Lappulæ &  
 Herbx. *Vires.* Gustu est amaro & subacri.  
 Usus præcipuus (secundum *Matthiolum*) in  
 minera lepræ educenda) cum Rhabarbaro ex-  
 hibetur radix in Lipothymia. Extrinsecus  
 in Struma & Tumoribus discutiendis (epithe-  
 ma) in capillis luteo colore tingendis. Herba  
 Cancrorum ardori efficax est extinguendo.  
*Schrod.*

## VII. De Heliotropio tricocco.

**H**eliotropium tricoccum, quamvis magnitudine, ut  
 ☿ caulis ☿ foliorum figurâ cum vulgari Helio-  
 tropio conveniat; flores tamen ☿ semina toto genere  
 diversum arguunt *R. H. p. 165.*

Heliotropium tricoccum *Offic.* C. B. *J. B.*  
*Ger. Park.* Sonnen-Wende. In Gallia Nar-  
 bonensi Julio & Augusto. *Ufus.* Panni succo  
 intinct. Ad nos adfertur & in Officinis Phar-  
 macopolarum ad usum Tinctorum, &c. ven-  
 ditur; in usu Medico raro aut nunquam oc-  
 currit.

## VIII. De Ricino.

**N**otæ sunt caudex lignosus, fructus tricocci muri-  
 cati, in surculo peculiari racematim fere disposi-  
 ti: semen Ricino animalculo simile *R. H. p. 166.*

1. Cataputia major ☿ Ricinus *Offic.* Ricinus sive Palma Christi, vel Kiki *Ger.* Vulgaris *C. B. J. B.* Sive Cataputia major vulgaris *Park.* Nambu - Guacù sive Ricinus Americanus *Pis.* Wunder-Baum oder Türkischer Hanff. Seritur apud Germanos & Gallos. *Ufu.* Nuclei seu Semen; fructus oblongi sunt, ovales, faba minores, includentes sub pelliculâ corticosâ lividâ & maculosâ, nucleum bipartitum, album, pinguem, sapor. subdul. acris, nauseosi. *Vires.* Potenter bilem & pituitam *αἷμα καὶ κίττω* pellit. Rarissimi itidem usus est.

2. Ricinus Americanus ☿ Nuces è Barbados *Offic.* Americanus *Ger. Park.* Americanus niger, semine nigro *C. B.* Americanus *Curcas* dictus, & Faba purgatrix Indiæ Occiduae *J. B.* Munduii-Guacu, sive Nux Cathartica Americana *Pis.* Guaca Brasiliensibus *Margg.* In Insula Barbados & alibi Indiæ Occidentalis creseit. *Ufu.* Fructus est oblongus ovalis, Fabæ minoris magnitudine, unâ parte convexa, alterâ depressa, includens sub pelliculâ corticosâ duriuscula nigrâ nucleum candidum, saporis præcedentis. *Vires.* Cum Priore ut facie ita & viribus convenit.

3. Grana Tiglia ☿ Lignum Moluccense Pavana dictum *Offic.* Granadilla Peruviana quibusdam ineptè dicta. Lignum Moluccense, foliis Malvæ, fructu Avellanæ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis *C. B.* Moluccense Pavana dictum, fructu Avellanæ *J. B.* Moluccense *Park.* Pavana Moluccensis



*Jons.* D. Pinus Indica nucleo purgante C. B. Pinei nuclei Maluccani sive purgatorii J. B. Nuclei Moluccani Park. Avellanæ purgatrices ejusdem. Ricinus arbor fructu glabro, Grana Tiglia Officinis dicto P. B. P. Cadel avenacu H. M. In Malabar & alibi colitur. *Ufu.* Lignum spongiosum, leve, rarum, atque pallidum, tenui cortice cinereo obductum, saporis acris mordacis & caustici nauseosi, odoris nullius. *Fructus* est oblongus, ovalis, Ricini vulgaris magnitudine, glaber, una parte gibbus, altera depressus, colore cinereo cum maculis nigris aspersis, saporis acris, exurentis & nauseosi. *Vires* utriusque. Calefaciunt, incidunt, attenuant, causticæ sunt naturæ, ergo in Officinis nostris raro in usu occurrunt.

## IX. De Helleboro Albo.

*F*Lore sex foliolis constructo, semine triquetro, foliis nervosis, tenuioribus, lirate striatis; radice fibrosa, purgatrice, emetica & sternutatoria vi prædita ab aliis distinguitur. R. H. p. 168.

Elleborus albus, & Veratrum album *Offic.* Helleborus albus Ger. J. B. Albus vulgaris Park. Albus flore subviridi C. B. Weiße Nieswurzel. Montanis & asperis gaudet inter Germanos. In *Ufu* est Radix oblonga, aliquando pollice crassior, foris fusca, intus alba, numerosis albicantibus fibris stipata, saporis acris, paulum amaricantis, subastringentis, ingrati & nauseosi. *Vires.* Ob violentiam purgationis quam per superiora & inferiora exereet, usum purgandi internum soli ferè Helleboro nigro

relinquit. Extrinsecus sternutationes movet, Scabies, impetigines & serpignes sanat. Schrod.

## X. De Lapatho.

**N**Ota, semen triquetrum splendens, flos Hexaphyllos i. e. sex foliis compositus, quorum tria semen obtegunt, R.H. p. 169.

1. Rha, & Rhaponticum Offic. Rhaponticum J. B. Folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis C. B. Rha verum antiquorum Ger. Rhabarbarum Alpin. exot. Lapathum præstantissimum, Rhabarbarum Officinarum dictum H. Ox. Hippolapathum maximum rotundifolium exoticum, sive Rhaponticum Thracicum, sed verius Rhabarbarum verum Park. Rhapontich. In hortis Botanicis non infrequens. Majo floret. Nat. Offic. Radix ed rarius, nam Radix illa quæ in Officinis Pharmacopolarum sub titulo Rhapontici venditur non est Radix hujus plantæ, sed Rhapontici folio Helenii incano C. B. *U*n loco suo ostendemus. Radix hujus plantæ crassa est, oblonga, ramosa, foris fusca, intus crocea, laxa, & rara, per transversum secta, spiras ostendens, saporis amaricantis, subacris & subastringentis, odoris non ingrati. Vires. Vix differt à Rhabarbaro vero, nisi quod hoc acrius sit, minus solidum, magisque croceum. Respectu facultatum purgantium, Rhabarbaro debilior, astringentium fortior est hæc Radix. Vulnerarium, ac Anodynum est. Usus in Diarrhœis, Dysenteriiis, &c.

2. Rheubarbarum Monachorum, & Rhubarbarum monachorum Offic. Hippolapathum sati-

*lativum* Ger. R. H. p. 171. *Lapathum hortense*  
*latifolium* C. B. Majus sive *Rhabarbarum monachorum* J. B. *Sativum* sive *Patientia* Park.  
München: *Rhabarber* / oder *Patienten-Kraut*  
*Burzel*. In hortis nutritur. *Ufu*. Radix longa,  
crassa, ramosa, foris ruffa, intus crocea.  
*Vires*. Radix *Rhabarbari Monachorum* eandem  
purgandi facultatem cum vero *Rhabarbaro* habere creditur, modò in duplo usurpetur.

3. *Hippolapathum* *Offic.* *Rotundifolium* Ger.  
*Rotundifolium montanum* C. B. *Rotundifolium*  
*vulgar.* Park. *Lapathum folio rotundo*  
*Alpinum* J. B. *Alpinum folio subrotundo* H.  
Ox. In Hortis. In usu sunt. Radix & Folia.  
Radix crassa, oblonga, foris fusca, intus intense  
flava. Folia subrotunda, glabra, venosa, sa-  
poris subastringentis. *Vires*. Cum priore con-  
venit. Mulierculis Botanopolis Londinensi-  
bus pro *Rhabarbaro Monachorum* venditur.

A. 4. *Hydrolapathum* *Offic.* *Magnum* Ger.  
Majus Park. *Lapathum aquaticum folio cubi-*  
*tali* C. B. *Maximum aquaticum* sive *Hydrola-*  
*pathum* J. B. *Longifolium nigrum palustre*  
sive *Britannica antiquorum vera*, vel *Hydro-*  
*lapathum nigrum* Munt. In aquis oritur. *Ufu*.  
Tota planta sed præcipuè radices. *Vires*.  
Ictericam discutit, omnia putrescentia, ut *Ery-*  
*sipelata* ulcerata et integra, *Herpetes*, *Phaga-*  
*dænica*, *Gangrænas*, &c. inhibet & sanat:  
*Hæmorrhoides* & *Menses* sistit, *Nervis* eo-  
rumque incommodis medetur. *Venena* ac *Ser-*  
*pentes* abigit. *Omnes anginæ species* depellit,  
*variaque rheumata* aufert,

5. *La-*



5. *Lapathum acutum* & *Oxylapathum* *Offic.*  
*Acutum* *Ger.* *Acutum majus* *Park.* *Folio acuto*  
*plano* *C. B.* *Acutum sive Oxylapathum* *J. B.*  
*Grindt. Wurzel.* In humidioribus. *Ufu.* *Radix*  
*simplex, crassa, exterius fusca, interius lutea,*  
*saporis subastringentis, semina triquetra &*  
*spadicea, saporis astringentis.* *Vires.* *Radix,*  
*usûs crebri & præcipui est in scabie extergen-*  
*da ac siccanda, sanguine despumando.*

## XI. De Acetosa.

*Semen triquetrum splendens, flos Hexaphyllos, quo-*  
*rum tria semen obtegunt, foliis acidis* *R. H.*  
*p. 169.*

1. *Acetosa* & *Oxalis* *Offic. vulgaris* *Park.*  
*R. H. p. 178.* *Pratensis* *C. B.* *Oxalis seu Aceto-*  
*sa* *Ger.* *Vulgaris folio longo* *J. B.* *Gemeiner*  
*Saurampffer.* In pratis & pascuis. *Æstate*  
*floret.* *Ufu.* *Folia succulenta, glabra, acuminata,*  
*colore atro-virenti, sapore acido; Radix*  
*fibrosa, lutea, sapore astringente; Semina, tri-*  
*quetra, spadicea.* *Vires.* *Cardiaca imprimis*  
*est & Epatica, resistit putredini appetitum ex-*  
*citât, choleram reprimât, sitim sedât, unde in*  
*febris simplicibus ac pestilentibus usitatissi-*  
*ma est.* *Schröd.*

2. *Acetosa arvensis lanceolata* *Offic. C. B.*  
*R. H. p. 180.* *Minor lanceolata* *Park.* *Parva*  
*auriculata repens* *J. B.* *Oxalis tenuifolia* *Ger.*  
*Klein-blättrigte* *Saurampffer.* In arvis. *Ufu.*  
*Folia.*

3. *Acetosa Romana rotundifolia* *Offic. Ro-*  
*tundifolia hortensis* *C. B.* *Oxalis Franca seu*  
*Ros.*

Romana Ger. Sativa Franca sive Romana rotundifolia. Park. Folio rotundiore repens J.B. Spanische Saurampffer. In hortis. Usu Folia. Vires. Eadem cum reliquis.

## *XII. De Persicaria.*

Flosculis tetraphyllis in spicis summos caules terminantibus, à reliquis hujus familiae distinguitur.

R. Synop. p. 33.

1. Persicaria non maculata & Hydropiper Offic. Vulgaris acris sive Hydropiper J.B. R.H. p. 182. Urens sive Hydropiper C.B. Vulgaris acris sive minor Park. Hydropiper Ger. Wasser-Pfeffer. In aquosis. Usu. Folia. Vires. Extrinsecus in Vulneribus, Tumoribus induratis, Ulceribus inveteratis, Schröd.

2. Persicaria maculosa Offic. Ger. Mitis J.B. Mitis maculosa & non maculosa C.B. Mitis vulgaris seu maculosa Park. Flöh-Kraut. Mücken-Kraut. In aquosis & humidis. Floret Julio & Augusto. Usu. Folia.

## *XIII. De Polygono.*

Planta est exigua, caule provoluto & crebris geniculis nodoso, semine triquetro in foliorum alis. R. Synop. p. 33.

Centinodia, & Polygonum Offic. Polygonum mas vulgare Ger. R. H. p. 184. Mas vulgare majus Park. Latifolium C. B. Sive Centinodia J. B. Weg-Gras oder Weg-Erit. In locis glareosis. Usu. Herba. Vires. Siccatur & adstringit, vulnerarium est. Usus præcipue in sistendis fluxibus quibuscunque. Schröd.

## XIV. De Bistorta.

*Flores pentaphylli, semina triquetra, angulis acutis; Radices intorta.* R. Synop. p. 34.

Bistorta Offic. Major Ger. R. H. p. 186. Major vulgaris Parck. Major rugosioribus foliis. J. B. Radice minus intorta C. B. Rohte Matternwurz. Krebswurz. In Humidioribus. Floret Junio. *Ufu.* Radix oblonga, crassa, foris ex spadicceo nigricans, intus rufescens, saporis astringentis, odoris nullius; Folia oblonga acuminata, glauca. *Vires.* Refrigerat, siccatur, & validè astringit. *Ufus* præcipuè in sistendis fluxibus quibuscunque; Abortum prohibet & Veneno resistit.

## XV. De Atriplice.

*Nota sunt, vasculis è duabus valvulis conniventibus compositis semina inclusa habere & quidem singula in singulis.* R. Hist. p. 191.

Atriplex Offic. Alba hortensis J. B. Parck. Hortensis alba, sive pallidè virens C. B. Sativa alba Ger. Milden / Melde / Molte. In hortis. *Ufu.* Folia triangula. Semina rotunda compressa. *Vires.* Refrigerat & humectat, cocta estur ut olus; in alvo solvenda celebris est. *Ufus* Officinalis præcipuè externus est in Clysteribus & epithematibus paregoricis. R. H.

## XVI. De Blito.

*Semina rotunda seu compressa, singularia seu solitaria, quibus flosculi ipsi, pro vasculis sunt.* R. H. p. 195.



1. *Blitum Offic. Rubrum majus Ger. C. B. Park. R. H. p. 200. Pulchrum rectum magnum rubrum. J. B. Meyer. In Hortis. Ufu. Folia. Vires. Refrigerat & humectat.*

2. *Botrys & Ambrosia Offic. Botrys Ger. R. H. p. 196. Vulgaris Park. Ambrosioides vulgaris C. B. Botrys plerisque Botanicis J. B. Atriplex odora seu suaveolens H. Ox. Türckischer Beyfuß. In Hortis. Ufu. Herba integra, foliis profundius laciniatis, saporis sub-acris, aromat. odoris fragrantis & grati. Vires. Planta est Thoracica & Uterina. Specificum est ad pulmonum & uteri affectus, in torminibus infantum remedium est.*

3. *Bonus Henricus, tota bona, & Mercurialis Offic. Blitum, Bonus Henricus dictum R. H. p. 195. Perenne Spinachiae facie H. Ox. Bonus Henricus J. B. Ger. Lapathum unctuosum, C. B. Park. Guter Heinrich. In locis ruderalis, ad semitas. Floret Aprili & Majo. Ufu. Folia. Vires. Refrigerat & humectat, cocta est ut olus, alvum solvit, ad ulcera sordida purganda & glutinanda confert, est etiam anodyna & dolores Podagrae mitigat. Usus externus in Clysteribus praecipue.*

## *XVII. De Amarantho.*

*Coma speciosa & immarcescibili à reliquis differt. R. H. p. 201.*

*Amaranthus, & flos amoris Offic. Maximus C. B. Panicula sparsa Ger. Purpureus major paniculis sparsis Park. Paniculis procumbentibus semine albo seu Quinva H. Ox. Blitum*

maximum sive *Amaranthus major*, femine albo. *J. B.* Gammet-Blum, Tausendschön/ oder Flor-Amor. In hortis colitur. *Ufu.* Flores. Augusto floret. *Vires.* Refrigerat & siccatur, modicè astringit. Hinc usus in Fluxionibus cutis, ut expuitione sanguinis, Diarrhœa, Dysenteria, fluxu Uterino, &c. *Schröd.*

### XVIII. De Beta.

*Fructu verrucoso osseo, cui flos insidet à reliquis differt.* *R. H. p. 204.*

1. Beta alba *Offic. Ger.* Communis alba *Park.* candida *J. B.* Alba vel pallescens, quæ Cicla *Officinarum C. B.* Weiß Mangoldt/ oder Rüben. In Hortis. *Ufu.* Radix, folia & Semina. Radix est lignosa, crassa, longa & candida. Folia sunt crassa & succulenta, sapore nitroso. Semina rotunda & aspera, fusca. *Vires.* Laxat alvum, ob nitrositatem, Errhinum est. Usus internus ejus potissimus culinaris est in acetariis, &c. Externus in Errhinis & Clysteribus. Ex 5. Herb. emollientibus est.

2. Beta rubra *Offic. Ger.* rubra vulgaris *C. B.* *J. B.* communis rubra *Park.* Rote Mangoldt/ oder rote Rüben. Cum priore. *Ufu.* Radix, folia. Radix crassa est & rubra. Folia rubentia, breviora quàm præcedentis. *Vires*, easdem habet cum præcedente.

Quæ folio est obscuriore Beta nigra *Offic.* dicitur.

## XIX. De Parietaria.

**C**alyx & totius comæ hirsutie, aspera & vestium tenaci; seminibus splendentibus, quibus flosculi sunt pro vasculis, à reliquis differt. R. H. p. 205.

Helxine & Parietaria Offic. Parietaria. Ger. J. B. Vulgaris Park. Officinarum & Dioscoridis C. B. Tag und Nacht/St Peters-Kraut. In muris. Ufu. Folia. Vires. Abstergit & leniter adstringit, refrigeratque. Usus internus rarior est, tamen prodest in morbis pectoris, in Stranguria & Calculo. Usus in enematis ad ventris, uteri & renum dolores. Extrinsecus in Tumoribus, Erysipelate, ambustis & vulneribus conducit. Schröd.

## XX. De Asaro.

**N**ote sunt Cytini in tres lacinias divisi: lacinia sunt Calyx floris, cui subest fructus tricoccus. Folia crassa, splendentia.

1. Asarum Offic. Ger. C. B. J. B. R. H. p. 209. Vulgare Park. Haselnurk. In hortis colitur. Vere floret. Ufu. Radix & folia. Radices tenues, fibrosæ, spadiceæ, saporis acris, purgativi, nauseabundi, cum levi quadam astringentia, odoris non ingrati. Folia sunt subrotunda, splendentia. Vires. Crassam pituitam, bilemque utramque per Vomitum ac nonnunquam per secessum violenter expurgat, Diureticum est, ac emmenagogum insigne, Hepar, Lienem, Vesicamque tellis aperit: Hinc utile in Arthritide, Hydrope, Febribus, præcipue



cipue tertiana & quartana, in Ictero, &c. Schrod.

2. *Asarum Virginianum* Offic. *Virginianum* *Pistlochiae* foliis subrotundis *Cyclamini* more maculatis *P. P. Tab. 78.* *Cyclamini* folio *Virginianum* *Banif. MSS. Cat.* *Serpentaria* nigra vulgò. *Nattermurg.* Ex Virginia ad nos delata est, & *Botanopolis* nostris pro vero venditur, quod sapore & odore refert. In Catalogo simplicium ad *Pharmacopœiam Collegii* nostri *Londinensis* *Synonyma* hujus plantæ cum *Synonymis Radicis Serpentariæ*, nescio, qua de causa, confunduntur.

## XXI. De *Alchimilla*.

*Hujus* Note sunt flosculi in summis caulibus umbellatim congesti, octo foliis herbaceis compositi, vasculis seminalibus singulis bina semina continentibus insidentes. *R. Synops. p. 39.*

*Alchimilla* Offic. *Ger. Vulgaris Park.* Major vulgaris. *C. A.* Perennis, viridis, major, foliis ex luteo, virentibus *H. Ox.* *Pes leonis* sive *Alchimilla* *J. B. Sinnaum.* In pratis & pascuis. Floret Majo. *Ussu.* Folia subrotunda, plicata, angulosa, crenata, saporis astringentis. *Vires.* Vulneraria est, consolidat, astringit, extergit, Sanguinem incrassat, sistit menses & alba mulierum profluvia. *Schrod. R. H. p. 299.*

*XXII. De Camphorata.*

*NOTE* sunt caules lignosi, folia hirsuta, odorata, flosculi tetraphylli, semine nigro.

Camphorata Offic. hirsuta C. B. R. H. p. 210. Monspeliensium J. B. Major Monspeliensium Park. In hortis Botanicis nonnunquam reperitur. *Ufu.* Herba.

*XXIII. De Kali.*

*F*oliorum carentia, & surculis teretibus, viridibus, succulentis è quibusdam velut squamis pyxidatim geniculatis compositis, sub quibus semina occultantur, ab aliis hujus Classis distinguitur. R. Synops. p 40.

Kali Offic. Geniculatum alterum vel minus C. B. Kali Arabum aliud J. B. Salskraut. In salis maritimis. *Ufu.* Folia. *Vires.* Usus præcipuus in Culinis, conditi ad embammata.

Varia hujus plantæ præparata in usu sunt.

1. *Alumen Catinum* Offic. Soda quibusdam, aliis *Cineres clavellati.* Pott-Asche. Fit ex cineribus hujus herbæ, magna quantitate ustæ, in massam nigro cineream concreascentibus. *Vires.*

Acre est, mordax & causticum, herbæque è qua fit vires obtinet, sed validiores. 2. *Axungia vitri* Offic. *Sal vitri* nonnullis. Glasz-Salz. Salis genus est, colore cinereo seu griseo, ut vocant, gustu pariter acri & mordaci, qui dum vitrum in fornace funditur ollarum marginibus adhærescit, ad hunc autem locum pertinet, quia Vitrum nihil aliud est quàm Cineres clavellati & arena vel lapides simul fusa & vi ignis unita.

*Vires.*

*Vires.* Sodæ vires obtinet, & in usu est apud Veterinarios ad emundandos equorum oculos. Utile etiam est ad dentes repurgandos, Ulcera manantia, Herpetes, Impetigines exsiccandos, quin & Scabiei conducit. Aurifabri ad aurum ferruminandum eo utuntur. 3. *Lixivium* Offic. Sauge. Cinerum prædictorum in aqua solutio est; acris est, erodentis & causticæ naturæ. *Vires.* Utile est ad cutem emaculandam, ad Alphos, Lentigines, Ephelides, aliaque ejus vitia extergenda, verum in ejus usu cauto opus est, ne cutem ipsam violet & erodat. Ex hoc Lixivio efficitur celebre illud causticum Officinis *Lapis infernalis* dictum. Sapo Offic. Geisse. Qui ex lixivio prædicto fit, estque trium generum. 1. *Sapo Communis.* Gemeine oder schwarze Geisse. Fit ex Oleo viliori, sevo, & lixivio ana ad consistentiam coctis, è quo addita fuligine fit *Sapo niger.* 2. *Sapo Castiliensis.* Blaue Geisse. Eodem quo præcedens modo fit, verum pro oleo communi adhibetur oleum Olivarum, Indico aliòve simili medicamine caeruleo colore tingitur, & ad consistentiam coctus in laterculos scinditur. 3. *Sapo Venetus vel Albus.* Weiße oder Spanische Geisse. Hujus parandi modum vide in Topographicis, &c. Observationibus amicis & vicini nostri clarissimi D. J. Rati. *Vires.* Sapo aperit, digerit, & extergit, Urinam ciet, obstructions Hepatis & Lienis reserat, arenas pellit. Extrinsecus adhibitum attrahit, ambustis cute non exulcerata medetur, præsertim



fertim niger, omne genus pediculos interimit, imprimis feros. NB. *Lixivium* Offic. non ex Soda tantum fit, sed ex cineribus cujuscunque generis ligni concremati. 5. *Sal Alkali* Offic. Proprie & strictè loquendo pro sale duntaxat ex cineribus clavellatis extract. accipitur, verum sensu latiore & generali ad duo significanda extenditur: nimirum, 1. *Sal Volatile*, quod ex animalium partibus vel excrementis elicitur, cujusmodi sunt *Sal Cornu Cervi*, *Urinæ*, &c. 2. *Fixum*, quod ex cineribus plantarum elicitur, ut *Sal Kali*, *Absinthii*, &c.

## XXIV. De Polygonoide.

*Folia adversa; cauliculi humi sparsi, flosculi herbaei.* R. Synop. p. 45.

*Herniaria* Offic. Ger. J. B. R. H. p. 214. *Millegrana major* sive *Herniaria vulgaris* Park. *Polygonum minus* sive *Millegrana major* C. B. *Minus* sive *Millegrana major*, *Herniaria glabra* H. Ox. Bruch-oder Harn-Kraut. In arenosis & glareosis. Floret Junio & Julio. Usu. Herba sive planta integra. Vires. Refrigerat, & siccatur. Usus præcipue est in Hernia curanda, Urina cienda, Renum & Vesicæ calculo atterendo, Ventriculi ac aliarum partium mucilagine incidendâ, educendâ Bile ac aqua expellenda, adeoque in Ictero curando. Schrödt.

## SECTIO QUARTA.

## De Herbis flore aggregato, planifolio.

**F**LOS aggregatus nobis dicitur, qui ex pluribus flo-  
sculis in unum totalem florem coeuntibus constat;  
quorum unusquisque non tantum folio seu bractea co-  
lorata, verum insuper vel staminibus, vel stylo saltem  
constat, & singuli singulis seminibus coherent. R. H.  
p. 217.

Herbæ flore aggregato planifolio sunt vel Seminibus  
Pappotis seu alatis

Latiusculis & compressis, brevibus; caulibus

Gracilioribus, firmioribus, solidioribus & minus  
concavis, capitulis minoribus; *Lactuca*.

Majoribus, tenerioribus & fistulosis, capitulis  
grandioribus, foliis Carduorum more spinosis,  
spinulis mitioribus; *Sonchus*.

Teretiusculis, striatis tamen, non angulosis, lon-  
gioribus

Maximis, foliis longis, in acutum desinentibus,  
non laciniatis, flore circa meridiem se clau-  
dente, radice perenni, calyce florem vix exce-  
dente, radice crassa, esculenta; *Scorzonera*.

Minoribus,

Non repentes, foliis plerumque laciniatis caule

Non ramoso, nudo in foliis vacuo, flore ma-  
gno; *Dens leonis*.

Ramoso, foliis cincto, floribus plerumque  
minoribus, in singulis caulibus pluribus, se-  
mine eltrino aut ruffo majore; *Hieracium*.

Reptantes, flagellis emissis, foliis longioribus  
pilis obsitis; *Pilosella*.

Pappo destitutis, foliis & caulibus levibus, floribus  
& lateribus caulium & ramulorum exeuntibus,  
foliis

Laciniatis, radice perenni; *Cichoreum*.

Integris, radice annua; *Endivia*.

Herbæ

## Herbæ Floræ aggregato seminibus papposis.

### I. De Lactuca.

**N**ota sunt, Semina brevia, latiuscula & compressa, utrinque acuminata; caules quam Sonchi graciliores, firmiores & minus concavi; capitula minora. R. H. p. 220.

Lactuca Offic. Sativa C. B. Ger. Sativa non capitata J. B. Garten Lattich. Seritur in hortis. Junio & Julio floret. Ufu. Folia ac Semen. Folia sunt longa, lata, rugosa, coloris pallidè virentis, saporis non ingrati. Semina parva oblonga, compressa, pallida, utrinque acuminata, saporis aquei. Vires. Refrigerat, conciliat somnum, bilis effervescentiam ac æstum compefcit, lac auget, alvum leniter movet, ventriculo convenit. Extrinsecus, sedat dolorem capitis, medetur ambustis, &c. Semen. Est ex seminibus frigidis, quæ minora dicuntur. Valet ad Gonorrhœam virulentam, ad Urinæ ardorem, &c, Schrod. Præp. Aq. destill. Syr. e Succo.

### II. De Soncho.

**S**onchus à reliquis distinguitur, capitulis grandioribus, caulibusque tenerioribus & fistulosioribus, semine compresso. R. Synod. p. 41.

A. i. Sonchus lævis Offic. Ger. R. H. p. 222. Lævis vulgaris Park, Lævis laciniatus C. B. Lact.



Laciniatus non spinosus *J. B. Hasen Rohl. In hortis cultis, &c. Majo, &c. Floret. Usu. Folia.*

2. *Sonchus asper* *Offic. asperior Ger. Asper laciniatus Park, C. B. Laciniatus spinosus J. B. Gänse Diestel. Cum priore. Usu. Folia. Vires.* Soncho nonnulli utuntur hyeme in acetariis. Suspiriosos & Asthmaticos juvare, & Stranguriam sanare dicitur. Vis ei refrigerans, unde Inflammationibus quibuscunque utiliter imponitur. *R. Cat. Angl. p. 278.*

### III. De Hieracio.

*D*iffert à reliquis, caulibus gracilioribus, seminibus longioribus non compressis, sed teretiusculis aut angulosis. *R. Synop. p. 42.*

*Hieracium* *Offic. longius radiculatum Ger. emac. Park. Dentis leonis folio obtuso majus C. B. Macrocaulon junceum, sive minus primum Dodonæi. J. B. Habich Kraut. In pascuis ubique Junio & Julio floret. Usu. Folia, sed raro aut nunquam.*

### IV. De Pilosella.

*N*otæ; semine esse parvo, nigro, flagellis reptatricibus. *R. H. p. 242.*

*Auricula muris* & *Pilosella* *Offic. Pilosella repens Ger. Minor vulgaris repens Park. Major repens hirsuta C. B. Majori flore, sive vulgaris repens. J. B. Mauß Ochrolein/ Nagel Kraut. In pascuis siccioribus Junio & Julio floret. Usu. Folia oblonga, pilosa, saporis subacris & astringentis, Vires. Astringit, abstergit, constipat.*

*Sterea*

Sternutatoria est & vulneraria, Dysenteriam, Alvi Uterique fluxus sistit, bilem æstuantem sedat & incrassat, Hernias curat. Extrinsecus medetur ulceribus oris, (in collutionibus) Hæmorrhagiam narium sedat, (pulvis inditus) *Schrod.* Herpetem miliarem sanat, (succus illitus) *D. Hulse. Præp. Aq. Syr.*

2. *Hispidula Offic. Schrod. Pilosella montana hispida parvo flore C.B. Montana parvo flore Parck. Stachlicht Maußohrlein.* in locis siccis & montium jugis. Majo & Junio floret. *Usu.* Herba cum floribus. *Vires.* Easdem vires obtinet, quas reliqua *Pilosellæ* genera: peculiari tamen proprietate pulmoni exulcerato conferre statuitur, & sanguinis exspuitioni. *Schrod.*

## V. De Dente Leonis.

*AB Hieracio floribus in singulis caulibus singulis differt. R. Synop. p. 46.*

Dens leonis, & *Taraxacum Offic. Leonis Ger. Leonis vulgaris Park. Leonis latiore folio C.B. Hedypnois sive Dens leonis Fuchsi J.B. Löwen-Zahn / Pfaffen-Rohrlein.* In hortis & pascuis ubique. Per totam æstatem floret. *Usu.* Radix, ac Folia. *Vires.* Epatica est, cum *Endivia* conveniens, quo tamen potentiùs operatur: *Ufus* præcipuè in febribus putridis inveteratis. *Schrod.*

## VI. De Scorzonera.

*Flos à calycis radiis non superatur. R. H. p. 248.*  
*Scorzonera nostras & Hispanica Offic. Hi-*  
K
spanica

*spanica major Park. latifolia sinuata C. B. Viperaria* five *Scorzonera Hispanica Ger.* *Tragopogon Hispanicus* five *Escorzonera* aut *Scorzonera J. B. Schlangen-Mord.* In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Radix oblonga digitum crassa, foris pallidè rutescens, Intus candida, saporis subdulcis, tenuis & grati, odoris nullius. Sicca ex Hispania ad nos adfertur. *Vires,* Alexipharmaca est. *Ufus* præcipuè in moribus serpentum, Peste, Febre, Melancholia, Epilepsia, Vertigine, &c. Commendatur ad Uteri suffocationem *Schrod. Aq. Rad. cond.*

---

*Herbæ Flore aggregato seminibus  
pappo destitutis.*

*VII. De Cichoreo.*

**A** Reliquis dignoscitur floribus è lateribus caulium & ramorum exeuntibus velut spicatis.  
*R. Synop. p. 47.*

i. *Cichoreum sativum Offic. J. B. C. R. Ger. Park. R. H. p. 255. Wegwart / Hindleuffte.* In hortis. Floret Junio. *Ufu.* Flores, Folia, & Radix. Flores sunt pulchri, cærulei, saporis amari; Folia laciniata, hirsuta; Radix crassa, oblonga, foris fusca, intus candida. Tota planta amara est. *Vires.* Epatica est nobilissima, aperit, Diuretica etiam est, attenuat, extergit. *Ufus* præcip. in Hepatis obstructione & febribus, Hæmorrhagias sistere creditur. *Schrod.*



2. Cichoreum agreste Offic. Sylvestre sive Officinarum C. B. Sylvestre Ger. Park. J. B. Wild Wegwart. Secus vias, & in agrorum limitibus. Junio floret. *Ufu.* Flores, folia, & semen. Floribus & foliis cum præcedente convenit. Semina sunt parva, oblonga, angulosa, fusca, sapore aqueo. *Vires.* Aqua è floribus destillata, inflammationibus & caligini oculorum imposita, potenter remedium affert. *R. Cat. Angl. p. 70.* Folia cocta & aceto comesta Gonorrhœam reprimunt. *Matth.* Vires quoque sativi habet. *Præp. Aq. Syr. Conf.* Est ex seminibus frigidis minoribus.

### VIII. De Endivia.

*A* Cichoreo differt foliis brevioribus non laciniatis, & quod annua planta sit. *R. H. p. 254.*

Endivia, Scariola & Seriola Offic. Sativa Park. Intybus sativa Ger. Sativa latifolia sive Endivia vulgaris C. B. Intybum sativum latifolium J. B. Endivien. Seritur in hortis. Junio floret. *Ufu.* Folia & Semina. *Folium* est latum, glabrum, non acuminatum. *Semina* sunt Cichoreo consimilia, colore pallidiora. *Vires.* Hepatica est nobilissima, refrigerat, abstergit, aperit. Diuretica etiam est. *Ufus* frequentissimi in febribus biliosis. *Schrod.* Est ex seminibus frigidis quæ minora dicuntur. *Præp. Aq.*

## SECTIO QUINTA.

*De Herbis flore composito discoide  
papposis,*

Herbæ flore discoide papposæ sunt vel  
floribus erumpentibus

## Ante Folia

- { In singulis caulibus singulis, radiatis, flavis; foliis subrotundis, subtus præcipuè incanis; *Tussilago*.
- { In uno caule pluribus, in thyrsum dispositis, nudis; foliis subrotundis Bechii, sed majoribus; *Petasites*.

## Post folia, disco

Radiato, foliis levibus sive mollibus

Subrotundis, flore flavo majore, radice scorpioide aut brachiata, facultate deleteriâ; *Doronicum*.

## Oblongis

{ Maximis subtus incanis, floribus etiam amplis, radice crassâ, aromaticâ; *Helenium*.

{ Minoribus florum petalis

{ Aridioribus & exuccis, unde durabiliores sunt nec citò marcescunt, coloresque diu retinent siccati,

{ Frontatis, aut velut bullatis, flavicantibus; *Stæchas citrina*.

{ Cuspidatis, foliis laciniatis, spinosis; *Carlina*.

{ Succulentioribus & citò marcescentibus, terrestres

{ Foliis odoratis & glutinosi; *Conyza*.

{ Inodori, floribus minoribus confertis in summo caule; *Virga aurea*.

## Nudo, foliis

{ Digitatis, floribus velut in umbella dispositis; *Eupatorium*.

{ Laciniatis, floribus flavis; *Senecio*.

{ Integris, terrestres, minores, tomentosæ & incanæ; *Gnaphalium*.

## I. De Tussilagine.

**C**haracteristicae sunt, Flores folia antevertentes, & brevi marcescentes, in singulis cauliculis singuli, radiati: folia subrotunda, subtus incana. R. Synop. p. 47. Tussilago & Offic. Tussilago J. B. Ger. Farfara Park. R. H. p. 259. Vulgaris C. B. Rosshub oder Stuss-Lattich. In locis humidis. Februario, vel Martio floret. *Uso* Radix, Folia & flores. Radix tenuis, longa, candida, saporis subacris cum levi lentore, odoris nullius. Folia subrotunda, subtus incana, saporis & odoris ut supra. Flores lutei & radiati. *Vires*. Planta est Thoracica. Usus praecipue internè in Tussi, Orthopnoea. Vomitisque pectoris, quibus singulis & fumus ejus ore hiantè attractus mederi creditur. Extrinsecus, Folia recentia imposita Ulceribus calidis & inflammationibus profunt. Schrod. Præp. Aq. Syr. è Succo, & Conf. flor.

## II. De Petasite.

**N**otæ diagnosticæ sunt, flores folia antevertentes in eodem caule plures in Thyrsum dispositi, nudi, brevi, unà cum caulibus exarescentes; folia subrotunda Bechii, sed majora. R. Synop p. 48.

Petasites Offic. Ger. Vulgaris Park. Major & vulgaris C. B. Vulgaris rubens rotundiori folio J. B. Pestilenz Wurzel. In aquosis. Martio floret. *Uso*. Radix oblonga, crassa, ramosa, resinosa, foris fusca, intus albicans, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis. *Vires*. Sudorifica est ac alexipharmaca, in Peste. Commendatur etiam in Lipothymia U-



terina, spiritus difficultate, Tussi, Asthmate;  
Facit & ad latos ventris Lumbricos: Urinam  
etiam & Menses ciet. Extrinsecus ad Bubones  
& Ulcera maligna prodesse dicitur. R. H. p. 260.

### III. De Conyza.

**H**erba est flore composito, in pappos abeunte, foliis  
integris, odorata, hirsuta & glutinosa. R. H. p. 261.

Conyza & Pulicaria Offic. Media Ger. R. H.  
p. 262. Media Asteris flore luteo, vel tertia Di-  
oscoridis C. B. Media Matthioli, flore magno lu-  
teo, humidis locis proveniens J. B. Herba Dy-  
senterica Cat. Altdorf. Geel Munst. Locis Humi-  
dis & aquosis Julio & Augusto floret. Usu. Folia.  
Vires. Suffitu venenatas bestias fugat, culices  
abigit, & pulices necat. Diosc. Ad profligan-  
dam Scabiem Unguentum ex radice & foliis  
parant nonnulli. R. H.

### IV. De Helenio.

**P**artium omnium magnitudine, radicis etiam sapo-  
re amaro, & aromatico, à reliquis differt. R.  
Synop. p. 49.

Enula campana & Helenium Offic. Hele-  
nium Ger. Vulgare C. B. Sive Enula campana  
J. B. Park. Allant. In pratis & pascuis humidis,  
Junio & Julio floret. Usu. Radix oblonga,  
crassa, foris fusca, intus alba, saporis acris,  
amaricantis, aromatici, odoris fragrantis. Vires.  
Pulmonica est, Stomachica, Alexipharmaca,  
Sudorifica, &c. Usus præcipuè in Tussi, Asth-  
mate, in cruditatibus Ventriculi emendandis,  
ureteribus referandis, in Peste contagiosisque  
morbis arcendis. Externè in Scabie, Spasmo,  
&

& Ischiadico dolore commendatur, Schrod.  
Præp. Pul. Syr. Condit. & Ung.

## V. De Doronico.

**N**Otæ sunt, flores aurei, speciosi, sparsi, in summis caulibus & ramulis, in longos pediculos excurrentibus singulares. Semina parva nigricantia; folia lata & subrotunda, radices tuberosæ, venenatæ, R. H. p. 274.

1. Doronicum Romanum Offic. Vulgare Park. Majus Officinaarum Ger. *emac.* Radice Scorpii C. B. Fremde Genssenwurzel. In Hortis curiosorum Junio floret. *Ussu.* Radix, sed non sine periculo.

2. Doronicum Germanicum Offic. Park. Germanicum foliis semper ex adverso nascentibus, villosis J. B. Plantaginis folio alterum C. B. Calendula Alpina Ger. Arnica, Schrod. Mutterwurz / Wölvley. In montibus crescit. Æstate floret. *Ussu.* Planta. *Vires.* Calefacit & siccant, partium est tenuium, sudorifica & diuretica, nonnunquam & vomitoria, &c. Schrod.

## Vi. De Virga aurea.

**N**Otæ sunt, floribus esse parvis aureis, plurimis in summis caulibus in Thyrsos aut Corymbos, umbellæve congestis. R. H. p. 278.

1. Virga aurea Offic. Ger. Aurea vulgaris Park. Aurea angustifolia minus ferrata C. B. Aurea vulgaris latifolia J. B. Feder-Kraut. In ericetis ac montosis sylvis. Augusto floret. *Ussu.* Folia & flores. Folia longa, hirsuta, ferrata, saporis amari & astringentis. Flores lutei. *Vires.* Vulneraria est celeberrima, nec non Lithontripica & Diuretica. Confert Diarrhœæ & Dysentericæ, Sanguinis expuitioni medetur. Schrod.

2. Consolida Saracenica & Solidago Offic. Solidago Saracenica Ger. R. H. p. 279, Saracenica

vera, salicis folio Park. Virga aurea angustifolia serrata C. B. Aurea angustifolia serrata, sive Solidago Saracenica J. B. Heidnisch Wundkraut. Septembri floret. *Ufu*. Folia longa, lata, glabra, per ambitum crenata, sapore aromatico & astringente. *Vires*. Vulneraria est insignis, usu interno & externo adhiberi apta, medetur & Fistulis, Ulcera maligna mundificata & sanat. Schrod.

## VII. De Helichryso.

*Nota sunt flores foliis marginalibus, aridioribus, & exuccis, quaque coloris gratiam diu retinent siccatam, cincti; folia oblonga, angusta, canescentia, aut etiam tomentosa & incana. R. H. p. 280.*

Stœchas citrina Offic. Citrina sive Amaranthus luteus Ger. Citrinatenuifolia Narbonensis J. B. Elichryson sive Stœchas citrina angustifolia C. B. Chrysocome sive Coma aurea & Stœchas citrina vulgaris Park. Rein Blume / oder Stein-Blumen. In hortis colitur. Maio floret. *Ufu*. Flores. *Vires*. In obstructione Epatis, Urinæ, Lienis, Mensium, Sanguinem coagulatum resolvunt, Catarrhos exiccant, Lumbricos fugant. Schrod.

## VIII. De Carlinâ.

*Florum petalis marginalibus cuspidatis, foliis dissectis & spinosis à reliquis differt. R. H. p. 288.*

Chamæleon albus & Carlina Offic. Carlina sive Chamæleon albus Dioscoridis Ger. Humilis Park. Acaulos magno flore C. B. Caulifera & acaulis J. B. Ebermurf. In pascuis sterilibus Germaniæ & Italiæ. Junio floret. *Ufu*. Radix oblonga, crassa, foris ruffa, intus albida, saporis



poris acris, gravis, aromatici, odoris fragrantis.  
*Vires.* Alexipharmaca est & sudorifica, Pestis  
 contagia arcet, curatque si tempestivè propine-  
 tur. Diuretica quoque est & emmenagoga;  
 Hydropicis confert, tineas ventris necat. *Schrod.*

## *IX. De Senecione*

*Herba est flore composito, papposo, nudo, foliis laci-  
 niatis R. H. p. 290.*

*Erigerum* & *Senecio Offic.* *Senecio vul-  
 garis Park.* *Minor vulgaris C. B.* *Vulgaris five  
 Erigeron J. B.* *Erigeron Ger.* *Kreuz Kraut / St.  
 Jacobs Kraut.* In locis cultis, arvis, &c. Omni  
 anni tempore occurrit. *Ufu.* *Herba. Vires,* In  
 Cholera, Ictero, intemperie calida Epatis, Lum-  
 bricis, vomitu & expuitione sanguinis, Ischia-  
 dico dolore, fluore muliebri. Extrinsicus in  
 mammis inflammatis, Scabie capitis, Strumis,  
 dolore Ventriculi, Urina remorata, Arthritide,  
 & Vulneribus. *Schrod.*

## *X. De Eupatorio cannabino.*

*Foliis digitatis, floribus nudis purpureis congeneri-  
 bus differt. R. Synop. p. 51.*

*Eupatorium Avicennæ* & *Eupatorium  
 cannabinum Offic.* *Cannabinum Parck. C. B.* *Can-  
 nabinum mas Ger.* *Adulterinum J. B.* *Hanff:  
 Odermennig.* Ad fluminum ripas. Julio floret.  
*Ufus* est Herbae, quæ foliis est digitatis, sapo-  
 re amaro, odore fragranti. *Vires.* Epaticum  
 est & Vulnerarium. *Ufus* præcipuè, in cache-  
 xia, Catarrhis & Tussi, inque Urina & Mensi-  
 bus retentis. *Schrod.*

## XI. De Gnaphalio.

*Folia tomento deducta, flores nudi, flosculis præ parvitate vix conspicuis. R. Synop. p. 51.*

Gnaphalium Offic. Vulgare majus. C.B. Germanicum J. B. Minus, five Herba impia Ger. Rühr Kraut. In siccioribus. Junio floret. Uss. folia. Vires. Aq. destillata ad Cancrum mammillarum usus est. Dod. Siccat & astringit. Hinc Hæmorrhagiæ, Dysenterici, nimio mensium fluxui, atque Anginæ conducit. R.H.p.295.

## SECTIO SEXTA.

## De Herbis Capitatis.

**H**erbæ capitatæ notæ sunt, flores ex flosculis fistulosis compositi, semina cum pappo calice squamoso inclusa, in formam subrotundam capitatis æmulam conglobata.

Herbæ capitatæ sunt vel capitulis

{ Maximis esculentis; foliis aliâs levibus, aliâs spinosis; *Scolymus*.

{ Minoribus foliis

{ Spinosis, aculeis

{ Crebris & rigidioribus; *Carduus*.

{ Mitioribus & mollioribus

{ Semine striato flavescenti; *Carduus Benedictus*.

{ Semine lævi, albo, purgatrice; *Carthamus*.

{ Spinis destitutis

{ Per margines serratis, capitulis lævibus majoribus; *Centaurium majus*.

{ Per margines æqualibus, capitulis

{ Lappaceis, squamis in mucrones hamatos desinentibus, foliis maximis; *Bardana*.

{ Lævibus, flosculis marginalibus, minùs profunde dissectis, ore in latum expanso; *Cyanus*.

I. D.

## I. De Scolymo.

*C*inara nobis dicitur Cardui genus capite maximo, conum Pineum æmulante, squammis crassioribus & majoribus, unguibus carnosiss, esculentis. R. R. p. 299.

Cinera & Scolymus Offic. Hortensis foliis non aculeatis, & aculeatis C. B. Maxima Ger. Carduus sive Scolymus sativus spinosus & non spinosus J. B. Artischocken In hortis colitur. Floret Julio aut Augusto. *Ufu.* Radix. In culinis autem capita. *Vires.* Aperit, Urinam ciet, & Icterus curat.

## II. De Carduis.

*F*oliis aculeatis seu spinosis à reliquis differt. R. Synop. p. 52.

1. Carthamus, & Cnicos Offic. Sive Cnicus J. B. Ger. emac. R. H. p. 302. Cnicus sativus sive Carthamum Officinarum C. B. Sive Carthamus sativus Park. Wilder Safran. Seritur in agris & hortis. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Flores & Semina oblonga, angulosa, alba, includentia sub cortice duriusculo pulpam albicantem, sapore dulci. *Vires.* Flosculi alvum emolliunt: & Ictero mederi dicuntur. Præcipuus usus est ad tingendum. Semen pituitam viscosam ac aquas vomitu ac dejectione purgat: confert maximè pectori: Stomacho adversatur. Schrod. Præp. Elect.

2. Carduus Benedictus Offic. J. B. Ger. Park. R. H. p. 303. Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus Benedictus C. B. Cardobenedictens Kraut. In hortis seritur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia & Semina. Folia laciniata hirsuta, spinu-



spinulis brevibus armata, sapore amaro insigni prædita. *Semina* oblonga, striata, fusca, intus albida. *Vires*. Herba Cardiaca, Alexipharmaca ac Sudorifica est, Veneno ac putredini resistit, Febres etiam inveteratas & quartanas curat. Semen vires easdem obtinet. *Schrod. Præp. Aq. Sal. Syr. è Suc.*

3. *Atractylis Offic.* Ger Lutea C. B. Flore luteo Park. Vera flore luteo J. B. In hortis curiosorum. Julio floret. *Ussu*. Folia. *Vires*. Cum Carduo Benedicto viribus convenit.

4. *Carduus Mariæ Offic.* Ger. R. H. p. 312. Mariæ vulgaris. Park. Marianus, sive lacteis maculis notatus J. B. Albis maculis notatus vulgaris C. B. Mariendiestel / Viehdiestel, In aggeribus fossarum & ad agrorum margines. Julio floret. *Ussu*. Folia lata, laciniata, splendentia, & glabra venis lacteis inspersa. *Vires*. Pectoralis imprimis censetur, æmulaturque Carduum Ben. *Ussu* præcip. in Pleuritide, Ictero & Hydrope. *Schrod.* Culinaris potius quam medicinalis videtur

5. *Chamæleon niger Offic.* Ger. R. H. p. 314. Niger verus Park. Niger umbellatus, flore cæruleo hyacinthino C. B. Niger Dioscoridis Maranthæ J. B. Biesem Knopff. In Græcia. Floret Junio. *Ussu*. Radix oblonga, crassa, foris fusca, intus alba. *Vires*. Cum Carlina viribus convenit.

### III. De Cyano.

**N**Ota sunt folia non spinosa, capitula levia, flosculi marginales minùs profundè dissecti, ore in latum expanso. R. Sznop. p. 55.

1. *Cyanus major Offic.* Ger. Major vulgaris Park.

*Park.* Montanus latifolius, vel Verbasculum cyanoides C. B. Alpinus radice perpetua J. B. Brosse blau Kornblume. In hortis Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia & Flores. Folia longa, lata, laevigata. Flores cærulei, laciniati, odoris non ingrati. *Vires.* Alexipharmaca & Uterina est.

2. Cyanus minor *Offic.* Minor vulgaris *Ger. Park.* Segetum C. B. Cyanus J. B. H. R. p. 321. Kleine blaue Kornblume. Inter segetes. Junio floret. *Ufu.* Folia & Flores. Folia longa, acuminata & laciniata, albicantia, saporis astrin- gentis. Flores cærulei, fistulosi, sapore aqueo & stringenti. *Vires.* Aq. stillatitia florum utilis esse dicitur in Oculorum inflammationibus, ru- dine, lippitudine, in hydrope. *Schrod.*

#### *IV. De Centaurio Majore.*

*Nota sunt Capitula squamata, levia seu aculeis desti- tuta, folia per ambitum serrata, magnitudo insignis.*  
*H. p.* 329.

1. Centaurium majus *Offic.* Magnum *Ger.* Majus vulgare *Park.* Majus folio in lacinias plu- res diviso C. B. Majus juglandis folio J. B. Rheu- monticæ. In hortis Botanicis. Julio floret. *Ufu.* Radix longa, recta, crassa, foris ruffa, intus ru- dens, saporis amari. *Vires.* Vulneraria est, sapo- ris subdulcis ac subacris, Ufus in fluxibus alvi, dysenteria: Menses profluviumque à contrario fit: prodest in Hernia, Sanguine coagulato, ex- punctione Sanguinis, in Febribus stomachicis, par aperit ac roborat; summopere laudatur à nonnullis in obstructione venarum Mesaraica- rum & in morbis hinc ortis, *Schrod.*

2. *Rhaponticum Offic.* folio *Helenii* incano. *C.B.* *Enulæ* folio latiore *Park.* *Rha capitatum Lobelii Ger.* *Centaurium majus*, *Rha capitatum* folio *Enulæ* subtus incano & hirsuto *J. B.* *Rhaponticæ*. In hortis *Botanicorum* nonnunquam reperitur. *Radix hujus plantæ* pro *Rhapontico Antiquorum* per errorem in *Officinis nostris* substituitur & venditur. *Vires.* Cum præcedente viribus ut facie convenit.

## V. De *Bardana*.

*Nota* sunt capitula squamata, lappacea, ob squamarum sc. mucrones aduncos, folia amplissima, *R. Synop. p. 54.*

*Bardana major*, & *Lappa major Offic.* *Major. Ger. R. H. p. 332.* *Vulgaris major Park.* *Lappa major, Arcium Dioscoridis C.B.* *Personata* sive *Lappa major* aut *Bardana J. B.* *Grosse Klette.* *Ad vias publicas, &c.* *Junio* floret. *Usu.* *Radix, Folia, & Semina.* *Radix* oblonga, crassa, foris nigra intus alba, saporis subdulcis, odoris grati. *Semina* oblonga, striata, fusca, crassiuscula, sapore subamaro. *Vires.* Siccatur, est *Pulmonica, Diuretica, Diaphoretica, extergens, subastringens*: Hinc convenit in *Asthmate, calculo, expuitione Sanguinis, in vulneribus inveteratis, tumore lienis, aliarumque partium, in Arthriticis morbis.* *Semen* insigne censetur *Lithontripticum.* *Folia* imponuntur vulneribus inveteratis, articulis luxatis, ambustis, &c. *Schrod.* In febribus & passionibus *Hystericis* plantis pedum applicantur non sine successu.

## SECTIO



## SECTIO SEPTIMA.

### De Herbis Corymbiferis.

hæ sunt vel

Veræ

[ Disco Radiato, foliis marginalibus, flosculis

[ Concoloribus, floribus

[ Sparsis aut solitariis, colore flavo, foliis

[ Integris; humilior & minor, seminibus incurvis; *Calendula*.

[ Laciniatis; *Chrysanthemum*.

[ Tenuiter dissectis; *Bupbthalmum*.

[ In umbellæ formam dispositis, foliis

[ Integris angustis serratis; *Ptarmica*.

[ Tenuissimè dissectis; *Millefolium*.

[ Diversi ab eisdem coloris, flavi sc. cum folia marginalia alba sint: suntque floribus vel

[ Sparsis, foliis

[ Integris, ad margines crenatis, caule

[ Nudo, flore in fastigio singulari minore;

[ *Bellis minor*.

[ Folioso, elatior, floribus Majoribus; *Bellis major*.

[ Multifariam in segmenta tenuissima divisis, odorata; *Chamamelum*.

[ In Umbellæ formam dispositis, foliis laciniatis pallidis, odore vehementiore; *Parthenium*.

[ Nudo seu non radiato, caule

[ Determinato, flosculis sc. eum finientibus

[ Singularibus, frutescens, superficie perenni, foliis in caule figillatim positis, odoratis; *Chamacyparissus*.

[ Pluribus velut in umbellam dispositis; foliis

[ Integris,

[ Latis, elatior & major; *Costus hortorum*.

[ Angustis, per margines incisis, humilior & minor; *Ageratum*.

[ Dissectis & velut alatis; *Tanacetum*.

Indeter-

- a b Indeterminato, floribus eum non finientibus, verum secundum ejus longitudinem vel in spicas dispositis, foliis dissectis
- { Fruticescens, caulibus perennibus, lignosis, foliorum segmentis tenuissimis; *Abrotanum*.
  - { Superficie annua,
    - { Amarore insignis, odore vehementiore, folio incano; *Absinthium*.
    - { Minus amara, odore remissione, folio subtus incano, superne virente; *Artemisia*.

Anomalæ sunt vel

- { Flore composito propriè dicto, singulis florem totalem componentibus, flosculis singulis seminibus insidentibus, suisque privatis calycibus donatis; *Scabiosa*.
- { Flore compositum imitante, seu potius capitulo vel Spicâ flosculorum densâ & congestâ florem compositum exprimente; foliis perianthiorum æmulis capitulorum bases cingentibus.
  - { Majores & elatiores, radice non vivaci, foliis ad margines non spinosis, in caule adversis; caulibus concavis, iidemque & foliorum costis spinis brevibus horridis; capitulis è squamis, sinibus suis semina amplexis in mucrones oblongos exeuntibus, compositis; Foliorum adversorum basibus conjunctis seu continuis; *Dipsacus*.
  - { Minores & humiliores, radice restibili & perpetua; foliis saltem superioribus in caule, profundè laciniatis & per margines spinis acutis armatis; caulibus solidis minime spinosis; capitulis è Squamis echinatis compositis; *Eryngium*.

## I. De Calendula.

**S** Eminibus curvis à reliquis differt.

Calendula Offic. Ger. Sativa R. H. p. 337.

Caltha J. B. Vulgaris C. B. Ringel-Blumen. In Hortis

Fortis frequens. Florere Maio incipit. *Ufu.* Folia & flores. *Vires.* Flores cardiaci censentur, hinc & Hepatici & Alexipharmaci, sudores movent, Variolas expellunt, Ictero medentur, Menses cient, Partum promovent ( fumus subitus parturienti ) Aq. destillata, oculis instillata, eorum rubori & inflammationi medetur. *R. H. p. 338. Præp. Aq. Conj.*

### *II. De Chrysanthemo.*

*Eminibus angulosis, aut striatis à reliquis differt.*  
*R. H. p. 338.*

1. Inguinalis & Aster Atticus *Offic.* Aster Atticus *Ger.* Atticus luteus verus *Park.* Luteus foliolis ad florem rigidis *C. B. Goldblum. In Hortis Botanicorum. Maio floret. Ufu. Folia. Vires.* Vulneraria est, sed in usum raro occurrit.

2. Bupthalmum *Offic.* vulgare *Ger. Dioscoridis C. B. Matthioli sive vulgare Millefolium. Park. Chamæmelum, Chrysanthemum odorundam J. B. Rindes. Auge. In locis humidis. Id rarius. Junio floret. Ufu. Folia. Vires. Cum præcedente Viribus convenit.*

### *III. De Ptarmica.*

*Nota sunt flores in umbella: barbulis disco medio concoloribus; folia integra ad margines serrata.*  
*R. H. p. 344.*

*Ptarmica Offic. Ger. Vulgaris Park. Vulgare folio longo serrato flore albo J. B. Dracunculus serrato folio pratensis C. B. Dorant / oder Reisser spiger Reinsarn. In pratis. Julio floret. Ufu. Folia. Vires. Gustu acri est & fervido. Pulvis*

*L*

*naribus*



naribus inditus sternutamenta movet. Cruda additur acetariis ad frigiditatem eorum temperandam & corrigendam. R. H.

#### IV. De Millefolio.

**F**lores in umbellæ formam dispositi barbulis medio disco concoloribus; folia tenuissimè dissecta.

R. Synop. p. 56.

Millefolium Offic. vulgare Park. Vulgare album C. B. Terrestre vulgare Ger. Millefolium Stratiotes pennatum terrestre J. B. Schaaffgarbe. In pascuis. Junio floret. Usu. Folia. Vires. Medetur Ulceribus, Tumoribus ac inflammationibus, sine repulsione. Usu interno convenit in Hæmorrhagiis ac fluxionibus omnis generis extrinsecus adhibetur in Cephalalgia, vulneribus consolidandis. Tumoribus herniæ, & penis scitibus venenatis, Schrod.

#### V. De Bellide.

**N**ote sunt, Flos radiatus barbulis seu foliis marginalibus diversi à medio disco coloris: folia integræ ferrata.

1. Bellis major Offic. J. B. Ger. R. H. p. 356. Major vulgaris sive sylvestris Park. Major Sylvestris caule folioso C. B. Gänseblum / Kuhblum St. Johannis Blum. In pascuis & inter segetes. Maio floret. Usu. Folia & flores. Vires. Herba integra in Zythogalo decocta & pota adversus Asthma, Phthisin, Orthopnœam singulariter remedium censetur. Utilis est in vulneribus & rupturis R. H. Flores mulierculis Botanopolit. Londinensibus pro Buphtalmi floribus venduntur.

2. *Bellis minor.* *Symphytum minimum* &  
*Consolida minima* *Offic.* *Sylvestris minor*  
*C. B.* *Minor sylvestris simplex* *Park.* *Minor*  
*Sylvestris* *Ger.* *Minor sylvestris spontanea* *J. B.*  
*Maaglieben.* *In pratis & pascuis.* *Ufu.* *Radix,*  
*Folia & flores.* *Vires.* *Vulneraria est insignis:*  
*exterius in Emplastris & fomentis adhibetur,*  
*interius succus ejus vulnerariis potionibus ad-*  
*miscetur, R. H.*

## *VI. De Pyrethro.*

*Flore majore* & *radicis acri servidoq; sapore à Cha-*  
*mamelo differt. R. H. p. 353.*

*Pyrethrum* *Offic.* *flore Bellidis* *C. B.* *Vulga-*  
*re Officinarum* *Park.* *Officinarum* *Ger.* *Ber-*  
*tram.* *Ex Orientis partibus infertur.* *Ufu.* *Ra-*  
*dix longa, crassa, foris subruffo colore nigri-*  
*cans, intus albida, sapore acri & admodum ter-*  
*vido.* *Vires.* *Optimum remedium habetur in*  
*Paralyfi linguæ cum vocis amissione.* *Ad den-*  
*tium dolorem radix masticata in usu est. R. H.*  
*Ad Venerem stimulat, quartanam curat, in He-*  
*mierania juvat. Schröd.*

## *VII. De Chamamelo.*

*N*ota sunt; *Folia tenuissime dissecta: flores sparsi,*  
*satis grandes, foliis marginalibus albis discum fla-*  
*vum cingentibus. R. H. p. 353.*

1. *Chamamelum* *Offic.* *Romanum* *Germ.*  
*Nobile seu odoratius* *C. B.* *Odoratissimum re-*  
*pens flore simplici* *J. B.* *vulgare* *Park.* *Rö-*  
*mische Camillen.* *In pascuis uliginosis.* *Junio*  
*L 2* *Ho.*

floret. *Ufu.* Folia seu Herba & Flores. *Vires.* Digerit, laxat, mollit, mitigat dolorem, Menses & Urinam ciet; eapropter usus insignis est in dolore Colico, in cruciatibus spasmi flatulenti, & convulsionibus. Extrinsicus ejus usus est in paregoricis, emollientibus, maturantibus cataplasmatibus, clysteribus, &c. *Schrod.* Inter omnes plantas quotquot in Balneo contra calculum recipiuntur nihil floribus Chamæmeli efficacius *R. Cat. Angl. p. 65.*

2. Chamæmelum vulgare flore multiplici *Park.* Anglicum flore multiplici *Ger.* Nobile flore multiplici *C. B.* Repens odoratissimum perenne flore multiplici *J. B.* Gemeine Camillen. In hortis colitur, & eadem species cum præcedente esse videtur. *Præp. Aq. Ol. per Decoct. Ol. Chym.*

3. Cotula foetida *Offic. Ger. Park.* Chamæmelum foetidum *C. B.* Foetidum sive Cotula foetida *J. B.* Kröten-Dill oder Hunds-Dill. Inter segetes. *Ufu.* Folia. *Vires.* Decoctio non aliter quàm Castoreum contra præfocationem Uteri infessu, fomentationibus ac odoratu saluberima est. *Trag.* Decoctum hujus, aut Succus expressus à nonnullis ad Scrophulas cum successu propinari solet. *Cat. Angl. p. 81.*

## VIII. De Parthenio.

*N*Otae sunt Flores velut in umbella, barbulis albis discum medium luteum ambientibus: odor gravis. *R. Synops. p. 57.*

Matri-



*Matricaria* & *Parthenium* *Offic.* *Parthenium*  
five *Matricaria vulgaris* C. B. *Matricaria* Ger.  
*Vulgaris* Park. Vulgò, minus *Parthenium* J. B.  
*Mertram* oder *Mutterkraut*. Ad Sepes. Junio  
floret. *Ufu*. Folia cum Floribus. *Vires*. *Ufus*  
præcip. in affectibus Uteri frigidis ac flatulen-  
tis, in obstructione Menstruum, in impotentia  
Veneris, in Hydrope; purgat per Urinam, non-  
nunquam & per alvum, &c. In Febribus pu-  
tridis, in calculo Renum, in Vertigine & in  
Arthritide valet. *Schröd.*

---

*De Corymbiferis floribus non radiatis.*

*IX. De Chamæcyparisso.*

*Nota sunt*, Superficies fruticosa, perennis, folia  
odorata; flores solitarii ramulos terminantes. R.  
H. p. 358.

*Abrotanum foemina*, & *Chamæcyparissus*  
*Offic.* foemina vulgare Park. Foemina foliis te-  
retibus C. B. *Chamæcyparissus* J. B. Ger. *Gars-  
ten-Cypres*. In hortis colitur. Junio floret.  
*Ufu*. Folia. *Vires*. Convenit qualitatibus cum  
Abrotano mare, usque præcipui est in obstru-  
ctionibus Epatis, Renum & Ureterum; Icte-  
rum curat; Ventris Lumbricos interimit, tum  
semen, tum herba ipsa in lacte cocta & pota.  
R. H. Folia sicca ad sistenda alba foeminarum  
profluvia conferre scribit *Matthioli*.

## X. De Costo hortorum.

**N**ote sunt, Flores lutei nudi in umbellam aggesti, folia integra, lata, in ambitu crenata, odor validus. R. H. p. 363.

Balsamita mas, & costus hortorum Offic. mas Ger. Costus hortorum Park. Mentha hortensis corymbifera C. B. Corymbifera sive Costus hortensis J. B. Frauen-Kraut. In hortis colitur. Julio floret. Usu. Folia. Vires. Sanat cruditates Stomachi, ructus, vomitus, foetores oris, tormina, cardialgias ex Stomacho, dolores capitis ex eodem. Hofman.

## XI. De Agerato.

**N**ote sunt, Flores lutei, nudi, in umbellae formam dispositi, folia integra profundè serrata. R. H. p. 364.

Ageratum & Eupatorium Mesuae Offic. vulgare sive Costus hortorum minor Park. Folia serratis C. B. plerisque, Herba Julia quibusdam J. B. Balsamita foemina sive Ageratum Ger. Leber-Balsam. In hortis colitur. Junio floret. Usu. Planta cum foliis & floribus. Vires. Temperamento & viribus cum praecedente convenit. R. H.

## XII. De Tanaceto.

**C**haracteristicae sunt, Flores nudi, flavi, in umbellae formam digesti, folia laciniata. R. Synop p. 58.

Tanacetum Offic. Ger. Vulgare Park. Vulgare luteum C. H. Vulgare flore luteo J. L. Reinsahrn. In agrorum marginibus Junio floret.

ret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Temperamento & viribus cum Parthenio convenit. Vulnerarium, Uterinum, ac Nephriticum est. *Ufus* præcip. in Lumbricis, torminibus Ventris, Calculo Renum & Vesicæ, Mensibus obstructis, Flatibus & Hydrop. *Schrod.* Aqua destillata Vermes necat.

### XIII. De Absinthio.

*Nota sunt Flores nudi, caulis indeterminatus, folia incana, amaror insignis.* R. Synop. p. 58.

1. Absinthium vulgare *Offic. Park. R. H.* p. 366. Vulgare majus *J. B.* Latifolium sive Ponticum *Ger.* Ponticum seu Romanum *Officinarum,* seu *Dioscoridis C. B.* *Wermuth.* In incultis. Floret Julio. *Ufu.* Folia & Summitates. *Vires.* Stomachicum, Hepaticum & Spleneticum imprimis est. Ventriculum & Epar roborat, appetentiam ad cibum excitat, obstructions reserat, & inde natos affectus tollit, ut Icterus, Hydropem, &c. Febribus putridis etiam diuturnis confert: vitiosos humores per urinam expurgat: pellit præterea interaneorum Vermes, tandemque vestes à tineis conservat. R. Cat. Angl. p. 2.

2. Absinthium Romanum *Offic. Ponticum* sive Romanum vulgare *Park.* Tenuifolium *Ponticum Galeni* *Ger.* Ponticum tenuifolium incanum *C. B.* Ponticum vulgare, folio inferiorius albo *J. B.* *Römischer Wermuth.* In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Folia ac Summitates. *Vires.* Cum priore convenit.



3. *Abſinthium Seriphium Offic.* *Maritimum album Ger.* *Seriphium ſive marinum Anglicum Park.* *Seriphium Belgicum C. B. J. B. Gees Bermuth.* In locis maritimis. Julio floret. *Uſu.* Folia ac Summitates. *Vires* eadem cum reliquis. *Mulierculæ Botanopolæ Londinenſes Abſinthium Romanum* vocant.

4. *Santonicum & Semen Sanctum Offic.* *Sementina Ger.* *Abſinthium Santonicum Alexandrinum C. B.* *Santonicum Alexandrinum, ſive Sementina, & Semen Sanctum Park.* *Lumbricorum ſemen vulgare & Matthioli J. B. Wurſaamen.* Ex Alexandria adfertur. *Uſu.* Semina parva oblonga, quaſi ex ſquamolis tuniculis compaſta, flaveſcentia, amara ſunt cum acrimonia, & odore graviuſculo. *Vires.* In Lumbricis cujuſcunque generis enecandis, fugandis & expellendis. *Schrod. V.* Plura apud *Februm in Hiſtor. Abſinthii.*

#### XIV. De Abrotano.

*Eſt Herba, caule indeterminato, flore nudo, frutiſa, foliorum laciniis anguſtioribus, longioribus, minusq; incanis quàm Abſinthii. R. Synop. p. 58.*

*Abrotanum mas Offic. Ger. R. H. p. 371.* *Vulgare J. B. Mas vulgare Park.* *Mas anguſtifolium majus C. B. Stabwurk.* In hortis colitur Julio floret. *Uſu.* Folia ac Summitates. *Vires.* Subaſtringit & validè diſcutit, reſiſtit putredini ac veneno; morſibus venenatorum animalium medetur; Vermes necat, Urinam movet, impetus Hyſtericos diſcutit, regi-

regium morbum solvit. Extrinsecus usus est in ossibus exsiccandis, roborandisque; ad Alopeciam etiam tollendam commendatur. Schrod.

## XV. De Artemisia.

*Nota sunt, caulis indeterminatus, folia dissecta, subtus incana, superne viridia; odor & sapor remissior quam Absinthii, flores purpurascens, non deorsum nutantes. R. Synop. p. 59.*

1. Artemisia Offic. vulgaris J. B. Park. Vulgaris major C. B. Mater herbarum Ger. Benth. Ad agrorum margines. Floret Julio. Usu. Summitates. Vires. Uterina est, Menses, coctum, secundinas pellit; sordes abstergit? Schrod.

2. Artemisia Chinensis cujus mollugo Moxa dicitur P. P. Tab. 15. An Ytzequinpathi Hern? Benth. aus China. In China oritur. Usu. Mollugo foliorum, Moxa dicta, hoc modo preparata; Recipiantur folia exsiccata probe & caule decerpta, conterantur manibus eousque, donec ex- pulvisculo viridi lanuginosa interiores fibra velut tegmen substrata remaneant. Sin madefiant odore manus, repetendum opus est ad desideratam teneritudinem. Vires. Celebre est remedium in curatione Podagræ per unctionem apud Gentes Orientales, & etiam inter Europæos. V. Buschoff, & D. Temple Eq. Aurat. de Moxâ.

## De Herbis Corymbiferis affinibus.

### I. De Scabiosa.

**Q**uod flosculi florem componentis, suis singuli calycibus, à flore delapso, residuis donentur, & reliquis differt. R. Synop. p. 59.

1. Scabiosa Offic. major vulgaris Ger. Vulgaris pratensis Park. Pratensis hirsuta quæ Officinarum C. B. Major communior hirsuta folio laciniato J. B. Scabiosen. In pascuis Junio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Alexipharmaca ac Pulmonica est. *Uusus præcip.* in Apoplethematibus, Pleurisi, Angina, Tussi, Asthmate, Peste, fistulosis ulceribus. *Extrinsecus* in Scabie, Pruritu, impetigine, &c. Schrod.

2. Morsus Diaboli & Succisa Offic. Diaboli Ger. Diaboli vulgaris flore purpureo Park. Succisa glabra C. B. Sive, Morsus Diaboli J. B. Teuffels Abbis. In pratis & pascuis. Augusto floret. *Usu.* Folia Flores & Radix. *Vires.* Alexipharmaca & Vulneraria est, ut Scabiosa, cum qua & reliquis facultatibus convenit &c. Schrod.

### II. De Dipsaco.

**N**ote sunt, caules spinosi, flosculi squamis disjuncti singuli singulis seminibus insidentes, in capitulis congesti. R. H. p. 381.



1. *Dipsacus sativus*, & *Carduus Fullonum*.  
*Offic.* *Sativus* C. B. J. B. *Ger. Park.* *Kartenz*  
*Diestel* oder *Weber-Karten*. *Seritur in Agris.*  
*Junio floret.* *Ufus præcip. ad pannos depe-*  
*ndendos.*

2. *Dipsacus sylvestris* sive *Labrum Vene-*  
*s Offic.* J. B. *Sylvestris* *Ger. Park.* *Sylve-*  
*ris* aut *Virga pastoris major* C. B. *Wilde*  
*Karten-Diestel.* *In incultis.* *Junio floret.* *Ufu.*  
*Termiculi in echinis reperti.* *Hos impari nu-*  
*mero pennâ anserinâ inclusos.* *Febre quartana*  
*laborantium collis amuleti aut remedii loco*  
*appendere vulgus nostratum solet.* R. H.  
2. 3 8 2.

### III. De *Eryngio*.

*Nota sunt, folia spinosa; flores in summis caulibus*  
*& ramulis in capitula congesti, quibus radiata*  
*substant folia, caules solidi & minime spinosi.* R. Sy-  
nops. p. 60.

*Eryngium Offic. marinum* *Ger. Park.* J. B.  
*Maritimum* C. B. *Drachen-Diestel* oder *Manns-*  
*Greu.* *In littoribus arenosis.* *Julio floret.*  
*Ufu.* *Radix.* *Vires.* *Epatica, Nephritica &*  
*Alexipharmaca est.* *Ufus præcip. in obstru-*  
*ctis mensibus, Urina, Epate, Vesica biliaria,*  
*Liene, &c.* *Et hinc in Ictero, & Colica,*  
*Schröd.*

## SECTIO OCTAVA.

## De Herbis Monospermis.

**H**erbæ Monospermæ semine nudo Notæ sunt. Flos talodes; Semina nuda, ad singulos flores singula.

Herbæ Monospermæ sunt, vel Seminibus

Pappo innascente alatis, flosculis in summis caulibus exiguis velut in umbella, caule tereti & inani, foliis per intervalla binis vestito: *Valeriana*.

Pappo carentibus, foliis

Varie & tenuitur dissectis, glaucis, floribus ad papilionaceos accedentibus, in spicas congestis: *Flammula*.

Simplicibus, maritimæ, caulibus nudis, flosculis summitate pluribus, foliis latis: *Limonium*.

Pinnatis, caule simplici, rectâ assurgente, vel non ramoso, vel ramosè lateribus emittente, floribus in spicas congestis,

Crassiores & habitiores, seminibus densius stipatis, tetragonis: *Pimpinella*.

Tenuiores & productiores, flosculis rarius dispositis seminibus echinatis, floribus Hexaphyllis flavis: *Agrimonia*.

I. De *Valeriana*.

**N**otæ sunt, Folia in caule bina adversa, flores monopetali velut in umbella, semina ad singulos flores singula. R. Synops. p. 60.

1. Phu majus, sive *Valeriana* major Offic. Park. *Valeriana hortensis* Ger. *Hortensis*, Phu Olufatri folio *Dioscoridis* C. B. Major odorata radice J. B. *Baldrian* / *Theriack's Kraut*. Junio floret. Usu. Radix & folia. Radix oblonga, rugosa, digitum crassa, subtus fibrosa, foris ex-

cine-

ereo fusca, intus pallida, sapore & odore aromatico ad Nardum accedente. *Vires.* Antipharmaca, Sudorifica, ac Diuretica est. Usus præcip. in imbecillitate visus, Peste, Catarrhate, Tussi, Pleuritide, obstructione Hepaticis, Lienis, Ureterum, Hernia, Ictero, &c. *Prod.* Vulneraria est.

2. Phu minus, & Valeriana minor *Offic.* Valeriana minor *Ger. R. H. p. 388.* Sylvestris minor *Park.* Palustris minor *C. B.* Minor pratensis vel pratensis *J. B.* Wild Baldrian. In pratis humidis. Majo floret. *Usu.* Radix & folia. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Nardus Celtica *Offic. J. B. Ger. R. H. p. 391.* Celtica *Dioscoridis C. B.* Sive Spica Celtica *Park.* Magdalenen-Blumen. *Usu.* Radix cum foliis. Radices fibrosæ sunt, capillares, nigrescentes, cum foliis parvis ex viridi flavescens, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoriferantis graviusculi. *Vires.* Ut genere & specie externa cum Valeriana, ita & viribus convenire videtur. *R. H. p. 391.*

## II. De Limonio.

Congeneribus distinguitur loco natali, & caulibus nudis ramosis. *R. Synops. p. 62.*

Limonium & Behen rubrum *Offic.* Majus algatius *Park.* Maritimum majus *C. B.* Maritimum, multis aliis Behen rubrum *J. B.* Limonium *Ger.* Kohter Behen oder Wiederstoss. In maritimis. Junio floret. *Usu.* Radix & folia. *Vires.* Astringit, proinde Diarrhoeæ, Dysenteriae,



riæ, Hæmorrhagiæ & nimio Mensium fluxu medetur. *R. H. p. 395.* In Officinis Pharmacopolarum radices duæ nomine Behen albi & rubri ostenduntur, sed quid sint non ausim determinare: inter Authores enim controversatur. *C. Bauhinus* utrumque Serratulæ affinis capitulo squamoso luteo, ut & flore, titulum comprehendit. Behen autem Arabibus, ut *Syrapihioni*, sunt radices Pastinacæ radicibus similes; scribit *Haly Abbas* Behen & Pastinacæ sylvestris radices nullum inter se discrimen habere; hinc *Joannes Costa* super *M suam* pro Behen albo & rubro Carrotæ albæ & rubræ radices substituit, ut nos monuit eximius ille Botanicus *Leonard Pluckenet*, M. D. Nec Veteribus tantum, sed etiam Modernis quid sint hæ radices, inter se minimè convenit, alii enim Behen rubrum Limonii maritimi, alii Valerianæ rubræ, alii Bistortæ, alii Torméntillæ, alii Caryophyllatæ Speciem esse autumant. Nos verò cum Neotericis Radicem Limonii, vel ipsum Behen rubrum esse, vel pro Succedaneæ ejus haud temerè usurpari posse opinamur. Quod ad Behen album attinet, ejus tractationem ad caput de Lychnide rejicimus.

### III. De Fumaria.

*Note* sunt, folia Umbellatarum in modum divisa, flores spicati ad papilionaceos accedentes, in calce quodam retrorsum producti, pediculo è mediâ parte egresso hærentes. *R. Synop. p. 62.*

Fumaria Offic. purpurea Germ. Vulgaris Park

*Park. J. B. Officinarum & Dioscoridis C. B.*  
*Herba Melancholifuga Cat. Altd. Erd. Rauch.*  
*in satis & aggeribus. Majo floret. Usu. Plan-*  
*ta integra. Vires. Splenetica est ac Hepatica:*  
*attenuat, serofos, biliosos, ac adustos humores*  
*consimiliter expurgat, Viscera reserat, reserata ro-*  
*borat, Sanguinem purificat. Hinc usus præcip.*  
*in Scorbuto, aliisque morbis Mesenterii &*  
*lienis, in Ictero, in Scabie omnis generis, &*  
*sim. Schrod.*

#### *IV. De Pimpinella.*

*Folia pinnata, flores spicati, semina quadrata,*  
*quibus insident flores tetrapetali, staminosi. R.*  
*Synop. p. 62.*

*Pimpinella & Sanguisorba Offic. Horten-*  
*sis Ger. Vulgaris sive minor Park. sive Sangui-*  
*isorba minor hirsuta & lævis C. B. Sanguisorba*  
*minor J. B. Bibenellen. In montosis pascuis.*  
*Junio floret. Usu. Folia. Vires. Alexiphar-*  
*maca, Vulneraria ac Pulmonica est. Usus*  
*præcip. in Catarrhis, affectibus Pulmonum,*  
*Phthisi ex erosione, in Morbis malignis, in pro-*  
*fluviis alvi, Hæmorrhoidum: præcavet Abor-*  
*tum, corroborat. Extrinsecus in Hæmorrhæ-*  
*gia quæcunque utiliter adhibetur. Schrod.*

#### *V. De Agrimonia.*

*Notæ sunt Folia pinnata, flores hexapetali, fru-*  
*ctui lappaceo insidentes, cui bini intus nuclei. R.*  
*Synop. p. 61.*

*Agrimonia, & Eupatorium Græcorum*  
*Offic. Vulgaris Park. seu Eupatorium J. B.*  
*Eupa-*

Eupatorium Veterum sive Agrimonia C. B. Agrimonia Ger. Odermennig. In agrorum marginibus. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Hepatica nobilissima imprimis est, Vulnerariaque & Splenetica: ideoque usu creberrimo venit in Morbis ab Hepatis imbecillitate ortis, uti sunt Hydrops, Cachexia, Icterus. In usu etiam est in Catarrhis, Tussi, Mensibusque retentis. Extrinsecus abhibetur sæpissimè in balneis & lotionibus. *Schrod.*

---

## SECTIO NONA.

### De Herbis Umbelliferis.

**U**mbelliferae dicuntur hoc genus plantæ, quia earum pleraque flores gestant in Umbellâ; Hujus quidem generis species omnes flores in caulis & ramorum fastigiis coacervatos gestant, non tamen semper in Umbellæ formam dispositos. Notæ ergo Umbellatarum certiores & characteristica, quæ omnibus in universam & solis conveniunt, sunt Flores pentapetali & ad singulos bina semina nuda simul juncta. R. H. p. 406.



Herbæ Umbelliferæ sunt vel folio

Composito, pinnato aut triangulato; semine, vel  
Lato plano & compresso seu foliaceo; foliis

Latissimis; flore

Albo, petalis cordatis, radice lignosiore;  
*Sphondylium.*

Pallide luteo, foliis

Minus ramosis & propemodum pinnatis,  
semine minore, radice carnosa, esculenta;  
*Elaphobosum.*

Ramosioribus, radice minus carnosa, succi-  
fera; *Panax.*

In lacinias angustas divisis, succo limpido; *Seseli  
creticum.*

In tenues lacinias divisis; semine

Minore, foliis fœniculaceis

In segmenta longiora & capillacea divisis ra-  
dice annua; *Anethum.*

In segmenta paulò latiora tripartito divisis  
& subdivisis, radice perenni; *Peucedanum.*

Magno oblongo;

In medio tumidiore, alâ foliaceâ sinuosâ in  
summo bifidâ cincto, colore albente, sapore  
acri; *Thapsia.*

Compressiore, per maturitatem nigro, caulis  
medullâ fungosâ, igni concipiendo ido-  
neâ; *Ferula.*

Tumidiore & teretiusculo aut rotundo,

Longo, quibusdam rostrato dicto,

Glabro, minor annua odorata; *Cheraphilum.*

Striato, foliis

Latioribus majore, semine maximo, odora-  
ta, radice perenni, foliis Filicis æmulis;  
*Myrrhis.*

In tenues lacinias dissectis; foliorum segmentis

Crebrioribus, capillaceis, radice perenni;  
*Meum.*

Paucioribus majoribus radice annua, se-  
mine odorato, incurvo; *Cuminum.*

Breviore.

Striato

Glabro

Majore

Per maturitatem nigro, tumido & fere  
rotundo, foliis latis; *Smyrniūm*.

Per maturitatem albente aut minus co-  
lorato; foliis

Latissimis

Ramosioribus odoratis; *Angelica*.

Tripartito divisis & subdivisis, radi-  
ce perpetua, acris; *Imperatoria*.

Minus latis

*Apii*, magna & elata, radice perpe-  
tua, odore valido nec ingrato  
*Levisticum*.

*Seselios*; summis segmentis tripar-  
titis; *Seseli*.

Minore, radicibus

Tuberosis multiplicibus, foliis odore &  
sapore *Elaphobosci*; *Sisarum*.

Cauliformibus strigosioribus & lignosio-  
ribus, foliis

Pinnatis aut minus ramosis

Formā, odore & sapore *Elaphobo-  
sci*; *Sison*.

Foliis Sanguisorbæ radice fervida;  
*Pimpinella Saxifraga*.

Foliis profundè laciniatis, radice  
dulci, semine aromatico; *Caryum*.

Ramosioribus seu triangulatis

Latioribus

In pauciora & obtusiora segmenta  
divisis; *Apium*.

In plura & acutiora; *Cicuta*.

Angustioribus, in segmenta seu folia  
simplicia divis

Breviora, acuta, umbellā sublutea  
semine per maturitatem

Rufescenti; *Selinum*.

Albescenti; *Critibum*.

Longa

- b c de Longa, angusta, permargines fer-  
 { rata semine aromatico; *Ammi.*  
 In segmenta tenuissima capillacea  
 divis  
 { Oblonga; *Fœniculum.*  
 { Breviora, radice  
 { Esculenta; *Staphylins.*  
 { Fervida; *Pyrethrum.*  
 { Imis latis, tummis tenuibus, semine  
 { dulci aromatico; *Anisum.*  
 { Hirsuto; *Daucus.*  
 { Sphæricæ rotunditatis; *Cimicum* tetro odo-  
 re; *Coriandrum.*  
 Integro aut laciniato  
 { Subrotundo & à caule perforato; *Persoliata.*  
 { In quinque lacinias diviso, semine hispido & lap-  
 pulaceo; *Sanicula.*

*De Umbelliferis semine lato & compres-  
 so seu foliaceo, aut etiam alâ foliaceâ  
 cincto.*

# *I. De Sphondyllo.*

*Nota sunt, folia latissima, flores albi, petalis cordatis.*  
*R. Synops. p. 63.*  
*Pastinaca sylvestris Offic. Sphondylium*  
*er. Vulgare Park. Vulgare hirsutum C. B.*  
*uibusdam, sive Branca Ursina Germanica.*  
*B. Bärenflau. In pascuis & agrorum mar-*  
*nibus. Julio floret. Usu. Semen. Vires. Se-*  
*en egregium est in Hysterico paroxysmo.*  
*W. illis de Morbis Convuls.*



## II. De Elaphobosco.

**N**Otae sunt, radices carnosae, esculentae, folia vix tri-  
angulata, flores lutei. R. Synop. p. 26.

Pastinaca hortensis Offic. latifolia sativ.  
Ger. Park. C. B. Sativa latifolia Germanica luteo  
flore J. B. Mören / weisse Mören / zahni Mören  
In hortis colitur. Junio floret. Uss. Radix in co-  
linis. Semen in Officinis. Vires. Semen Do-  
næus calidius & siccus esse, urinam movere  
& flatum discutere asserit. R. H. p. 410.

## III. De Panace.

**N**Otae sunt folia lata Pastinacæ, verum magis co-  
posita seu ramosa, flores lutei, radix gummosa  
seu succifera. R. H. p. 410.

Panax Herculeum majus Ger. Pastinacæ fo-  
C. B. Heracleum alterum, sive peregrinum  
donæi Park. Sphondylion vel potius Pastinaca  
Germanicæ affinis Panax vel Pseudo-cotula  
flore luteo J. B. Heyden Synop. In hortis cul-  
torum. Junio floret. Ex hujus vulnerato, pro-  
fertim circa radicem, caule, succus æstivis me-  
sibus manat, sponte concrescens, in Officinis  
Opopanax dict. cujus signa bonitatis sunt co-  
extus flavus, intus albus aut subflavus; sa-  
pidus valde amarus, odor gravis, consistentia  
gelatinosa, facile in aqua solubilis, levis, tenera,  
bilis, Galbani instar lactescens, dum resolvitur  
ad lacteum liquorem propius accedens. Vires.  
Emollit, digerit, flatum discutit, purgat prius  
tam crassam & lentam, è partibus remotis  
rebrebro, nervis sensoriis, juncturis, thorace  
Schrod.

#### IV. De Sefeli Cretico vel Tordyllo.

Foliis latis Pastinacæ, semine fimbriâ granulatâ aut crispâ cincto à reliquis differt. R. H. p. 412.

Sefeli Creticum Offic. Creticum minus B. Ger. Tordylium sive Sefeli Creticum minus Park. Caucalis minor pulchro semine, sive Bellonii J. B. Weiß Hirsch-Wurk. In hortis botanicis. In Usu est Semen sed rarius Vires Narcoticum est, Uterinum ac Pulmonicum. Usus præcip. in Stranguria, & Urina remorata, dolores discutit, Menses ciet, Catarrhorum expectorationem promovet Schrod. In Catalogo simplicium Pharmacopœiæ Londini hoc cum sequente, nescio quomodo confunditur.

#### V. De Petroselino Montano.

Foliis apii, semine foliaceo à reliquis differt.

Oreoselinum Offic. Ger. Mor. Umb. Petroselinum montanum vulgatius. Park. Montanum folio ampliore C. B. Montanum Dalechampi J. B. Berg Petersilien. In locis montanis. Usu. Radix & semen. Vires. Calefacit & siccant, alexipharmacum est, sudoriferum, diureticum, discutiens. Usus præcipuus in calculo renum & vesicæ, in Peste, in flatibus, in stranguria. Schrod.

#### VI. De Sefeli Massiliensi.

Semine foliaceo, foliis tenuiter divisis, succo lim-pido seu aqueo, à reliquis distinguitur. R. H. p. 414.

Sefeli Massiliense Offic. Massiliense Ger. Massiliense

Massiliense Ferulæ folio C. B. Massiliense alterum Park. Massiliense nuperorum, folio aliquatenus simili Visnagæ J. B. Geselsaamen / Berge Kummel. *Ufu.* Semen. *Vires.* Ufus præcip. in morbis capitis, Epilepsia, in imbecillitate visus, Spasmo, &c. in Pulmonum ac pectoris affectibus, Tussi, Catarrhis; in Epatis obstructione, Hydrope. Ventriculi cruditate, in Calculo Renum ac Vesicæ, in Mensibus obstructis. Specifica Antidotus est Cicutæ, Schrod.

## VII. De Anetho.

*S*emine foliaceo, foliis in tenuissima segmenta Fœniculi æmula divisis, à reliquis differt. R. H. P. 415.

Anethum Offic. Ger. J. B. Hortense C. B. Hortense sive vulgare Park. Dillen. In hortis. Julio floret. *Ufu.* Folia, Semen. *Vires.* Herba, sed præcipuè Semen, digerit & discutit, maturat tumores, auget lac, conciliat somnum: Venereos appetitus minuit, singultui vomituique medetur Schrod.

## VIII. De Peucedano.

*N*otæ sunt, folia in tenues lacinias tripartito divisa & subdivisa, latiores & longiores quam Anethi R. Synop. p 64.

Peucedanum Offic. Ger. Vulgare Park. Germanicum C. B. Minus Germanicum J. B. Saarstrang. In Fossis palustribus. Julio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Expectorat, mucilaginem tartaream bilemque educit. Ufus præcip. in affectibus pectoris, Tussi, Inflationibus, in ob-

structione.



structione Hepatis, Lienis, Renum, Ciet urina-  
nam & calculosis prodesse creditur. *Schrod.*  
Veteres affectibus omnibus circa nervos con-  
sistentibus, ut Lethargo, Phrenesi, Epilepsiæ,  
vertigini, Paralyfi, convenire aiunt. *R. H.*  
p. 416.

## IX. De Thapsia.

*Nota sunt folia tenuiter dissecta: Semen alâ folia-  
ceâ summâ parte bifida cinctum, sapore acri.*  
*R. H.* p. 417.

Thapsia *Offic.* vulgaris *Ger.* Carrotæ folio  
*C. B. Park.* Sive Turbith Garganicum semine  
latissimo *J. B.* In hortis curiosorum aliquando  
colitur, *Ussu.* Radix. *Vires.* Radix ejusque suc-  
cus aut decoctum supernè inferneque cum  
violentia purgat, ideoque intra corpus exhi-  
beri non debet. Quidam pro Turbith per er-  
rorem substituunt. *R. H.* p. 418.

## X. De Ferula.

*Foliis Fœniculaceis, seminibus oblongis, per maturi-  
tatem nigricantibus, medulla fungosa, ab aliis distin-  
guitur.* *R. H.* p. 420.

Ferula folio glauco, semine lato oblongo,  
quibusdam Thapsia ferulacea *J. B.* Latiore fo-  
lio *Park.* Ferulago *Ger.* Latiore folio *C. B.* In  
hortis Botanicorum aliquando colitur, Ex hu-  
jus planta exsudat Galbanum *Offic.* à Byzantio  
ad nos delatum. Succus est pinguis, non ta-  
men Oleo solubilis, sed aquâ, mediâ quodam-  
modo naturâ constans inter gummi & resinam,  
accenditur enim igne ut Resina, humore

aqueo solvitur ut Gummi; colore flavescente aut ruffo, substantia molli & Cerae instar ductili, sapore amaricante cum acrimonia, odore gravi. *Vires*, Emollit & digerit; *Usus* intrinsecus est in mensibus ciendis, foetibus vivis & mortuis, nee non secundinis pellendis. Extrinsicus etiam prodest in partu ac mensibus, in suffocatione uteri, Vertigine, Epilepticis, Hystericis, Syncopiticis, &c. *R. H. p. 421.*

*De aliis succis concretis qui ex Plantis Ferulaceis exsudare censentur.*

1. **A**mmoniacum *Offic.* ab India Orientali & aliunde ad nos deferitur. G. Gummi *Armoniac.* Gummi est stillans ex *Ferula* quadam, inquit *Schrod.* Eligendum est sincerum instar *Olibani*, in grumos condensatum, odore gravi, Castoreum utcumque æmulans, sapore amarum, digitis tractatum mollescens, bene coloratum, exterius flavum, interius candidum. *Vires*, Emollit, attenuat, resolvit, digerit, maturat, attrahit validè, ut quoque spinas carni infixas eliciat, alvum movet, Splenicum est. *Usus* præcip. est in doloribus Arthriticis, in resolvenda mucilagine tartarea, viscosa, crassa ac contumaci Pulmonum, Mesenterii, & hinc in obstructionibus contumacibus Lienis, Hepatis Uteri. &c. Extrinsicus in scirrhis Tophisque juncturarum, in Scrophulis, aliisque tumoribus durioribus resolvendis, &c. *Schrod.*

2. Sagapenum Offic. G. Serapim Gummi. Ab Alexandria transportatur. Est lachryma seu gummi arboris cujusdam ferulaceæ. Optimum censetur sincerum, translucidum, foris colore fulvo vel ruffo, intus exalbido, gustu acri, odore gravi, porrumque æmulans. *Vires.* Attenuat, aperit, purgat lentos & crassos, imò & serosos humores, ex Ventriculo, Intestinis, Utero, Renibus, Cerebro, Nervis, Juncturis, Pectore: Hinc prodest in Hydrope, Tussi inveterata, Asthmate, Cephalalgia, Spasmo, Epilepsia, Paralyfi, Tremore artuum, in obstructione & tumore splenis, dolore Colico. Menses ciet, sed foetum enecat, Urinam movet. *Schrod.*

3. Assa Foetida vix hujus loci est, licet Auctores multi contendant eam esse lachrymam concretam Laseris sive Sylphii, vel Ferulæ. G. Zeussels Drect. V. Bod. à Stapel in Theophrast, & itinerar. Olearii & Mandeslo. Bontius vult plantam Assæ foetidæ productricem esse duorum generum in Persiâ; primam Sarmen- tosam ferè, ut Salix aquatica; Alteram Ti- thymali faciem habere: ergò Assam foetidam alibi disposuimus.



*De Umbelliferis semine tumidiore & minus compresso donatis.*

### *XI. De Cherefolio.*

**F**oliis ad Petroselinum accedentibus, radice annua, omniumque partium parvitate à Cicutaria differt. R. H. p. 430.

Chærefolium Offic. Chærophyllyum sativum C. B. Chærephyllon J. B. Ceretolium sativum Park. Vulgare sativum Ger. Körffel Kraut. In hortis. Maio floret. *Usu.* Folia, & Semen. *Vires.* Partium est tenuium, diureticum, emmenagogon, ac lithontripticum, Sanguinem coagulatum resolvit, somnum suaviter inducit, Extrinsecus usus insignis est in dolore colico, in Urina retenta Schrod.

### *XII. De Myrrhide.*

**S**emine striato oblongo magno, per maturitatem nigro, folio Filici æmulo, aromatico, à reliquis differt. R. Method. p. 88.

Myrrhis Offic. magno semine, longo sulcato J. B. Major vel Cicutaria odorata C. B. Major vulgaris, sive Cerefolium majus Park. Cerefolium magnum sive Myrrhis Ger. Welscher Körbel. In hortis colitur. Junio floret. *Usu.* Folia, *Vires.* Cum Cerefolio temperamento & viribus convenit. R. H. p. 431.

### *XIII. De*

## XIII. De Meo.

**F**oliis constat omnium herbarum tenuissimis, quibus ut  
 & semine magno oblongo striato ab aliis distingui-  
 tur. R. Synop. p. 64.

Meum & Meum Athamanticum Offic. Me-  
 am Ger. Vulgatus Park. Foliis Anethi C. B.  
 Vulgare, seu Radix ursina J. B. Beer: Wurzel.  
 In pratis & pascuis sed raro. Junio floret. *Ufu.*  
 Radix oblonga, crassa, & ramosa, cortice foris  
 ferrugineo, intus pallido aliquantulum gum-  
 moso, includente medullam albicantem, sa-  
 pore & odore Levistico gratiori & fragrantiori  
*Vires.* Flatus discutit. *Ufus præcip.* in Inflatio-  
 ne ac ruetu Ventriculi, in Mensibus ac Urina  
 ciendis, in Uteri suffocatione, in torminibus  
 Ventris, in Catarrhis tartaróque Pulmonum  
 expectorando, Multas ingreditur compositio-  
 nes & ipsam Theriacam, Schrod.

## XIV. De Cymino.

**A**B Ammi differt radice annua, foliis in lacinias mi-  
 nüs crebras, nec adeò tenues dissectis, omnium  
 partium quantitate minore, semine etiam angustiore.  
 R. H. p. 433.

Cuminum Offic. vulgare Park. Semine lon-  
 giore C. B. Sativum Dioscoridis Ger. Sive  
 Cuminum sativum J. B. Römisch: oder Pfeffer  
 Röm. In Insula Melita copiosè seritur. Junio  
 floret. *Ufu.* Semina striata, oblonga, ex ci-  
 nereo spadicea, sapore acri, aromatico & in-  
 grato, odore fragranti. *Vires.* Attenuat, di-  
 gerit,

gerit, resolvit, Flatus discutit, idèoque utile est in Colica, Tympanitide & Vertigine. Schrod.

## XV. De Angelica.

**E**jus notæ sunt folia latissima, semina striata, magna & crassa, per maturitatem alba, succus lacteus per siccitatem flavicans. R. H. p. 434.

Angelica Offic. sativa C. B. J. B. Ger. Park. Angelick oder H. Geist Wurk. In hortis colitur. Junio floret. *Usu.* Radix, Folia & Semen. Radix est oblonga ex capite crassiore in fibras sæpe pollicares aut longè tenuiores divisa, foris ex flavo rufescens, medulla interiore alba, saporis acris, suaviter amaricantis, odoris fragrantis & aromatici. *Vires.* Bezoardica & Cordialis nobilissima est, calefacit & siccant, aperit, attenuat; Sudorifica, & Vulneraria est: menses movet, foetum expellit, suffocationi Uteri maximè conducit: Malignis morbis, Venenis, ipsique Pestis medetur. Schrod.

## XVI. De Imperatoria.

**N**otæ ejus sunt folia lata, tripartitò divisa & subdivisa: radices crassæ, obliquæ, semen striatum majus. R. H. p. 436.

Imperatoria & Ostrutium Offic. Imperatoria J. B. Ger. Major C. B. Sive Ostrutium vulgare Park. Meister Wurk. In hortis colitur. Floret Augusto. *Usu.* Radix oblonga, pollicem crassa, rugosa quasi cirrosa & geniculata, foris fulca, intus alba, saporis acris, aromatici, odoris fragrantissimi. *Vires.* Alexipharmaca, ac Sudori-



dorifica est. Usus præcip. in Venenatis morbis, ac Ictibus, in capitis affectibus phlegmaticis, Paralyfi, Apoplexia, &c. in cruditate Ventriculi, & Colico dolore. *Schrod.* In Colicis & flatuosis est divinum remedium. *Hoffman.*

### *XVII. De Smyrniõ.*

*S*emine majore tumido, per maturitatem nigro, foliis à congeneribus distinguitur. *R. H. p. 436.*

Hipposelinum & Smyrniium *Offic.* Hipposelinum *Ger. emac.* Sive Smyrniium vulgare *Park.* Hippof. Theophrasti, vel Smyrniium *Dioscoridis* C. B. Macerone, quibusdam Smyrniium, semine magno nigro *J. B. Brust-Wurk / Engel-Wurk.* In rupibus maritimis. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires* Alit bene, & præstat eadem quæ Apium, sed efficacius. *R. H. p. 437.*

### *XVIII. De Levistico.*

*E*jus notæ sunt, folia Apii majora, odor validus, magnitudo & statura insignis. *R. H. p. 437.*

Levisticum *Offic.* vulgare *Ger. Park.* Ligusticum vulgare C. B. Vulgare foliis Apii *J. B. Siebstöckel.* In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Radix, Folia, Semen. Radix est oblonga, crassa, in fibras crassiores divisa, toris fusca, intus pallida, saporis acris & aromatici, odoris jucundi & fragrantis. Semina oblonga, compressa, striata, saporis acris, aromatici, subdulcis, odoris fragrantis. *Vires.* In Facultatibus porrò tam vicinum est Angelicæ & Imperatoriæ suprâ dictis, ut non putem necessariam esse commemorationem, *Hoffm.*

### *XIX. De*

## XIX. De Sefeli vulgari.

**S**eminibus magnis oblongis striatis, fimbria foliacea à reliquis differt.

Sefeli vulgaris & Siler montanum Offic. sive Siler montanum vulgare J. B. Siler montanum Officinarum Ger. Montanum vulgo Sefelios Park. Ligusticum quod Sefeli Officinarum C. B. Mos-Rümmel / Silermontan. In Hortis Botanicis colitur. Junio floret. *Ufu*, Semina oblonga, striata, ex viridi spadicea, donata per marginem fimbriâ exigua foliosâ, saporis acris, amaricantis & aromatici, quasi ex corticibus Aurantiorum & Cumino mixti, odoris fragrantis. *Vires*, Semen Sileris majoris acredinis est, quam ullum aliud Sefeli, eoque menstruis ciendis perquam commendatum. *Bod.* Calefacit & siccatur, Menses & Urinas ciet, flatu discutit. *Schrod.*

## XX. De Sisaro &amp; Amomo.

**F**oliis Pastinacis, seminibus oblongis, angustis, striatis à reliquis distinguitur.

1. Siler Offic. vulgare Park. Sisarum Ger. Germanicum C. B. Multis J. B. Origel, Mören. In hortis colitur. Julio floret. *Ufu*. Radix. Est usus potius culinaris quam Officinalis. *Vires*. Saporis subamari subastring. ventriculo convenit, appetitum excitat, diuretica ac lithontriptica est, bene nutrit, facile concoquitur, specifica antidotus censetur Mercurii vivi *Schrod.*

2. *Amomum Offic.* Sison vulgare, sive *Amomum Germanicum Park.* Sive *Officinatum Amomum J. B.* Quod *Amomum Officinis nostris C. B.* *Petroselinum Macedonicum Fuchsi Ger. Cessery.* Locis humidis & luto-  
sis nascitur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Semina perpusilla, fusca, striata, gustu acriusculo aromatico. *Vires.* Diuretica & lithontriptica est. In *Officinis Pharmacopolarum nostrorum Semen Plantæ superscriptæ* non sine errore pro *Amomo* vero venditur. *Amomum veterum* vexatissimum apud *Botanicos scriptores* Vegetabile est, aliis aliud quid esse contendentibus: quodnam sit in capite de *Cardamomo* ostendemus, hujus enim loci non est.

## XXI. De *Pimpinella Saxifraga.*

*Nota sunt Semen striatum minus, folia Pimpinelle pinnata, radix fervida. R. Syn. p. 67.*

*Pimpinella Saxifraga Offic. Ger. Saxifraga hircina major Park. Saxifraga major umbella candida C. B. Saxifraga hircina major J. B. Kohter Steinbruch.* In Sylvis. Junio floret. *Ufu.* Radix, Herba, Semen. *Vires.* Herba *Pimpinellæ, radix & semen Petroselini facultatibus* pollent, sed in expellendo ac sedando dolore efficaciores multo. *R. Hist. p. 446.*

## XXII. De *Caro.*

*Foliis pinnatis, pinnis in multas laciniæ dissectis, Seminibus oblongis, striatis, radice dulci esculenta. ab aliis Umbelliferis distinguitur. R. Hist. p. 446.*

Ca.



*Carum Offic. sive Careum Ger. Vulgarè Park. Caros J. B. Cuminum pratense Carui Officinarum C. B. Carbe oder Feld-Rümmel. In pratis & pascuis. Junio floret. Ufu. Semina parva, striata, oblonga, tenuia, paulum incurva, fusca, saporis acris, aromatici, odoris fragrantis. Vires. Stomachicum est ac diureticum, siquidem flatus discutit, concoctionem promovet, urinam ciet, cerebrum corroborat, lactis abundantiam præbet. R. Hist.*

### XXIII. De Apio.

*Semine striato minore, foliis latioribus, odore gravi à reliquis differt.*

I. Apium & Eleoselinum Offic. Officinarum seu Paludapium Park. Palustre ingratius J. B. Palustre seu Eleoselinum Veteribus ejusdem, palustre sive Officinarum C. B. Eleoselinum, Paludapium Ger. Eppich oder Merck. In paludosis rivulis & fossis majoribus. Junio floret. Ufu. Radix, Herba, Semen; Radix inter quinque radices aperientes recensetur: Semen annumeratur seminibus calidis minoribus. Radix pollicem crassa, est albicans, à crassiori capite intenuēs, numerosas fibras divaricata, saporis subacris, odoris fragrantis. Semina parva, striata, saporis & odoris Radicum. Vires. Radix Urinam & Menses movet, calculum pellit, Regium morbum solvit. Semen efficacius

facius est quam radix, & ad eadem ad quæ sativi Apii semen commendatur. *R. Hist. p. 447.*

2. Petroselinum vulgare *Offic. Park.* Apium hortense *Ger.* Hortense, sive Petroselinum vulgò *C. B.* Hortense multis, quod vulgò Petroselinum, Palato gratum *J. B. Petersilien.* In hortis. Junio floret. *Ufu.* Radix, Herba, Semen: Radix inter quinque radices aperientes recensetur: estque oblonga, crassa, albida, saporis subacris & aromatici, odoris fragrantis. *Semina* parva sunt, oblonga, striata, atroviridia. saporis acris. *Vires.* Attenuat, aperit, extergit, diuretica est. *Ufus præcip.* in Obstructione Pulmonum, Epatis, Lienis, Renum, ac Vesicæ, &c. *Schrod.*

## XXIV. De Aniso.

**F**olia ima à summis plurimum differunt: Semen odore & sapore est gratissimo; parva & annua est herba. *R. H. p. 449.*

Anisum *Ger. Park. J. B. Herbariis C. B. Anieß.* In Malta copiosè seritur. Junio floret. *Ufu.* *Semina*, quæ oblonga sunt, rotunda, inobtusum acumen desinentia, parva, striata, colore ex viridi fusco, saporis & odoris fragrantis. Quatuor seminibus calidis majoribus annumeratur. *Vires.* Cephalicum, Hepaticum, Pneumonicum, ac Stomachicum est. *Ufus præcip.* in inflatione Ventriculi, Tussi, &c. *Schrod.*

## XXV. De Cicutâ.

**M**agnitudine sua, caule maculato & cavo; semine striato minore tumido, foliis multifariam divisis in minutas particulas, qualitate noxia & deleteria à reliquis umbelliferis differt. R. Synop. p. 68.

Cicuta Offic. Ger. J. B. Major C. B. Major vulgaris Park. Schirling / Wüterich. In fossis & aggeribus agrorum. Julio floret. Usu. Radix, Herba, Semen. Vires. Frequens ejus usus modernis est in tumore Lienis. Schrod. V. Plura apud Wepferum in Historia Cicut. A-  
gaat.

## XXVI. De Selino.

**N**ote sunt, foliorum segmenta angusta, acuta; flores ex luteo pallidi, semina brevia, striata, rufescentia. R. Synopt. p. 69.

Seseli pratense C. B. Pratense nostras Park. Saxifragia Anglica facie Seseli pratensis Ger. Saxifragia Anglorum, foliis Fœniculi latioribus, radice nigra, flore candido similis Silao J. B. Weisser Steinbruch. In pratis & pascuis. Junio floret. Usu. Herba, Semen, in Officinis nostris substituuntur pro Saxifragia alba. Vires. Succus, Decoctum, Aqua destillata hujus plantæ, vel Semen in pulvere efficax est, in Urina cienda, calculo atterendo & expellendo, flatibus discutiendis, Colico dolore leniendo. R. Hist. p. 453.



*XXVII. De Ammi.*

*F*olius in longas & angustas lacínias dissectis, circum oras crenatis ab aliis differt. R. Hist. p. 454.

1. Ammi vulgare Offic. Ger. *Vulgatius Park.* Majus C. B. *Gemein Ammey*. Gaat. In hortis colitur. Junio & Julio floret. *Usu.* Semina sunt parva, striata, Petroselino minora, ex cinereo spadicea, saporis amaricantis, acris, odoris fragrantis. In Officinis nostris pro Ammi vero substituuntur; unum est è quatuor seminibus calidis minoribus.

2. Ammi verum Offic. Creticum Ger. *Park.* Alterum semine Apii C. B. Odore Origani J. B. *Cretisch Ammey*. Gaat. Ex Alexandria Ægypti adfertur. *Usu.* Semina parva, striata, Petroselino minora, è ruffo spadicea, saporis acris, aromatici, odoris fragrantis, ad Origani accedentis; in Officinis nostris raro aut nunquam inveniuntur. *Vires.* Incidit, aperit, exsiccant; valet in dolore Colico & Uterino, in Mensibus & Urina obstructis, in Inflatione Ventriculi, &c. Schrod.

*XXVIII. De Crithmo.*

*N*otæ sunt, foliis esse quodammodo Fœniculaceis, verum segmentis brevioribus & laticioribus multo. R. Hist. p. 456.

Crithmum, Fœniculum marinum, Herba S. Petri Offic. marinum Ger. *Marinum vulgare Park.* Sive Fœniculum maritimum minus C. B. Multis, sive Fœniculum marinum

J. B. Meer, Fenchel. In clivis & rupibus maritimis. Julio floret. *Ufu.* Herba, Semen. *Vires.* Urinam provocat, viscera ab obstructionibus expedit, appetentiam ciborum excitat. R. *Hist.* p. 457.

## XXXIX. De Fœniculo.

**N**otæ sunt, Folia obscure viridia, in longa & capillacea segmenta divisa, semina striata oblonga. R. *Synops.* p. 69.

1. Fœniculum commune, & vulgare *Offic.* Vulgare Ger. Park. Vulgare Germanicum C. B. Vulgare minus, acriore & nigriore semine J. B. Fenchel. In hortis. Julio floret. *Ufu.* Radix, Herba, Semen. Radix oblonga, crassa, pallida, saporis subdulcis & acris, aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Folia diuretica, carminativa ac bechica sunt, ventriculum roborant, lac augent, visum confortant, asperam arteriam leniunt. Radix, quæ una ex quinque radicibus aperientibus est, & Semen, quod, annumeratur quatuor seminibus calidis majoribus, insuper usûs est creberrimi in humorum ac flatuum discussione. Aq. ex semine Ophthalmica est. *Schrod.*

2. Fœniculum dulce *Offic.* Ger. Park. C. B. Dulce majori & albo semine J. B. Süßer Fenchel. Ex Germania adfertur. *Ufu.* Semina oblonga, striata, albida, saporis dulcis, acris & suavis, odoris fragrantis. *Vires.* Cum præcedente convenit.

## XXX. De Dauco.

**S**emine villoso, foliis tenuiter incisís ab aliis Umbelliferis differt.

1. *Daucus vulgaris* seu nostrâs *Offic.* *Pastinaca sylvestris tenuifolia* *Ger. Park.* *Sylvestris tenuifolia* *Dioscoridis* vel *Daucus Officinarum* *C. B.* *Sylvestris* sive *Staphylinus* *Græcorum* *J. B.* *Wilder Vogelnest.* In pascuis & agris. Junio floret. *Ussu.* Semen. *Vires.* Uterina imprimis est & diuretica. *Ussus* præcipuus est in Tussi, Pleuritide, Stranguria, Calculo; ciet Menses & Molas, sedat Uteri suffocationes, stimulat Venerem. Seminis  $\text{zij}$ . infusæ in Vino albo & potæ Hystericis paroxysmis medentur. *R. Hist.* p. 465.

2. *Daucus Offic.* *Pastinaca sativa tenuifolia* *Ger.* *Tenuifolia sativa lutea* *Park.* *Tenuifolia sativa radice lutea vel alba* *C. B.* *Sativa* sive *Carota rubra, lutea & alba* *J. B.* *Rothel gelbe und weisse Mören.* In hortis & agris seritur. Julio floret. *Ussu.* Radix. *Culinaria* est.

3. *Daucus Creticus Offic.* *Ger.* *Creticus verus* *Dioscoridis* *Park.* *Foliis Fœniculi tenuissimis* *C. B.* *Creticus semine hirsuto* *J. B.* *Cretischer Vogelnest-Saamen.* Ex Insula Creta adfertur. *Ussu.* Semina oblonga, incana, acuminata, villosa, saporis & odoris fragrantis, *Vires.* Uterinum imprimis est & Diureticum. Flatus discutit. *Ussus* præcip. in Mensibus obstructis, Suffocatione & dolore Matricis, in Colica



flatulenta, in Singultu, Pyuria, Tussi chronica, &c. Schrod.

**Petroselinum Macedonicum** Offic. **Macedon** cum verum Ger. Macedonicum quibusdam Park. Apium Macedonicum C. B. Sive Petroselinum Macedonicum multis J. B. *Macedonische Petersilien oder Celleri.* Colitur in hortis curiosorum. Julio floret. *Ufu.* Semina parva, striata, villosa, atroviridia, saporis acris, aromatici, odoris fragrantis *Vires.* Usus præcip. in Urina ac Mensibus ciendis. Adhibetur & Morbis veneficio introductis. Schrod.

### XXXI. De Coriandro.

*Semina striatorum figura perfectè Sphericâ ab aliis distinguitur.* R. Hist. p. 470.

**Coriandrum** Offic. J. B. Ger. Majus C. B. **Vulgare** Park. Coriander. In arvis seritur. Junio floret. *Ufu.* Semen *Vires.* Stomachicum imprimis est, claudit Ventriculum, exhalationesque supprimit, quò minus caput gravent, ructusque producant: insuper & Strumas discutere creditur. R. Hist.

### XXXII. De Perfoliata.

*Folia integris, subrotundis à caule perforatis à reliquis differt.*

**Perfoliata** Offic. vulgaris Ger. Park. **Vulgatissima** sive arvensis C. B. Simpliciter dicta, vulgaris annua J. B. *Durchwachs.* Inter segetes. Julio floret. *Ufu.* Folia *Vires.* Vulneraria est. Usus præcip. in vulneribus recentibus, Enterocelis (imprimis Umbilici) tumidis artubus, strumis &c. prodest. Schrod.

## XXXIII. De Sanicula.

**N**Ote sunt, Semina lappulata, folia subrotunda, in quinque laciniis altius incisa. R. Synop. p. 72.

Sanicula Offic. sive Diapensia Ger. Officina-  
rum C. B. Vulgaris sive Diapensia Park. Mas  
Fuchsi, sive Diapensia J. B. Sanickel. In Sylvis  
& sepibus. Majo floret. Ufu. Folia. Vires.  
Vulneraria est è præcipuis, utilis in consoli-  
dandis ulceribus, fistulis, rupturis, erosionibus-  
que. Schröd.

## SECTIO DECIMA.

## De Herbis Stellatis.

**S**Tellate dicuntur hoc genus herbe, quia folia caules stelle radiantis in modum ambiunt. Floribus sunt monopetalis, verum in quatuor segmenta, totidem folia imitantia partitis; singulis autem flosculis bina naturaliter succedunt semina. R. H. p. 477.

Hæ vel sunt floribus

- [ Per caules magis sparsis, foliis ad singula genicula
- { Quaternis, floribus & seminibus caules ad genicula verticillatim ambientibus, flore luteo, foliis hirsutis; *Cruciata*.
- Pluribus quatuor, radice
- { Rubra, floribus ex luteo herbidis; *Rubia*.
- { Alba, vel fusca, foliis
- { Mollibus & glabris, floribus luteis, succo acido; *Gallium*.
- { Asperis & vestibus adhærentibus, floribus pallidis; *Aparine*.
- [ In summis caulibus Umbellatim dispositis; *Asterula*.

I. De

## I. De Cruciata.

*F*oliis quaternis, hirsutis, flosculis verticillatis, luteis, à reliquis differt.

Cruciata Offic. Ger. Vulgaris Park. Hirsuta C. B. Gallium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo. J. B. Creutz-Wurk / Sperensstich. Ad sepes & in dumetis. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est è præcipuis: Valet & ad Ramices in vino pota, Expectorat quoque viscidos humores, authore Cam.

## II. De Rubia seu Erythrodano.

*F*oliis pluribus quatuor, radice rubra, floribus ex luteo herbidis ab aliis differt.

Rubia Tinctorum Offic. Ger. Sativa J. B. tinctorum sativa C. B. Major sativa, sive hortensis Park. Ferber Roht. In agris & hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Radix oblonga, tenuis, succulenta, extus & intus rubicunda, saporis ex dulci amaricantis, & astringentis, odoris nullius. *Vires.* Vulneraria est, *Ufus* præcip. in obstructione Epatis, Lienis, & imprimis Uteri; proin in Ictero, Hydroke, Urina obstructa, Sanguine coagulato. A Tinctoribus adhibetur hujus Radix ad coloris rubri præparationem Schrod.

## III. De Gallio.

*F*oliis angustis, mollibus, glabris, floribus luteis, succo acido, à reliquis huius generis differt.

Gallium Offic. luteum Ger. P. B. C. Gallion verum J. B. Megerkraut / Wallstroh. In pascuis siccioribus. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba.



ba. *Vires.* Herba aut pulvis ipsius Hæmorrhagiam & sanguinis profluvia sistit; quod facit Sanguinem incrassando & coagulando; commendaturque contra Cancrum & cancroſa ulcera. Decoctum herbæ acopon cenſetur, laſſitudinibus utile, *R. H. p. 483.*

#### *IV. De Aparine.*

*F*oliis asperis & tenacibus, floribus albis, seminibus sphericis lappulatis à reliquis differt.

Aparine *Offic. Ger. Vulgaris C. B. Park. Philanthropon Dioscoridis, Lappago Plinii, lib. 26. cap. 10. J. B. Kleb. Kraut. Ad sepes. Junio floret. Uſu. Herba. Vires. Viperarum Phalangiorumque morſibus auxiliatur, aurium dolori medetur, discutit ſtrumas, Sanguinis abundantiam reſſimit, Morbum regium sanat, Aq. Deſtillata in calculo & arenulis inſigne eſt remedium D. Needham. Decoct. mirè Gonorrhœæ prodeſt ſimplici. D. Palmer.*

#### *V. De Aſperula.*

*F*lores ſummos cauliculos occupant velut in umbella  
*R. Synop. p. 74.*

Aſperula *Offic. Ger. Aut Aſperula odorata Park. Rubeola montana odorata C. B. Rubiis accedens Aſperula quibuſdam, ſive Hepatica ſtellaris J. B. Herk. Freud. Leberkraut. In ſylvis & dumetis. Majo floret. Uſu. Herba. Vires. Uſus præcip. in obſtructo Hepate & meatu biliario; & hinc in Ictero, ac in hepate calidiore refrigerando. Schröd.*

## SECTIO UNDECIMA.

*De Herbis Asperifoliis.*

**H**erbæ Asperifoliæ sunt, quibus folia in caulibus alterna, flores monopetali, marginibus quinque partitis, incisuris aliàs profundioribus aliàs levioribus, singulis autem floribus quatuor plerumque succedunt semina. R. H. p. 488.

Herbæ asperifoliæ sunt vel seminibus ad singulos flores quaternis, Perianthio

{ Oblongo integro, foliis maculis albis variis; *Pulmonaria*.

{ Breviore & ad modum floris expanso; seminibus

{ Asperis & lappaceis, foliis mollibus & graviter odoratis; *Cynoglossum*.

{ Rugosis, caput viperinum aut galeam referentibus, flore

{ In quinque lacinias totidem folia imitantes diviso, radicibus

{ Albis, florum laciniis

{ Obtusis & subrotundis, foliis longis acutis;

{ } *Buglossa*.

{ Acutis, foliis brevibus & latioribus; *Borago*.

{ } *Rubris; Anchusa*.

{ Corniculato; parte superiore longius excurren-  
te, inferiore brevior; *Echium*.

{ Lævibus splendentibus & velut politis, floribus

{ Cylindraceis tubulosis, foliis amplis longis;  
*Symphytum*.

{ In quinque lacinias expansis, seminibus duris;  
*Lithospermum*.

## I. De Pulmonaria.

*Note sunt Perianthium oblongum integrum, folia maculosa. R. Synop. p. 75.*

Pulmonaria maculosa *Offic. Ger. Latifolia maculosa Park. Italorum ad Buglossam accedens J. B. Symphytum maculosum sive Pulmonaria latifolia C. B. Flechticht Lungen Kraut. In hortis colitur. Aprili floret. Usu. Folia. Vires. Pneumonica & Cardiaca censetur. Consolidat & glutinat. Usus ejus præcipuus est in Ulceribus pulmonum, aliisque eorundem affectibus, Phthisi, expuitione sanguinis. &c. Extrinsecus in vulneribus, R. H. p. 489.*

## II. De Cynoglossa.

*Note sunt, Semina aspera, lappacea, compressa, extremitatibus acutis, sursum ad stylum directis.*

Cynoglossa *Offic. Cynoglossum vulgare J. B. Majus vulgare C. B. Ger. Park. Hunds Zunge. Ad vias. Junio floret. Usu. Radix, Folia. Radix oblonga est, crassa, extus fusca, intus albicans, saporis fatui muscosi, aliquando subdulcis, saporis graviusculi. Vires. Refrigerat, ficit. Usus in sistendo fluxu alvi, Gonorrhœâ, ac Catarrhis exiccandis: Sanguini etiam sistendo: Strumas & Scrophulas sanat, & ad omnis generis ulcera & vulnera conducit. R. H. p. 490.*



## III. De Boragine.

*H*ujus notæ sunt, semina rugosa, flores stellati laciniis acutis, apicibus in umbonem acutum coeuntibus. R. H. p. 493

Borago Offic. Park. Hortensis Ger. Floribus cœruleis & albis J. B. Buglossum latifolium, Borrago C. B. Boragen. In hortis. Junio & Julio floret. Ufu. Radix, Herba & flores. Vires. Cordialis est è præcipuis, hinc ille versiculus.

*Dicit Borrago, gaudia semper ago.*

Flores inter quatuor cordiales famosos recensentur. Præparatis tribuunt vim roborandicor, ( & muniendi in febribus pestilentibus, & ictu serpentum aliisque venenis; ) lipopsychiam removendi, lætitiâ melancholicis excitandi, ac sanguinem depurandi. R. H.

## IV. De Buglossò.

*E*jus notæ sunt, semina rugosa, flores in quinque segmenta obtusa seu orbiculata expansi. R. Synop. p. 75.

I. Buglossum hortense Offic. vulgare J. B. Park. Angustifolium majus C. B. Buglossa vulgaris Ger. Ochsen-Zung. In hortis. Junio & Julio floret. Ufu. Radix, folia, flores, sunt hi è numero quatuor florum cordialium. Vires easdem obtinet, quas Borago. Flores scilicet insignem habent usum in Melancholicis & Hypochondriacis affectibus. R. H. p. 493.

2. Buglossum sylvestre *Offic.* sylvestre minus C. B. *Park.* Buglossa sylvestris minor *Ger.* Echium *Fuchsii* seu Borago sylvestris J. B. *Wild* Ochsen Zung. Inter segetes. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

## V. De Anchusa.

**A**nchusa ab Echio, Buglossa, aliisque congeneribus radicis sanguineo succo differt. R. H. p. 496.

Anchusa *Offic.* Monspeliaca J. B. Puniceis floribus C. B. Minor purpurea *Park.* Alcibiadion *Ger.* Roht Ochsen Zung. In hortis Botanicorum alitur. Junio floret. *Usu.* Radix longa, crassa, & lignosa, cortice rubro colore tingente, saporis astringentis. *Vires.* Radix oleo soluta rubro colore tingit. Petroleo infusam. & illitam ad vulnera recentia & puncturas commendant. R. H.

## VI. De Echio.

**F**lore corniculato seu incurvo & ex angusto principio in latum expanso, superiore parte longius excurrente, inferiore breviora à reliquis Asperifoliis distinguitur. R. Synop. p. 76.

Echium *Offic.* vulgare C. B. J. B. *Ger.* *Park.* Wild Ochsen Zung. Secus vias & fennitas. Junio floret. *Usu.* Radix, Herba, Flores. *Vires.* De hujus viribus nihil certi traditum invenio R. H. p. 498. Ad Epilepsiam & fervorem radicem sumendam præcipit *Wirtemb.*

## VII. De

## VII. De Lithospermo.

**N**Otae sunt, semen lapideum splendens, flores in quinque segmenta expansi. R. Synop. 76.

Lithospermum sive Milium Solis. Offic. J. B. Majus erectum C. B. Minus Ger. Vulgare minus Park. Meerhirse / Steinsamen. In agrorum marginibus & viis publicis. Maio & Junio floret *Ussu*. Herba, Semen. *Semina* sunt rotunda, glabra, splendentia, cinerea, lapidea, saporis farinacei. *Vires*. Calculum expellit, Renes abstergit, urinam ciet, partum pellit. *Schrod.*

## VIII. De Symphyto.

**F**Loribus cylindraceis pendulis; seminibus ad singulos flores quaternis lucidis ab aliis differt. R. Synop. P. 77.

Symphytum seu Consolida major Offic. C. B. magnum J. B. Majus vulgare Park. Consolida major Ger. Wall-Wurz / Schmer-Wurz. In aquosis ad rivis & fossas. Maio floret. *Ussu*. Radix, Herba, Flores. Radix est oblonga, surculosa, crassa, extus nigra, intus alba, saporis subduleis, mucilaginosi. *Vires*. Vulnerarium est celeberrimum: Fluxum alvi vulnerumque sanguinem sistit, & fracturas Ossium consolidat, dolorem Podagræ & Ischiadicum lenit.



## SECTIO DUODECIMA.

## De Herbis Verticillatis.

**V**erticillata dicuntur hæ plantæ, quia flosculi caulem articulatim velut verticilli amplectuntur, foliis inspersis. Notæ sunt folia in caule ex adverso bina, flores monopetali, labiati plurimum aut galeati, semina ad singulos flores quaterna, quibus floris calyx pro vasculo inservit, R. H. p. 508.

Plantæ Verticillatæ sunt vel

- [ Fruticosæ, hoc est, quarum Superficies perennat, flore
  - [ Galeato & labiato, seu utrinque labiato,
    - { Grandi, in spicis laxis è verticillis aliquantulum distantibus compositis, foliis latis obtusis; *Salvia*.
    - { Minore, foliis
      - [ Oblongis & angustis, florum verticillis
        - [ In spicas digestis
          - { Breviores, floribus densius stipatis,
            - { Habitiores, cum foliis in summa Spicæ; *Stæchas*.
            - { Minores & tenuiores seu graciliores longis insidentes pediculis Spicæ triticæ æmulas, *Lavendula*.
            - { Longiores, è verticillis rarioribus compositas, foliis virentibus; *Hyssopus*.
  - [ Ad caulium nodos, foliis intermistis
    - { Major, in magnum fruticem adulescens; *Rosmarinus*.
    - { Minor & humilior; *Satureia*.
  - [ Brevibus & latiusculis, florum verticillis in spicas breves & habitiores digestis,
    - { Villosas, odore suavi sed vehementi; *Marum*.
    - { Non villosas, foliis
      - { Latioribus brevibus & viridioribus; *Thymum*.
      - { Oblongis incanis & ad margines crenatis; *Polium*.

a b Galea carente, radice reptatrice, humilior, foliis  
 { quernis; *Chamadrys*.

Herbaceæ, hoc est, quarum caules non perrennant,  
 floribus

{ Quadripartitis aut quinquepartitis, vix labiatis,  
 tubo brevi; foliis

{ Integris, odore suavi, radice reptatrice, florum  
 verticillis

{ In spicas digestis; *Mentha*.

{ Ad caulium nodos, foliis intermixtis; *Pulegium*,

{ Laciniatis, venosis; *Verbena*.

Galeatis & labiatis, seu utrinque labiatis, tubo pro-  
 ductiore

{ In capitula squamosa congestis in summis caulibus  
 & ramulis, squamis

{ Majoribus glabris; *Distamnus*.

{ Minoribus,

{ Elatior, minus odorata, radice perenni; *Ori-  
 ganum*.

{ Humilior & minor odoratissima; *Majorana*.

In Spicas dispositis

{ Rariores, è verticillis pauld à se invicem remo-  
 tioribus compositas, odore

{ Suavi, foliis Majoranæ; *Ocimum*.

{ Minus grato, foliis rugosis, floribus hianti-  
 bus; *Horminum*.

{ Densiores & habiliores, verticillis proximè ad-  
 motis foliis

{ Incanis, Urticæ foliorum æmulis, odore  
 Menthæ; *Nepeta*.

{ Virentibus.

{ Elatior, folio crenato; *Betonica*.

{ Humilior, folio circum oras æquali; *Pra-  
 nella*.

Ad caulium nodos è foliorum alis exeuntibus

{ Sessilibus, pediculis brevibus aut nullis, verti-  
 cillis

- a b { Dense stipatis, multis floribus congestis, foliis incanis, ferratis, odore vehementiore; *Marrubium.*
- Minoribus & minus densis,
- { Folis Urticæ, odore foetido; *Lamium.*
- { Flagellis reptatricibus foliis subrotundis crenatis, florum galeis reflexis; *Chamaecissus.*
- { Pediculis innitentibus
- { Oblongis, flosculos plures sparsos sustinentibus, foliis & odore Menthæ; *Calamintha.*
- { Brevibus, flores multos confertos gestantibus, foliis atrovirentibus & latioribus, odore Citri; *Melissa.*
- { Galea carentibus, labiatis, foliis
- { Integris
- { Odoratis, Allium spirantibus
- { Elatior, Salvifolia, floribus spicatis, sylvatica: *Scorodonia.*
- { Humilior, reptatrix, palustris, foliis Chamædryos; *Scordium.*
- { Inodoris, duorum generum caulibus, aliis erectis, qui flores sustinent, aliis supinis & reptantibus, floribus spicatis; *Bugula.*
- { Trifidis, facie & odore Pinus; *Chamaepitys.*

## *De Herbis Verticillatis fruticosis.*

### *I. De Salvia.*

*Note sunt; flores magni, hiantes, in spicis laxis & verticillis aliquantulum distantibus compositis, folia lata, obtusa, rugosa, odor validus & vehementior.*  
*R. Hist. p. 509.*

1. *Salvia hortensis major* Offic. major Ger C.  
*B. Major vulgaris* Park. *Latifolia* J.B. *grosse*  
*Salbey.* In hortis. Junio floret. *Usu.* Folia & Flores



Flores. *Vires*. Diuretica est; Menses ob crassitiem remoratas ciet, nimios emendat. Prodest in Paralyfi, Vertigine, Tremore, Catarrhis. Extrinsecus Aphthas oris abstergit. *Schrod.*

2. *Salvia hortensis minor* *Offic.* minor *Ger.* Minor aurita & non aurita *C.B.* Minor auriculata *J.B.* Minor sive pinnata *Park.* *Kleine Salzbe.* In hortis Junio floret. *Usu.* Folia & Flores. *Vires.* Cum priore convenit.

## II. De Lavendula.

*Nota sunt, flores in spicas tenuiores, triticearum emulas, longis pediculis insidentes, congesti. R.H. p. 512.*

1. *Lavendula* *Offic.* maior sive vulgaris *Park.* Flore cœruleo & albo *Ger.* *Lavendula latifolia C.B.* Pseudo-nardus, quæ vulgò *Spica J.B.* *Lavendel.* In hortis colitur. Julio floret. *Usu.* Herba & flores. *Vires.* Partium est tenuium, cephalica & nervina. *Uusus præcip.* in Catarrhis, Paralyfi, Spasmo, Vertigine, Lethargo, Tremore artuum. In Urina, Mensibus, ac Fœtu pellendo, in torminibus ventris flatulentis, Extrinsecus in lixiviis capitis ac artuum, in Masticatoriis. *Schrod.*

2. *Spica vulgaris* *Offic.* *Lavendula angustifolia C.B.* *Lavendula minor sive Spica Ger, Park.* Pseudo-nardus quæ *Lavendula vulgò J.B.* In Hispania & Gallia provenit. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Eadem cum priore. *Præp. Ol. Spica.* Uteri motus ac dolores compefcit umbilico illitum. *Schrod.*

*III. De Stœchade.*

**S**picis habitioribus pilosis, squamulis imbricatis, ab aliis differt. R. H. p. 513.

Stœchas Arabica Offic. Arabica vulgò dicta J. B. Vulgaris Park. Purpurea C. B. Sive Spica hortulana Ger. Arabisch Stœchas. In Hispania & Gallia provenit. Majo floret. *Usu.* Flores sunt capitula oblonga squamata, ornata flosculis oblongis galeatis, & labiatis, saporis subacris, amaricantis, odoris fragrantis & gratiusculi. Eligendæ spicæ recentes odoratæ & subamaræ. *Vires.* Abstergit, attenuat, & aperit. *Ulus præcip.* in affectibus capitis & nervorum, scil. in Vertigine, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo: In morbis pectoris idem præstat quod Hyssopus; insuper Urinam & Menses ciet, Venenis resistit, affectibus Hypochondriacis succurrit. Extrinsicus in Lotionibus capitis, suffitu, &c. Schrod. Præp. Syr.

*IV. De Rosmarino.*

**M**agnitudine sua & statura insigni, floribus ad caulium nodos foliis intermixtis, foliis oblongis, angustis, prona parte candidis, supinâ obscurius virentibus, à congeneribus differt. R. H. p. 515.

Rosmarinus Offic. coronarius Ger. Coronarius fruticosus J. B. Hortensis angustiore folio C. B. Libanotis coronaria sive Rosmarinum vulgare Park. Rosmarin. In hortis. Vere floret. *Uju.* Folia, flores (Anthos dicti) & semen. *Vires.* Cephalica sunt è præcipuis, Nervina ac  
etiam

etiam Uterina. Usus præcip. in affectibus Capitis ac Nervorum, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, Caro, &c. Visum acnunt, foetorem anhelitus emendant, Epatis, Lienis, ac Uteri obstructiones resolvunt, Ictero ac fluori albo mulierum medentur, Corque confortant. *Schrod. Præp.*

### V. De Hyssopo.

**S**Picis florum longis, è verticillis rarioribus compositis, floribus versus unam partem spectantibus, segmento supremo, quod pro galeo est, bifido, & sursum reflexo, foliis virentibus à reliquis distinguitur. *R. H. p. 516.*

Hyssopus *Offic. vulgaris Park.* *Officinarum cœruleus sive spicatus C. B.* *Vulgaris spicatus angustifolius J. B.* *Arabum Ger. Zsop.* In hortis feritur. Julio ac Augusto floret. *Usu. Herba. Vires.* Attenuat, aperit & abstergit. Usus præcip. in affectibus Pulmonum tartareis, Tussi, Asthmate, &c. *Schrod. Præp.* Pro Hyssopo *V. Epistolas Salmasii & Beverovicii.*

### VI. De Satureia.

**N**Otae ejus sunt, Flores galeati & labiati, in spicam digesti, ad caulium nodos foliis intermixtis, statura minor & humilior. *R. M. p. 96.*

Satureia *Offic. horten-sis Park.* *Æstiva hortensis Ger. Sativa J. B.* *Hortensis sive Cunila sativa Plinii C. B.* *Saturey/Röse Kraut/Röllen.* In hortis feritur. Junio floret. *Usu. Herba. Vires.* Est inter herbas calidas & acres quæ Urinam & Menses movent: facultatibus cum Thymo, Serpillo & Hyssopo convenire aiunt. *R. H. p. 518.*

### VII. De



*VII. De Maro.*

*F*olius Thymi majoribus, capitulis & verticillis lanuginosis, odoris fragrantia, ab omnibus Verticillatis distinguitur. R. H. p. 520.

Marum Offic. Ger. vulgare Park. Sampsuchus sive Marum mastichen redolens C. B. Clino-podium quibusdam, Mastichina Gallorum J. B. Amber Kraut. In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Mensium profluvium sistit, & in reliquis cum Majorana convenit.

*VIII. De Thymo.*

*N*otæ sunt, folia brevia & latiuscula, flores in capitula in summis ramulis habitiora & laxa, congesti, R. H. p. 520.

1. Thymus Offic. vulgaris folio tenuiore C. B. Thymum durius Ger. Durius vulgare Park. Vulgare rigidius, folio cinereo J. B. Thymian. In hortis colitur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* In affectibus Tartareis Pulmonum, ac Artuum, omnia viscera referat, appetitum excitat. *Schrod.*

2. Serpyllum Offic. vulgare Ger. J. B. Vulgare minus C. B. Park. Feld-Quendel. In pascuis ficcioribus. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Thymo convenire videtur. Urinam & Menses movet.

*IX. De Polio.*

*N*otæ sunt, folia oblonga circa margines srenata. R. H. p. 524.

1. Polium montanum Offic. montanum minus Park. Maritimum erectum Monspeliacum C. B.

Ger. Monspessulanum J. B. Berg. Poley. In Italia & Gallia provenit. Floret æstate. *Ufu*. Herba Eligendæ recentes odoratæ. *Vires*. Urinam & Menses ciet; Hydropicos & Ictericos juvat; venenatis moribus auxiliatur. *R. H.* Succedaneum sequentiis est.

2. Polium Creticum *Offic.* angustitolium Creticum C. B. Park. Cretisch Poley. In Creta abundat. Maio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Cum priore viribus convenit. Hæc cum præcedente in Officinis Pharmacopolarum confunditur, & aliud pro alio venditur, folia enim hujus plantæ sunt multum minora, ad margines minimè dentata.

## X. De Chamædry.

**R**adice repente, foliis parvis Quercui similibus divisura ab aliis distinguitur.

Chamædrys & Triffago *Offic.* Chamædrys vulgaris Park. Minor Ger. Minor repens C. B. Vulgò vera existimata J. B. Klein Batengel oder Edel Gamanderlin. In hortis colitur. Junio floret. *Ufu*. Folia. *Vires*. Tenuium est partium; potenter urinam ac sudores movet. Confert in Febris, Scorbuto, Sanguine coagulato, & imprimis in Arthritide, Ictero, & Urina suppressa, Schrod.

## De Plantis Verticillatis herbaceis.

## XI. De Mentha.

**N**Ote sunt, Flos spicatus quadripartitus, galea & labello à segmentis lateralibus vix discernendis: odor suavis; radices reptatrices R. Syn. p. 78.

1. Menta sativa Offic. angustifolia spicata C. B. Romana Ger. Romana angustifolia sive Cardiaca Park. Krausemünz. In hortis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Tenuium est partium. Usus præcip. in Ventriculi imbecillitate, cruditate, Singultu, Vomitu, flatibus, ardore, Epatis obstructione, intestinorum dolore, capitis Vertigine, &c. Schrod. Præp.

N. B. Mentha sativa Ger. Easdem vires habet, adeoque in defectu substitui poterit.

2. Mentastrum Offic. spicatum folio longiore candicante. J. B. Mentha sylvestris folio longiore C. B. Rosmünz / wilde Münz. In pratis humidis sed rarius. Julio floret. *Ufu.* Herba. Easdem vires cum priore habet.

3. Mentha aquatica & Sisymbrium Offic. aquatica rubra Park. Rotundifolia palustris sive aquatica major C. B. Aquatica sive Sisymbrium Ger. J. B. Wassermünz. In humidioribus. Julio floret. *Ufu.* Herba.

## XII. De Pulegio.

Florum densis verticillis, sapore & odore acriore à Mentha differt. R. Synop. p. 79.



1. *Pulegium regale* *Offic.* *regium* *Ger.* *Latifolium* *C. B.* *Vulgare* *Park.* *Pulegium* *J. B.* *Polen.* In aquosis. Junio floret. *Uss.* Herba. *Vires.* Uss. præcip. in Menstruis ciendis, fluore albo, Foetum eiciendo, nauseam ac tormina Ventris discutit, calculum & Urinam pellit, Ictero ac Hydropi medetur. *Schrod.*

2. *Pulegium cervinum* *Offic.* *angustifolium* *Ger.* *C. B.* *Angustifolium* sive *cervinum* *Park.* *Cervinum angustifolium* *J. B.* In hortis sed rarius Junio floret. *Uss.* Herba. *Vires.* Easdem vires habet cum priore sed efficaciores.

3. *Calamintha palustris* *Offic.* *aquatica* *Ger.* *Arvensis verticillata* *C. B.* *arvensis* *Mentha verticillata hirsuta.* *J. B.* *Arvensis verticillata* sive *aquatica* *Belgarum* *Lobelio.* *Park.* *Wilde Polen / Korn-Münz.* In locis humidis. Julio floret. *Uss.* Herba. *Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

### XIII. De *Verbena*.

*A* Congeneribus differt foliis rugosis, laciniatis & floribus in spicis longissimis angustis, nullis intermissis foliis *R. Synop.* p. 79.

*Verbena* *Offic.* communis *Ger.* Communis flore cœruleo *C. B.* *Vulgaris* *J. B.* *Mas* sive *recta & vulgaris* *Park.* *E. senhart / Eisentraut.* In arvis & compitis. Æstate floret. *Uss.* Radix, Herba. *Vires.* Cephalica, Alexipharmaca & Vulneraria est.

## XIV. De Dictamno.

**F**oliis valde tomentosis & incanis, atque capitulorum squammis majoribus à reliquis differt. R. H.

P. 537.

Dictamnus Creticus Offic. C. B. Park. Cretica sive vera J. B. Dictamnium Creticum Ger. Cretischer Dictam. In Creta crescit. Julio floret. *Ufu.* Folia eligenda valde tomentosa, recentia, odorata. *Vires.* Uterina imprimis est herba ac Alexipharmaca. *Ufus* præcip. in obstructis Mensibus, in partu accelerando, in Ictibus venenatis, in spiculis extrahendis. Schrod.

## XV. De Majorana &amp; Origano.

**N**otæ sunt, flores in capitula squamosa congesti in summis caulibus & ramulis, capitulis & squamis minoribus quàm in Dictamno, foliaque minùs tomentosa & incana. R. H. p. 538.

1. Majorana & Samplicum Offic. major Ger. Vulgaris C. B. Vulgaris æstiva Park. Majori folio & semine nota J. B. Majoran. In hortis. Julio floret. *Ufu.* Herba, Semen. *Vires.* Cephalica & Uterina est. *Ufus* præcip. in affectibus capitis ac nervorum, hinc & Uteri & Ventriculi: ciet Menses (in pessario;) Confortat Cerebrum ejusque flatus discutit. Schrod. Præp.

2. Origanum Offic. vulgare spontaneum J. B. Anglicum Ger. Sylvestre, Cunila bubula Plinii C. B. Majorana sylvestris Park. Gemeiner Wollgemuht oder Dosten. In dumetis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Aperit, abstergit.

O 5

Ufus

Ufus præcip. in obstructione pulmonum, Hepatis ac Uteri, & in Tussi, Asthmate, & Ictero; auget lac, &c. Schrod.

3. Origanum Creticum Offic. Ger. J. B. Onites C. B. Onites *Matthioli Park*, Cretischer Bollgenueht. In creta Insula Junio floret. *Ufu*. Flores sunt capitula squamata, oblonga, colore fusco, sapore acerrimo, odore aromatico jucundo. Eligendæ spicæ recentes odoratæ. *Vires*. Uius præcip. in obstructione Pulmonum, Epatis, ac Uteri.

NB, In Officinis nostris epitheta Origani Cretici & vulgaris non distinguuntur, ergo ubi Medici præscribunt Flor. Origan. intellige Origani Cretici, & quando præscribunt Herbam, intellige Vulgaris, nam folia seu herba Origani Cretici nunquam in Officinis reperiuntur.

## XVI. De Ocymo.

*Nota sunt, folia Majoranæ, odor suavis Citri vel Caryophylli, flores in spicas laxas è Verticillis rarioribus compositas digesti. R. H. p. 540.*

1. Ocimum Citratum & Basilicum Offic. medium citratum Ger. Vulgatius C. B. Medium vulgatius & nigrum J. B. Vulgare majus *Park*, Basilien Kraut. In hortis seritur. Junio floret. *Ufu*, Herba, Semen. *Vires*. Expurgat Pulmones, Menses movet.

2. Ocimum caryophyllatum Offic. minimum C. B. J. B. Vulgare minus *Park*. Minus Caryophyllatum Ger. In hortis. Junio floret. *Ufu*. Semen.

## XVII. De



## XVII. De Hormino.

**N**Ote sunt, flores in spicis longis & laxis, folia rugosa, odor satis vehemens. R. H. p. 542.

1. Horminum hortense & Sclaræa Offic. sativum vulgare sive Sclaræa Park. Sclaræa dictum C. B. Gallitrichum sativum J. B. Sive Horminum Ger. Garten-Scharlach. In hortis. Junio & Julio floret. *Usu*. Folia. *Vires*. Calef. & siccatur, abstergit & attenuat.

2. Horminum sylvestre Offic. Ger. sylvestre Lavendulæ flore C. B. Park. Gallitrichis affine Maru, si non genus aliquod, Sclaræa Hispanica J. B. Wilder Scharley. In glareosis. Junio floret. *Usu*. Folia sed rarius.

## XVIII. De Nepeta.

**F**oliis Urticæ incanis, odore Menthæ graviore; floribus in spicas habitiores digestis à congeneribus differt. R. Synop. p. 80.

Nepeta Offic. major vulgaris Park. Mentha felina sive Cattaria Ger. Cattaria J. B. Cattaria vulgaris & major C. B. Katzenmünz. Ad Sepes non raro. Junio & Julio floret. *Usu*. Herba. *Vires*. Partium est tenuium. *Uusus* præcip. in Morbis Uterinis (scil. obstruct.) sterilitate, foetu pellendo, tum quoque in tartaro Pulmonum incidendo, &c. Schrod.

## XIX. De Betonica.

**N**Ote sunt, flores in spicas habitiores digesti; caules non ramosi, folia crenata. R. Synop. p. 80.

*Betonica* *Offic.* *Ger.* purpurea *C. B.* *Vulgaris* purpurea *J. B.* *Vulgarior* flore purpureo *Park.* *Braun* *Betonick.* In sylvis & dumetis, Julio floret. *Ufu.* Folia & flores. *Vires.* Cephalica, Epatica, Splenetica, Thoracica, Uterina, nec non Vulneraria, Arthritica, & demum Diuretica est. *Schrod.* *Præp.* *Aqu.* *Cons.* *Syr.* V. Plura apud *Humelbergium* in *Commentar.* *Anton.* *Musæ de Herbâ Betonicâ.*

## XX. De *Prunella*.

*Spicis brevibus habitioribus cum Betonica convenit, parvitate & humilitate sua, foliisque circum oras equalibus & non crenatis ab eadem differt.* *R.* *Synop.* p. 81.

*Prunella* *Offic.* *Ger.* vulgaris *Park.* *Flore minore vulgaris* *J. B.* *Brunella major* folio non dissecto. *C. B.* *Brunel.* In pascuis, Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba, Flores. *Vires.* Facultatibus cum *Bugula* convenit.

## XXI. De *Marrubio*.

*Nota sunt, flores in verticillis densis è calycibus striatis segmentis acutis seu spinosis circa caulium nodos, totius plantæ canities, odor vehemens & gravis; folia obtusa, serrata, rugosa.* *R.* *Synop.* p. 81.

*Marrubium album, & Prassium album* *Offic.* *album* *Ger.* *J. B.* *Album vulgare* *C. B.* *Park.* *Weisser Andorn.* Ad vias publicas. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* *Calef.* & *sicc.* *Ufus præcip.* in obstructione Pulmonum, Epatis, Lienis, Uteri, adeoque in Phthisi, in expuitione sanguinolenta, in partu difficili, Lochiisque remoratis, in Ictero. *Schrod.* *Præp.* *Syr.*

## XXII. De Lamio.

**F**Loribus in verticillis ad caulium nodos, foliis Urtica; Seminibus majusculis, è calycibus brevibus, maturitate illico decidentibus & odore non fœtido ab aliis differt. R. Synop. p. 82.

1. Lamium album & Urtica mortua *Offic.* album *Ger.* Album, non fœtens, folio oblongo *C. B.* Vulgare album, sive Archangelica flore albo *Park.* Galeopsis sive Urtica iners, floribus albis *J. B.* Weiße todte Nessel/ taube Nessel. Ad sepes. Aprili & Majo floret. *Usu.* Herba, Flores. *Vires.* Ad fluorem album & ad Scrophulas specificè celebratur.

2. Lamium rubrum *Offic.* *Ger.* vulgare folio subrotundo, flore rubro *Park.* Purpureum fœtidum folio subrotundo, sive Galeopsis *Dioscoridis* *C. B.* Galeopsis sive Urtica iners, folio & flore minore *J. B.* Röhre taube Nessel. Ad sepes. Primo vere floret. *Usu.* Flores. *Vires.* Ad Dysenteriam commendatur.

## XXIII De Chamæcisso.

**F**Oliis subrotundis, flagellis reptatricibus, odore fœtido, florum labio superiore bifido & reflexo ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 83.

Hedera terrestris & Chamæcissus *Offic.* terrestris *Ger.* Terrestris vulgaris *C. B.* *Park.* Chamæcissus sive Hedera terrestris *J. B.* Gunderman ober Gundel-Reben. Ad sepes. Aprili floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est. Usus creberrimi in tartaro, tam pulmonum quàm Renum, aliarumque partium, inciden-  
do,



do, resolvendo, adeoque confert obstructionibus inde natis, & Ictero, &c. Schrod. Præp. Syr.

## XXIV. De Calamintha.

**C**alamintha vulgaris seu montana Offic. vulgaris Park. Vulgaris Officinarum Ger. Vulgaris vel Officinarum Germaniæ C. B. Flore magno vulgaris J. B. Bergmünz. In viis publicis, sed rarius. Junio floret. Ufu. Herba. Vires. Stomachica ac Uterina est imprimis: Menses ciet, Fœtum ejicit, Urinam movet. Tussi medetur, Epar referat. Schrod. NB. Huic succedaneum est, & pro vero Mulierculis Botanopolis Londinensibus venditur *Calamintha flore minore, odore Pulegii* J. B.

## XXV. De Melissa.

**F**oliis atrovirentibus, odore Citri, floribus in uno pediculo è cujusque folii sinu egresso pluribus confertis, à reliquis distinguitur. R. H. p. 570.

Melissa Offic. Ger. Vulgaris Park. Hortensis C. B. Vulgaris odore Citri J. B. gemeine Melisse. In hortis colitur. Junio floret. Ufu. Herba, Flores. Vires. Usus magni est in affectibus Cephalicis, Cardiacis, Uterinis, hinc & in Stomachicis, adeoque in Melancholia, in somnis turbulentis, Paralyfi. Apoplexia. Epilepsia, Vertigine, Lipothymia, cruditate ventriculi, remotione Menstruis, ac Lochiis puerperarum, suffocationeque Uteri, emendat insuper fœtorem anhelitus, &c. Schrod. Præp.

## XXVI. De Ballote.

**O**Dore foetido *Lamium* refert, à quo differt, floribus in singulis pediculis è singulis foliorum egressis, pluribus confertis calycibus minis patulis & longioribus. R. Synop. p. 84.

*Marrubium nigrum* Offic. Ger. Nigrum sive Ballote J. B. Nigrum foetidum Ballote dictum Park. Nigrum foetidum, Ballote *Dioscoridis* C. B. Schwarzer Urdorn. Ad sepes. Junio floret. Usu. Herba, sed rarius. Vires. Remedium est in Hypochondriacis & Hystericis affectibus. D. Bowle.

## XXVII. De Chamapity.

**F**oliis *Pineorum* æmulis, odore resinoso, floribus galeâ seu labio superiore carentibus, à reliquis differt. R. Synop. p. 84.

*Chamæpytis* & *Iva arthetica* Offic. Mas Ger. Vulgaris Park. Lutea vulgaris seu folio trifido C. B. Vulgaris odorata flore luteo J. B. Schlag-Kräutlein / oder Vergiß mein nicht. In agris arenosis sed rarius. Junio floret. Usu. Herba. Vires. Nervosum genus roborat. Diuretica est & emmenagoga, confert in Arthriticis doloribus. Schrod.

## XXVIII. De Bugula.

**N**otæ sunt, flores galeâ carentes, caules duâm generum, alii teretes & repentes, alii quadrati & erecti, flores sustinentes in spicam laxam dispositos. R. Synop. p. 84.

*Bugula* & *Consolida media* Offic. Bugula Ger. Vulgaris flore cæruleo Park. Consolida

da media pratensis cærulea C. B. Media, quibusdam Bugula J. B. Beinwelle. In sylvis & pratis humidis. Majo floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Vulneraria est insignis.

## XXIX. De Scorodonia.

**O** Dore Allii & Salviae foliis, quodque flos galeam careat, ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 85.

Salvia sylvestris & Scorodonia Offic. Scorodonia sive Salvia agrestis Germ. Scordium alterum sive Salvia agrestis C. B. Scorodonia sive Scordium alterum quibusdam, & Salvia agrestis Park. Scordotis sive Scordium foliis Salviae J. B. Vide Galbey. In sylvis & dumetis. Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Vulneraria est e præcipuis, Menses & Urinam ciet. R. H. p. 576.

## XXX. De Scordio.

**O** Dore Allii, foliis & facie Chamædryos, loco palustris & reptatu suo, quodque flos galeam careat, ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 85.

Scordium Offic. Ger. C. B. J. B. legitimum Park. Scordium oder Knoblochskraut In palustribus sed rarius. Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Alexipharmacum ac sudorificum est; *Ufus* præcip. in Peste, Pestilentialibusque morbis, Febris malignis (tam præservando quam curando) in obstructionibus Epatis ac Lienis, in Pulmonibus purulentis ac mucilagine refertis, Lumbricos necat, extrinsecus mundificat vulnera & ulcera, lenit dolores Podagricos. Schröd. Præp. Aq. Comp. Elect.

SECTIO.



## SECTIO DECIMA TERTIA.

De Herbis semine nudo Polyspermis,  
hoc est, In quibus singulis floribus  
plura quatuor succedunt semina, nul-  
lo certo aut definito numero.

**P**ro Seminibus nudis cum Reverendissimo & Do-  
ctissimo, D. Raio, habeo quoscunque folliculos aut  
tegmina privata quæ sponte non exeunt

Herbæ semine nudo Polyspermæ sunt vel flore

Perianthio recto,

Triphyлло, flore

{ Tripetalo aquaticæ foliis Plantagineis; *Planta-*  
*go aquatica.*

{ Polypetalo, calice

{ Cum flore deciduo, foliis integris subrotundis,  
radicibus tuberosis, perennis, flore flavo;  
*Chelidonium minus.*

{ A flore superstito, foliis tripartito divisis, flori-  
bus cœruleis; *Hepatica nobilis.*

Pentaphyllo, unâ cum flore deciduo, seminibus in  
globulum congestis, flore pentapetalo; *Ranunculus.*

Octaphyllo, seminibus in rotulæ aut caseoli for-  
mam circumactis, foliis

Integris

{ Subrotundis; *Malva.*

{ Angulosis & incanis; *Althæa.*

{ Diffectis aut laciniatis; *Alcea.*

{ Decaphyllo seu in decem segmenta diviso, semi-  
nibus

{ Caudatis aut plumosis, foliis pennatis, radice  
aromatica; *Cariophyllata*

{ Nudis, absque ullis appendicibus, foliis venosis.

P

Digita-

- Digitatis in eodem pediculo  
 Ternis, seminibus pulpæ molli esculentæ  
 innascentibus; *Fragaria*.  
 Quinis aut septenis, flore  
 Pentapetalo; *Pentaphyllum*.  
 Tetrapetalo; *Tormentilla*.  
 Pinnatis incanis aut tomentosis, reptatrix;  
*Argentina*.

- Absque perianthio aut nudo, polyphylo, caule inde-  
 terminato foliato, speciosum florum thyrsus pro-  
 ferente, foliis pinnatis, radicibus  
 Tuberosis, bulbillis ab extremis fibrarum filamentis  
 dependentibus, seminibus in circulum dispositis;  
*Filipendula*.  
 Fibrosis, seminibus incurvis, in globulum congestis;  
*Ulmaria*.

## I. De *Chelidonio*.

**C**alyce triphylo cum flore polypetalo luteo deciduo,  
 & foliis integris subrotundis à congeneribus differt.  
 R. Synop. p. 86.

*Chelidonium minus* Offic. Ger. Park. *Cheli-*  
*donia rotundifolia minor* C. B. *Scrophularia*  
*minor*, sive *Chelidonium minus* vulgò dictum  
**J. B.** Scherbocks Kraut. In pratis. Martio &  
 Aprili floret. Usu. Radix, Herba. Vires. Sple-  
 neticum est. Usus præcipui in Ictero, Scor-  
 buto, Hæmorrhoidum fluore, Scrophulis &  
 Strumis. Extrinsecus specificè mariscas seu  
 ficos ani curat, dentiumque putredini maximo-  
 pere subvenit. Schrod.

## II. De *Hepatica nobili*.

**C**alyce triphylo non deciduo, foliis trifidis ab aliis  
 differt.

*Trifolium aureum* & *Hepatica nobilis* Offic.  
*Hepaticum flore simplici* C. B. *Hepaticum*, sive  
 Tri-

Trinitatis herba flore cœruleo J. B. Hepatica nobilis sive trifolia Park. Hepaticum trifolium Ger. Edel Leberkraut. In hortis. Vere floret. Ufu. Folia Vires. Vulneraria à Recentioribus Medicis censetur.

### III. De Ranunculo.

**N**Otæ sunt; flores pentaphylli unà cum calyce pentaphyllo decidui, semina unicuique plurima succedentia in globulum congesta. R. Synop. p. 86.

Ranunculus Offic. pratensis repens Park. Pratensis repens hirsutus C. B. Pratensis etiamque hortensis Ger. Repens flore luteo simplici J. B. Hasenfuß. In pratis. Majo floret. Ufu. Herba. Vires. Hic Ranunculus innoxius est, & cum Oleribus sæpè decoquitur mense Aprili.

### IV. De Malva.

**N**Otæ sunt; Flores monopetali pentapetaloides, calyx geminus, exterior in tres, interior in quinque lacinias divisus, folia integra subrotunda, semina in rotula aut caseoli formam circumacta. R. Syn. p. 88.

1. Malva vulgaris Offic. Park. Sylvestris. Ger. Sylvestris folio sinuato C. B. Vulgaris flore majore, folio sinuato J. B. Weiße Pappeln / Hasenpappeln. Ad sepes. Junio floret. Ufu. Radix, Folia, Flores, Semen. Vires. Hume-ctat, emollit, lenit dolores, laxat alvum, urinæ acrimoniam mitigat. Inter quinque herbas emollientes enumeratur.

2. Malva arborea Offic. hortensis Ger. Rosea folio subrotundo C. B. Rosea sive hortensis J. B.



Grosse Pappeln ? Pappel : oder Stock-Rosen.  
In hortis. Junio floret. *Ufu.* Folia, Flores.  
*Vires.* Humeſtat, minus tamen quàm vulgaris  
Malva. *Uſus præcip.* in tonſillarum morbis,  
Oris putredine, in fluxu Menſtruorum, &c.  
*Schrod.* Vide plura apud Joan. Dan. Horſtium de  
*Malva arboſcente cum replicatione adverſus Augu-*  
*ſtini Thoneri querimoniam.*

### V. De Althæa.

**F**olio productiore minusque rotunda, molliore &  
magis incano, locoque natali à Malva differt.  
*R. Synop. p. 89.*

Althæa, Biſmalva, & Ibiſcus *Offic. vulgaris*  
*Park. Dioſcoridis & Plinii C. B. Althæa, Ibiſcus*  
*Ger. Sive Biſmalva J. B. Eibich / Heilwurz.* In  
paluſtribus maritimis. Junio floret. *Ufu.* Radix.  
Herba, Semen. *Vires.* Emollit, laxat, diſcutit,  
dolores lenit, tumores maturat, acrimoniam  
Urinæ mitigat & corrigit; *Uſus præcip.* in af-  
fectibus Veſicæ, &c. *Schrod.* Inter quinque  
herbas emollientes numeratur. *Præp.*

### VI. De Alcea.

**F**oliis laciniatis à Malva differt. *R. Synopſ.*  
*pag. 89.*

Alcea *Offic. vulgaris J. B. Vulgaris ma-*  
*ior C. B. Vulgaris ſive Malva verbenacea Park.*  
*Malva verbenacea Ger. Sigmarſ-Kraut.* In  
ſepibus. Æſtate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.*  
Cum Malva viribus convenit.

### VII. De Caryophyllata.

**S**eminibus caudatis, foliis pinnatis, radice aromatica  
à congeneribus differt. *R. Synop. p. 89.*

**Caryophyllata** *Offic.* Ger. *Vulgaris* C. B. *Park.* *Vulgaris flore parvo luteo* J. B. *Benedictenwurzel-Kraut.* Ad fepes. Majo, & Junio floret. *Usu.* Radix, Herba. *Vires.* Cephalica ac Cardiaca est. *Ufus* præcipuus internè in Catarrhis exsiccandis, sanguine coagulato resolven-  
do. *Schrod.*

### VIII. De *Fragaria*.

**Notæ** sunt, *Folia venosa in singulis pediculis terna:*  
*Fructus molli esculentâ pulpâ constans, seminibus*  
*exterius adnascentibus, odore fragranti, cauliculi*  
*reptatrices.* R. *Synop.* p. 89.

*Fragaria* *Offic.* Ger. *vulgaris* C. B. *Park.* *Ferens fraga alba & rubra* J. B. *Erdbeer-Kraut.* In sylvis & dumetis. Majo floret. *Usu.* Folia, Fructus. *Vires.* Herba diuretica est usque crebri in Ictero, Gargarismis, Balneis & cataplasmatibus, &c. Fructus, i. e. *Fraga* *Offic.* Refrig. & humect. Splenetica sunt ac Nephritica, Venenis resistunt. *Schrod.*

### IX. De *Pentaphyllo*.

**Folia venosis, in singulis pediculis quinis, flore pentapetalo à congeneribus differt.** R. *Synop.* p. 90.

*Pentaphyllum, & Quinquefolium* *Offic.* *vulgatissimum* *Park.* Sive *Quinquefolium vulgare repens* J. B. *Quinquefolium vulgare* Ger. *Majus repens* C. B. *Sünffinger-Kraut / Sünff-  
blat.* Ad semitas. Æstate floret. *Usu.* Radix, Herba. *Vires.* Vulnerarium est & astringens. Sistit fluxus alvi, & hæmorrhoidum, nariumque hæmorrhagiam. Utile est in expuitione sangui-  
nis

nis & tussi. Prodesse dicitur & in Calculo & erosionem Renum, in hernia & febribus, &c. Schrod.

## X. De Argentina.

*Foliis pinnatis à reliquis differt.*

Argentina  $\S$  Potentilla Offic. Argentina Ger. Potentilla C. B. Park. Seu Argentina J. B. Gängrich / Silberkraut. In locis aquis Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Ut genere sic viribus cum Fragaria, Pentaphyllo & Tormentilla convenit. R. H. p. 617.

## XI. De Tormentilla.

*Foliis septenis in eodem pediculo, flore tetrapetalo à reliquis differt.*

Tormentilla Offic. Ger. J. B. vulgaris Park. Sylvestris C. B. Tormentill / Herbz Wurk / Feig Wurk / Blutwurk / Rothgunkel. In pascuis, Junio floret. *Ufu.* Radix, Herba. Radix dura, nodosa, crassa, in obliquum acta, fibrosa, colore rubente, sapore astringente. *Vires.* Siccat & astringit; hinc in fluxionibus quibuscunque alvi, uteri, &c. exhibetur, præterea diaphoretica est, & alexipharmaca; unde & omnibus medicamentis quæ adversus venena, pestem, variolas & morbillos aliosve morbos malignos componuntur adhibenda, præsertim si cum fluxu alvi conjuncti sint. R. H. p. 618.

## XII. De Plantagine aquatica.

*Foliis Plantagineis, flore tripetalo  $\S$  loco natali ab aliis differt.*

Plantago aquatica Offic. J. B. aquatica latifolia



tifolia C. B. Aquatica major. Ger. Park. Waffers  
Wegrich. In aquosis. Junio floret. Ufu. Ra-  
dix, Vires. Refrigerare & siccare dicitur.

### XIII. De Filipendula.

**N**Ote sunt, Flores polypetali, radices tuberosæ, glan-  
dulis oblongis ab extremis fibrarum filamentis  
pendulis, semina in circulo disposita. R. Synop. p. 92.

Filipendula Offic. J. B. Ger. Vulgaris  
Park. Vulgaris an Molon Plinii C. B. Rohter  
Steinbruch. In pratis & pascuis. Junio floret.  
Ufu. Radix, Herba. Vires. Diuretica est. U-  
sus præcip. est in tartarea mucilagine Pulmo-  
num, Renum ac Articulorum, in Colica flatu-  
lenta, in albo mulierum præfluvio, &c. Schrod.

### XIV. De Ulmaria.

**A** Filipendula differt radicibus fibrosis, magnitudine  
quâ illam excellit & seminibus intortis in glo-  
bulum congestis. R. Synop. p. 93.

Ulmaria, & Regina prati Offic. Ulmaria  
J. B. Vulgaris Park. Regina prati Ger. Barba  
capri, floribus compactis C. B. G. Johannis  
Wedel / Geißbart. In pratis humidis. Julio  
floret. Ufu. Herba. Vires. Sudorifica & ale-  
xipharmaca est, convenit in fluxibus omnis ge-  
neris, in Diarrhæa, Dysenteria, fluxu Men-  
struo, nec non in expuitione Sanguinis, resistit  
Pesti, Schrod.

## SECTIO DECIMA QUARTA.

## De Herbis Pomiferis.

**P**omiferas voco, quæ fructus plantarum omnium maximos producunt cortice crasso tectos, flores nudos, monopetalos, margine quinque partito, summo fructui insidentes. R. Hist. p. 637.

Herbæ Pomiferæ sunt vel carne seu pulpâ

{ Dulci vel insipidâ, semine

{ Anguloso, flore specioso, caulibus lignosis; *Contrayerva*.

{ Thyreoide, duobus in summitate eminentibus angulis velut cornuto, flore albo; *Cucurbita*.

{ Ad margines æquali absque eminentiis

{ Magno, lato, rhomboide,

{ { Albo, lineâ circa margines elatâ cincto, fructu maximo: *Pepo*.

{ { Nigro, nulla in margine elatâ lineâ, in medulla fungosa, aut rubente pulpa latitante; *Citrullus*.

{ Minore, semine per maturitatem

{ { Albo, angusto, oblongo, fructu majore,

{ { Æquali, tuberculis non exasperato, Moschum redolente, carne delicata; *Melo*.

{ { Tuberculis spinosis bullato, carne magis insipidâ & aqueâ; *Cucumis*.

{ { Nigro aut pullo, minore & brevior, fructu itidem minore undique hispido; *Olivæ* figurâ, pulpa purgatrice; *Cucumis asininus*.

{ Amarâ pulpâ intus fungosâ levissima, semine parvo albo duro; *Colocynthis*.

## I. De Granadilla seu Contrayerva.

**S**eminibus parvis, pomorum nucleis minoribus, basi cava in acutum desinentibus, superficie granulata, aut quasi cavis impressis punctis exasperata, floribus vel

ex decem vel quinque petalis ad ungues junctis, duplici radiata corona, quinque staminibus apiculatis & columella in tria clavata capitula desinente constructis, à reliquis differt. Flo. Lugd. Bat. flo. p. 262.

Drakena & Contrayerva Offic. Drakena radix. Ger. J. B. Contrayervæ radix ejusd. Contrayerva Hispanorum sive Drakena radix Clusii Park. Cyperus longus odoratus & inodorus Peruanus C. B. Clematis passionalis folio bifido H. Ox. Flori passionis sive Granadillæ affinis Coanenepilli sive Contrayerva Hernand. Ferrum equinum volubile Munting. Giffert. Wurzel. Ex Peru ad nos adfertur. Usu. Radix oblonga, nodosa, fibrosa, foris ruffa, intus pallida, saporis astringentis, odoris aromatici. Vires. Calida, aromatica, & Alexipharmaca est, incidit, leviter astringit, unde Cor confortat & corroborat, Venena expellit, noxia repellit, Febres omnes tollit, &c.

## II. De Cucurbita,

**N**Ota sunt, semen thyreoideum, duobus in summitate eminentibus angulis velut cornutum, flos albus, cortex fructus durus & quasi lignosus. R. H. p. 638.

Cucurbita Offic. lagenaria Ger. Major Park. Major sessilis, flore albo C. B. Latior, folio molli, flore albo J. B. Flasche / Kürbis. In hortis sed rarius. Junio floret. Usu. Semen recensetur in numero quatuor frigidorum majorum. Vires. Sitim sedat, urinam ciet & ventrem movet, semen genitale minuit & Veneris appetentiam extinguit; præterea convenit viribus cum Cucumere. R. H. p. 639.



## III. De Pepone.

**A** Reliquis distinguitur totius plantæ magnitudine, semine rhomboide, lineâ circa margines elatâ cincto. R. H. p. 639.

Pepo Offic. vulgaris. R. H. Major Ger. Cucurbita foliis asperis, sive Zuccha flore luteo J. B. Major rotunda, flore luteo, folio aspero C. B. Bela Schora H. M. Part. 8. p. 1. T. 1. Peponen. Usu. In Culinis Fructus, in Officinis Semen, sed rarò in usû occurrit. Vires. Convenit viribus cum Cucumere.

## IV. De Colocynthide.

**S**emine albo parvo, duro, in pulpa fungosa amara latitante, à reliquis differt.

Colocynthis Offic. Ger. J. B. vulgaris Park. Fructu rotundo minor C. B. Coloquinten. Ex Aleppo adfertur. Usu. Fructus. Vires. Pituitam crassam ac glutinosam ex profundioribus & remotioribus partibus expurgat, ut ex Cerebro, Nervis, articulis, pulmonibus. Unde commendatur & cum successu exhibetur in Cephalalgia, Hemicrania inveterata, Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Asthmate, Tussi, Dyspnœa, Morbis Articularibus frigidis, dolore Colico flatulento, Hydrope, &c. R. H. p. 643

## V. De Citrullo.

**E**jus notæ sunt, semina rhomboidea, nullâ in margine elatâ lineâ, in carne seu pulpa rubente latitantia, colore nigricante R. Hist. p. 643.

*Citrullus Offic. Ger. folio Colocynthis secto, semine nigro. Quibusdam Anguria J. B. Anguria Citrullus dicta C. B. Sive Citrullus vulgarior Park. Citrullen. In hortis sed rarius. Ufu. Semen. E numero quatuor frigidorum majorum est. Vires. Cum Cucurbita, Cucumere & Melone temperamento & viribus omnino convenit.*

## VI. De Melone.

*Semine albo, angusto, oblongo, cum Cucumere convenit; fructu majore, non spinoso, Moschum redolente, carne delicata ab eodem differt. R. H. p. 644.*

*Melo Offic. Ger. Park. J. B. vulgaris C. B. Melonen. In hortis. Junio floret. Ufu. Semen est e quatuor seminibus majoribus frigidis, Vires. Epaticum est & Nephriticum, eapropter confert Tussi, Phthisi & Febribus, medetur Stranguriæ, Urinæ ardorem, sitimque sedat, &c. Vide & reliqua semina frigida majora, cum quibus in omnibus convenit Schrod.*

## VII. De Cucumere.

*Notæ sunt, Fructus tuberculis spinosis bullati, semina pulpâ humidâ copiosâ, gelatinæ æmulâ, contenta, R. H. p. 645.*

*Cucumis hortensis Offic. sativus Park. Vulgaris Ger. Sativus vulgaris C. B. Vulgaris viridis & albus J. B. Gurken / Kummern. In hortis frequens seritur. Junio floret. Ufu. Fructus, Semen, e numero quatuor frigidorum majorum est. Vires. Refrig. abstergit, aperit, Urinam ducit, Usus creberrimi est in emulsionibus Antipleuriticis, Antinephriticis, &c. Schrod.*

## VIII. De Balsamina.

**N**Ote sunt, folia rotunda, capreolata, fructus verrucosus minimus per maturitatem puniceus, semen nigrum.

Balsamina Offic. mas Ger. Park. Rotundifolia repens seu mas C. B. Cucumeraria J. B. Cucumis puniceus Cordi H. Ox. Momordica Schrod. Heim. Cat. Balsam Kraut Männlein. In hortis colitur. Augusto floret. Ussu. Fructus. Vires. Refrigerat parumque siccatur, vulneraria est, dolores ac præsertim hæmorrhoidum mitigat. Extrinsecus sauciatis confert nervis, herniæ, ambustis, &c. Schrod.

## IX. De Cucumere sylvestri seu Asinino.

**F**Ructu parvo undique hispido, Olivæ figurâ, semine nigro quod per maturitatem cum impetu ejaculatur, pulpa purgatrice ab aliis distinguitur.

Cucumis sylvestris, Asininus Offic. J. B. asininus Ger. Sylvestris asininus dictus C. B. Agrestis sive asininus Park. Guarerva-oba sive Cucumer asininus Pison. Essels Kurbis. In hortis non infrequens. Junio floret. Ussu. Fructus. Præp. Elaterium Offic. Est Fructuum maturorum succus inspissatus, lubricus, viscosus, vel sponte, vel lævi compressione emissus, coloris fusci, saporis acris, amaricantis, nauseosi, odoris virosi. Vires. Purgat pituitam serososque humores vomitu & dejectione, movet menses, foetumque interimit. Sylv. & Schrod.



## SECTIO DECIMA QUINTA.

## De Herbis Bacciferis.

**B**accas voco, fructus herbarum quoscunque membrana tenuiore vestitos, pericarpio seu pulpâ intus per maturitatem humida aut molli semina ambiente, eisdemve intermixta. R. Synod. p. 94.

Herbæ Bacciferæ simplicibus acinis sunt vel

In racemos dispositis, scandentes,

{ Capreolis, cauliculis,

{ Spinosis

{ Foliis Tami lævibus; *Salsaparilla*.

{ Foliis Plantagineis; *China*.

{ Non spinosis, foliis vitigineis; *Bryonia*.

{ Cauliculis volubilibus, foliis Convolvuli; *Tamus*.

{ Magis sparsis, foliis

{ Latioribus & majoribus,

{ Nervosis,

{ *Επιφύκοναγρα*

{ Cum lingula seu folio secundario in medio folio; *Hypoglossum*.

{ Fructu solo seu bacca è medio folio enata, foliis

{ Majoribus & latioribus non spinosis; *Laurus Alexandrina*.

{ Minoribus, myrti æmulis, in mucronem spinosum & pungentem exeuntibus; *Ruscus*.

{ In caulibus fructus gerentes, flore

{ Cylindroide oblongo, elatiore, radice nodosa; *Polygonatum*.

{ Campaniformi, humilior foliis binis ternisve; *Lilium convallium*.

{ Minus nervosis, seu paucioribus nervis conspicuis, & mollioribus, fructu

Nudo

a

Nudo

{ Acaulis, pomo magno, radice grandi; *Man-  
dragora*.

{ Caulifera

{ Monococcus & tetraphyllos; *Herba Paris*.

{ Baccis pluribus flore stellato in quinque aut  
sex segmenta acuta partito & expanso,  
fructu

{ Magno

{ { Sicco, foliis integris; *Capficum*.

{ { Succulento, foliis pinnatis; *Pomum  
amoris*.

{ Minore

{ { Caule perenni, foliis Capsiei; *Dulca-  
mara*.

{ { Caule annuo, fructu in racemulis mino-  
re; *Solanum*.

{ Occultato, calycibus florum in vesicas excrescen-  
tibus, Solani foliis & flore, fructu rubro ma-  
jore, *Cerasi æmulo*; *Alkekengi*.

{ Tenuissimis & Capillaceis, turionibus esculentis;  
*Asparagus*.

Ad hoc etiam genus retulimus *Capficum* ob conve-  
nientiam cum Solano in partibus præcipuis; quam-  
vis nonnulli fortasse baccæ descriptionem huic plantæ  
minimè convenire objicient. R. H. p. 653.

## 1. De Salsaparilla.

*Capreolis* cum *Bryonia alba* convenit, foliorum for-  
ma cum nigra, caulibus spinosis ab utroque differt.

R. H. p. 655.

i. Sarsaparilla Offic. *Smilax aspera* Peruviana  
Park. *Alpera* Peruviana sive *Salsaparilla* C. B.  
*Peruviana Salsaparilla* Ger. *Viticulis asperis* Vir-  
giniana, folio hederaceo leni, *Zarza nobilissima*

P. B.

P. P. Tab. 3. Sarsa-parilla Brasiliensibus Juape-  
canga *Marcg.* Mecapatli seu Zarca parilla *Hernand.* An Cari-villandi *H. M. Part. 7. p. 59. T.*  
31. Smilaci affinis Salsaparilla *J. B. Sarsaparill.*  
Ex Peruvia ad nos adfertur, *Ufu.* Radices tenu-  
es, calami crassitie, longæ, sarmentosæ, enodes  
plures ex uno capite prodeuntes, foris rugosæ,  
& plicatæ, ex fusco pallidæ, intus candidæ, fa-  
rinaceæ, saporis & odoris nullius evidentis. *Vi-  
res.* Partium est tenuium & sudorifera. Speci-  
ficum est ad luem Veneream, Arthritidem &c.  
Sudores movet. An Salsaparilla & China inter  
se specificè differant non ausim determinare.  
Vide *Ufus* apud *Autores varios Medicos simul im-  
pressos Venetiis in fol.*

## 11. De China.

**B**accis aureis, foliis Plantagineis, & radice nodosa  
ab aliis differt.

In Catalogo simplicium ad Pharmacopœiam  
una duntaxat species Chinæ ponitur, at in offi-  
cinis Pharmacopolarum duas ostendunt & ven-  
dunt.

1. China *Offic. vulgaris* *Officinarum Ger. Ra-  
dix C. B. Radix Officinarum Park. Chinæ ra-  
dix J. B. Chinæ radix Acost. China orientalis seu  
Smilax aspera Chinensis Lampatam dicta in MSS.  
Herman. China Wurzel.* A regione China ad  
nos adfertur, *Ufu.* Radix crassa, tuberosa, nodo-  
sa, lævis, lignosa, foris fusca, intus ex candido  
rubescens, saporis & odoris nullius evidentis.  
Dum recens unctuosæ & acris. *Vires.* Leniter  
sic



siccatur & subastringit, diaphoretica est, diuretica, discutiens, aperiens, Epatica. Hinc convenit in Cachexia, Hydrope, Paralyfi, Arthritide, Cephalœa, Ictero, lue Venerea, tumoribus schirrhosis & œdematosis. *Schrod.* Præfertur Orientalis, quæ est recens, sapore insipido, interiorius candicans aut subrubens.

2. China occidentalis *Pharmacopolarum*. Jupicanga Brasiliensibus *Pison*. Olcacatzan Pahuanthianica *Hernand.* An Smilax viticulis asperis Virginiana, foliis angustis, lævibus, nullis auriculis prædita *P. P. Tab. 110.* Americanische China *Burk.* Ex America ad nos transportatur. *Uss.* Radix est oblonga, crassa, nodosa, tuberosa & lævis, foris rufa, intus subrubens. V. Plura de viribus & usu Rad. Chinæ apud *Vesalium* in *Epistolâ de Rad. Chin.* item apud *Brasavolum* in *Volum. Autorum de Morbo Gallico.*

### III. De Bryonia.

**N**Otæ sunt, capreoli ad scandendum, caules non spinosi, folia vitiginea, vis cathartica vehementior. *R. Synop. p. 95.*

Bryonia alba *Offic. Ger.* Alba vulgaris *Park.* Aspera sive alba, baccis rubris *C. B.* Vitis alba sive Bryonia *J. B.* Stiefwurz / Zaun-Rüben / Römische Rüben. Ad sepes. Maio floret. *Uss.* Radix. *Vires.* Purgat validè serosos & pituitosos humores. Splenetica, Uterina & Jecoraria est, utpote quorum obstructions aperit. Hydropicorum aquas per vomitum, ac secessum educit, menses ciet, foetum ejicit, suffocationes uteri arcet, Asthmata sanat, podagricis convenit. *Schrod.*

*Impos-*

*Impostores, nebulones, Circulatores, & Agyræ nonnulli ex hujus radice mira quedam monstra effingunt, quæ cum aliquot dies siccæ arene mandaverint, pro Mandragoris postea distrabunt.*

## IV. De Tamo.

**C**aulis huic volubiles, folia Convolvuli majoris, fructus in racemis per maturitatem rubentes, flores hexapetali. R. Synop. p. 95.

Bryonia nigra Offic. Ger. sylvestris nigra Park. Lævis sive nigra racemosa C. B. Vitis nigra quibusdam, seu Tamus Plinii folio Cyclaminis J. B. Schmar Wurzel. Ad sepes. Junio floret. Usu. Radix. Vires. Incidit & attenuat lentam pituitam, præsertim in thoracis affectibus. R. H. p. 661.

## V. De Hippoglossò, Lauro Alexandrina, & Rusco.

**P**lantæ sunt epiphyllocarpe, foliis Myrti æmulis, nervosis, mucrone acuto.

1. Hippoglossum & Bislingua. Offic. Park. mas & foemina Ger. Bonifacia sive Bislingua J. B. Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente C. B. Zapplein Kraut / Zungenblat. In hortis botanicis. Vulneraria est.

2. Laurus Alexandrina Offic. J. B. Alexandrina genuina Park. Alexandrina fructu folio insidente C. B. Alexandrinischer Lorbeer. In hortis botanicis. Usa. Herba. Vires. Vulneraria ac diuretica est.

3. *Ruscus*; & *Bruscus* Offic. Ger. *Ruscus* C. B. J. B. Park. *Brusch* / *Mäusehorn*. In sepi-  
bus & dumetis. *Ufu*. Radix. Recensetur inter  
quinque Radices aperientes. *Vires*. Atten. incid.  
aperit. *Ufus* præcip. in obstructione Epatis,  
*Urinæ*, *Mensium*, &c. Schrod.

## VI. De Polygonato.

*F*olius nervosis cum *Lilio convallium* convenit ma-  
gnitudine sua, caule multis foliis vestito, floribus  
cylindraceis è foliorum sinubus exeuntibus & deorsum  
dependentibus ab eadem differt. R. Synop. p. 96.

*Polygonatum* & *Sigillum Salomonis* Offic.  
J. B. *Polygonatum* Ger. *Vulgare* Park. *Latifo-*  
*lium vulgare* C. B. *Weiß*; *Wurk*. In sylvis sed  
rarius. Maio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. *Vul-*  
*nerarium* est & astringens, fluxiones quascun-  
que sistit; *Ossa fracta* & *hernias consolidat*.  
R. H. pag. 667.

## VII. De Lilio Convallium.

*N*otæ sunt, caulis nudus, flores parvi campanulati,  
*baccæ rubræ*, *folia nervosa*, *bina ternave*. R.  
Synop. p. 96.

*Lilium convallium* Offic. Ger. *convallium*  
*album* C. B. *convallium flore albo* Park. *Con-*  
*vallium vulgo* J. B. *Mey Blumen*. In sylvis &  
umbrosis. Maio floret. *Ufu*. Flores. *Vires*. *Ce-*  
*phalici* sunt, *Ufus præcipui* in morbis capitis fri-  
gidis, ut *Apoplexia*. *Paralyfi*. *Vertigine*, *Epi-*  
*lepsia* & in *Lypothymia*. Schrod. Vide plura de  
*Lilio Convallium* apud *Hieronimum Heroldum* in *Epi-*  
*stolis ad Matthiolum* & *Camerarium*.

## VIII. De



*VIII. De Mandragora.*

**N**Ote sunt, quòd nullos caules producat præter pediculos flores & fructus sustinentes, radices grandes anthropomorphas quodammodo. R. H. p. 668.

Mandragora Offic. fructu rotundo C. B. Mandragoras mas Ger. J. B. Mas vulgatio Park. Allraun Burghel. In hortis botanicis. Maio floret. *Ufu.* Folia. Cortex radicum, & Fructus. Folia acuminata sunt cubitum circiter longa, sequipalmum lata, coloris atro-virentis, odoris foetidi. Mulierculæ botanopolæ Londinenses folia Hyoscyami lutei pro foliis Mandragoræ ad Unguentum Populeum conficiendum non raro vendunt. *Cortex radicis* est colore ex cinereo ferrugineo, intus albidus, foris scaber, sapore amaricante, odore viroso. *Vires.* Soporiferus ac Narcoticus est. Extrinsecus usus est in oculorum rubore ac dolore, in Erysipelate, in tumoribus duris, Struma, Schrophula, &c. Schröd. Vide plura de Mandragora apud Deusingium in Fasciculo Dissertat.

*IX. De Herba Paris.*

**C**Aulibus non ramosis, determinatè seu ex una distinctione foliatis, quatuor plerumq; foliis; unico in singulis flore & bacca, ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 96.

Herba Paris Offic. Ger. Park. J. B. Solanum quadrifolium bacciferum C. B. Wolffs Beer/ Stern Kraut. In sylvis umbrosis. Majo floret. *Ufu.* Baccæ. *Vires.* Usus baccarum internus Alexipharimacus, in Peste, venenatis morbis, venenisque assumptis, Schröd.

## X. De Solano.

**N**Otae sunt, Flores monopetali quinquepartiti aut stellati, apicibus in umbilico oblongis, erectis, coitu suo umbonem componentibus, semina parva, compressa. R. Synop. p. 97.

1. Solanum Offic. C. B. vulgare Park. Hortense Ger. Hortense sive vulgare J. B. Nilentstanda H. M. Part. 10. p. 145. T. 73. An Agua-raquiya Pison. Nacht Schatten / Seur Kraut. Ad vias. Augusto floret. Ufu. Herba, Semen. Vires. Refrigerat. Usus præcip. externè in Erysipelate, in dolore capitis, in æstu febrili mitigando, in parotidibus. Schrod.

2. Solanum lignosum & Dulcamara Offic. Park. Scandens seu Dulcamara C. B. Amara dulcis Ger. Glycypiros sive Amara-dulcis J. B. Je lenger je lieber / Hindsch Kraut. Aquosa & rigua amat. Junio floret. Ufu. Radix. Vires. Urinam ciet, & Hydropem sanat.

3. Poma amoris Offic. Ger. Amoris majora fructu rubro Park. p. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli C. B. Mala aurea odora foetido, quibusdam Lycopersicon J. B. Golds Apffel. In hortis sata, æstate floret. Ufu. Fructus. Vires. Cum Solano & Mandragora viribus convenit. De Solano plura vide apud Velschium in Epistolis. & apud Fabrum in Strychnomania.

## XI. De Capsico.

**F**oliis integris, fructu oblongo, per maturitatem sicco, ab aliis differt.

Capficum & Piper Indicum Offic. longioribus siliquis Ger. Majus vulgatius, oblongis siliquis Park. Piper Indicum vulgatissimum C. B. Indicum sive Calecutium sive Piper siliquastrum J. B. Capo-Molago H. M. Quiya, Pison, Lada Chili Bont, Chilli seu Piper Indicum siliquosum Hern. Indianischer Pfeffer. In hortis sata. Junio floret. *Ufu*. Fructus, *Vires*. Inter medicos raro in usu occurrit; Apud Hispanos in cibariis & condimentis V. plura apud Gregorium de Regio in Libro de Capsicis.

## XII. De Halicacabo.

*Nota sunt, fructus in calycibus in vesicas intumescantibus occultati.* R. H. p. 681.

Alkekengi & Halicacabum Offic. Solanum vesicarium C. B. Halicacabum Ger. Halicacabum vulgare J. B. Halicacabum sive Alkekengi vulgare Park. Herk Saamen / Herk Körner / Schutten / Boberellen / Juden Kirschen / Teuffels Kirschen. In hortis colitur. Junio floret. *Ufu*. Fructus. *Vires*. Nephritica, diuretica, & Lithontripica est. *Ufus præcip.* in calculo renum & Vesicæ, in Ictero, in Sanguine coagulato. Schrod.

## XIII. De Asparago.

*Nota sunt, folia tenuissima, capillacea, turiones crassi, esculenti.* R. Synop. p. 97.

Asparagus Offic. Park. Sativus Ger. Sativa C. B. Hortensis & pratensis J. B. Spargen / Spargeln / Corallen Kraut In hortis. *Ufu*. Radix, Semen. Recensetur radix inter quinque radices aperientes. *Vires*. Diuretica ac Lithon-



triptica est. Epar, Lienem & Renes infarctu liberat, ideoque in decoctis eò respicientibus frequentissima est. Externè adhibetur in gargarismis, pro lenienda Odontalgia & laxitate gingivarum. Schrod.

## SECTIO DECIMA SEXTA,

### *De Herbis multifiliis seu corniculatis.*

**P**lantas multifilias voco, quæ ad singulos flores plures producunt filiquas seu cornicula disjuncta.  
R. Hist. p. 686.

Herbæ multifiliæ sunt vel foliis

Crassis, succulentis

{ Majores latifoliæ, foliis

{ Ad radicem multis

{ In globulos sine pediculis congestis, floribus in turculis reflexis in summis caulibus; *Sempervivum*.

{ Pediculis insidentibus, floribus cylindraceis, non deciduis, in spicas digestis; *Umbilicus Veneris*.

{ Ad radicem nullis, radice inodora tuberosa; *Telephium*.

{ Minores: *Illecebra*.

Texturæ rarioris & minùs succulentis, quibus

{ Folia

{ Digitata, flores non decidui, radices catharticæ; *Helleborus Niger*.

{ Pinnata, Fraxini similia; flores in spicas digesti; semina nigra, majuscula, splendentia; *Fraxinella*.

{ Flores

Cucullati,

**Eucullati**, folia circumscriptione subrotunda, laciniata, semina rugosa; *Aconitum*.

**Corniculati**,

Unico cornu seu calcari retrorsum extenso, semina triquetra,

Nigra, minora folia in tenues lacinias dissecta; *Delphinium*.

Fusca, majuscula, rugosa, folia vitiginea, Ricino similia; *Staphis agria*.

Pluribus corniculis recurvis, penduli, semina nigra lucida, folia umbelliferarum modo divisa; *Aquilegia*.

**Expansi majores**, rosei, semina majuscula, rotunda, per maturitatem nigra, radices tuberosae; *Paeonia*.

## I. De Sempervivo.

**Note sunt**, folia in globulos oculi bovini amulos congesta, lata & succulenta, flores in surculis reflexis in summis caulibus stellati. R. Synop. p. 98.

Sedum, & Sempervivum majus Offic. majus vulgare C. B. J. B. Park. Sempervivum majus Ger. Groß Hausswurz. In domorum tectis. Junio floret. Usus. Herba. Vires. Refrigerat valide & astringit. Usus præcip. intrinsecus in febribus biliosis; sedat sitim & compescit ardorem. Schrod.

## II. De Telephio.

**Folia non conglobantur in capitula**, Flores velut in umbella pentapetali.

I. Crassula & Fabaria Offic. sive Faba inversa Ger. Telephium vulgare C. B. Sive Crassula major vulgaris Park. Anacampteros, vulgò Faba crassa J. C. Knaben-Kraut / Joh. Zwang/

**Wund-Kraut / Fette Henne.** In agris. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est & astringens : *Ufus* præcip. in consolidanda intestinorum erosionem per dysenteriam introducta, in curanda hernia, in ambustis medendis. *Schrod.*

2. **Rhodia radix** *Offic. Ger. Park. C. B. J. B.* *Telephium* radice Rosam spirantem majus *Herm. Cat. Rosen Wurzel.* In mentosis. Vere floret. *Ufu.* Radix tuberosa, fragilis, foris fusca, intus albida, odore & sapore roscæ, *Vires.* Calefacit & siccatur, Cephalica est. *Ufus* præcip. in dolore capitis. *Schrod.*

### III. De Illecebra,

**Folia parva teretiuscula, sapore acri, flores pro parvitate plantulæ speciosi, lutei.**

**Illecebra** *Offic. minor seu Sedum tertium Dioscoridis Park. Vermicularis seu Illecebra minor acris Ger. Sempervivum minus vermiculatum, acre C. B. Sedum parvum acre flore luteo J. B. Maurpfeffer / Ragen Träublein.* In muris & tectis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Strumas discutit.

### IV. De Umbilico Veneris,

**Foliis rotundis crenatis, floribus cylindræis, non deciduis, à reliquis differt.**

**Umbilicus Veneris** *Offic. Ger. Veneris vulgaris Park. Cotyledon major C. B. Vera, radice tuberosa J. B. Nabel Kraut.* In saxis & muris. Aprili floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrig. cum Sempervivo viribus convenit.



## V. De Pæonia.

**N**Ota sunt, flores rosei maximi, semina majuscula rotunda, per maturitatem nigra, radices tuberosæ; folia composita. R. H. p. 693.

1. Pæonia mas *Offic.* Park. Ger. præcocior J. B. Folio nigricante splendido, quæ mas C. B. Männliche Pæonien Blumen / Pæonien Rosen / Gicht Wurk / Pfingst Rosen. In hortis Maio floret. *Usu.* Radix, Semen. Radix crassa, tuberosa, fusca foris, intus pallida est, saporis subdulcis, odoris nullius. Semina sunt grana subrotunda, nigra, lucida, sub cortice crassiusculo membranaceo includentia pulpam albicantem, saporis subdulcis, odoris nullius. *Vires.* Usus præcipuus est in affectibus cephalicis, Epilepsiâ, Incubo, &c. Uterinis, Mensibus obstructis, Lochiis purgandis, doloreque post partum mitigando, Epatis obstructione. *Schrod.*

2. Pæonia foemina *Offic.* Ger. foemina vulgaris flore simplici Park. Communis vel foemina C. B. foemina vulgatio J. B. Weibliche Pæonien. &c. In hortis, Maio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum priore convenit viribus.

3. Pæonia *Offic.* foemina multiplex Ger. Foemina vulgaris, flore pleno rubro Park. Foemina, flore pleno rubro majore C. B. Flore pleno rubro J. B. Gemeine Pæonien. In hortis frequens. Maio floret. *Usu.* Flores. *Vires.* Cum mare viribus convenit. Vide plura de Pæoniæ Historiâ & qualitatibus apud *Hunermolfium in Anatomia Pæon.*

## VI. De Helleboro nigro.

**N**Otae sunt, folia digitata, flores non decidui, radices catharticae. R. H. p. 697.

Helleborus niger, & Veratrum nigrum Offic. Niger verus Ger. Park. Niger flore roseo C. B. Niger flore albo J. B. Christwurk / Nieswurk. In hortis Botanicis. Januario floret. Ufu. Radices sunt tenues, fibrosæ, nigricantes, ex imo capite propendentes, saporis acris, pungitivi, amari, ingrati & nauseosi. Vires. Purgat potenter humores melancholicos. Utilis est in Mania, Insania, Hypochondriaca passione, Elephantiasi, Herpete, Cancro, Quartana, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Scabie. Schrod.

## VII. De Fraxinella.

**F**olius Fraxini, floribus in spica speciosis, seminibus magnis nigris splendentibus ab aliis differt. R. H. p. 698.

Dictamnus albus & Fraxinella Offic. albus vulgo, sive Fraxinella C. B. Fraxinella Ger. Park. Officinis Dictamnus J. B. Neschwurk. In hortis. Julio floret. Ufu. Radices sive radicum cortices, crassiusculæ, albicantes, Canulæ in modum convolutæ, saporis amariusculli, odoris nullius. Vires. Cordialis est, Alexipharmaca, Uterina, cephalica, Vermes necat: Usus præcipui in morbis malignis, in Epilepsia, aliisque affectibus capitis, in obstructione Uteri, &c. Schrod.

## VIII. De Staphide agria.

**F**oliis & siliquis atque etiam viribus cum Aconitis convenit, flore cum Delphinio. R. H. p. 705.

Staphis agria Offic. Ger. Park. C. B. J. B. *Seußwurk*. In hortis curiosorum. *Ufu*. Semina sunt rugosa, nigricantia, triquetra, saporis acris & fervidi, exurentis, ingrati & nauseosi odoris. *Vires*. Extrinsecus ejus usus est apophlegmatisans in masticatoriis, gargarismis, odontalgicis ac abstergentibus, in ulceribus ac papulis, &c. Schrod.

## IX. De Delphinio.

**N**ote sunt, folia in tenuissimas lacinijs dissecta, flores unico corniculo retrorsum extenso seu calcari donati, semina nigra triquetra. R. Hist. p. 708.

Consolida regalis & Delphinium Offic. regalis sativa Ger. Regalis hortensis flore majore & simplici C. B. Delphinium majus sive vulgare Park. *Rittersporen* / *Lerchen-Klauge* / *St. Ottiliens Kraut* oder *Blume*. In hortis. Julio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Vulneraria est; consolidat enim & glutinat. Visum acuit & roborat.

## X. De Aquilegia.

**N**ote sunt, Folia Umbelliferarum modo divisa, flores penduli cum pluribus corniculis recurvis, semina nigra, lucida. R. Synop. p. 101.

Aquilegia Offic. coerulea Ger. Sylvestris C. B. Flore simplici J. B. Vulgaris flore simplici Park. *Acteley* / *Eheriack's Kraut*. In sylvis sed rarius. Junio floret. *Ufu*. Herba, Flores, Semen,



Semen. *Vires*, Aperit Ep̄ar & Lienem, ac im-  
primis meatum biliarium, unde Regio medetur  
morbo; Ciet urinam & menses, vulnera con-  
solidat. Extrinsecus frequens ejus usus est in  
Gargarismis, *Schrod.*

## XI. De Aconito.

**N**Ota sunt, folia circumscriptione subrotunda, la-  
ciniata, flores cuculati, semina rugosa. R. Hist.  
pag. 702.

Anthora & Antithora Offic. Anthora Park.  
sive Aconitum salutiferum Ger. C.B. Antitho-  
ra flore luteo Aconiti J. B. Wolfsmurg/ Heile  
Giff oder Gifftheil. In hortis Botanicis. Ju-  
nio floret. *Usu*. Radix parva, crassa, brachia-  
ta, foris fusca, intus albida, saporis acris, odo-  
ris ingrati. *Vires*. Cardiaca est. *Usus præci-*  
*pue* in morbis ac ic̄tibus venenatis, ait *Schrod.*  
Sed credat qui velit.



SECTIO DECIMA SEPTIMA.

*De Herbis flore Monopetalo  
vasculiferis.*

Herbæ flore monopetale sunt vel flore

[ Uniformi, vasculo diviso in loculamenta

[ Bina, foliis in caulibus

[ Alternis; vasculo

[ Operculo testæ, quod per maturitatem abscedit, vi narcotica & virosa; *Hyoscyamus*.

[ Bivalvi, foliis pinguibus, flore è tubo longo in latitudinem expanso, margine integro & anguloso, colore rubente; vasculo oblongo conoide; *Nicotiana*.

[ Ex adverso binis, nervosis, sapore amaro; *Gentiana*.

[ Terna, seminibus in singulis cellulis binis majusculis, vicinis plantis se circumvolvendo scandens, succo lacteo turgescens: flore campanam referente, margine integro; *Convolvulus*.

[ Quaterna, fructu spinoso maximo, flore tubo oblongo, calathoide, facultate virosa; *Stramonium*.

[ Diffusi

[ Calcari donato, pericarpio subrotundo, bivalvi, flore rictum exprimente, caule multis foliis cincto; *Linaria*.

[ Corniculato, cum labello in palæ formam producto; pericarpio grandi, in sena loculamenta diviso; *Aristolochia*.

[ Auriculato parvo, pericarpio bivalvi; foliis in caule ex adverso positis; *Scrophularia*.

[ Dactylothecam referente,

[ Pendulo; calyce floris bivalvi; *Digitalis*.

[ Calyculo quinquepartito, radice repente; *Gratiola*.

[ Galcato, seminibus compressis, florum calycibus tumidioribus, minutioribus, foliis ad margines serratis; *Euphrasia*.

I. De *Hyoscyamō*.

**N**Otæ sunt, folia in caule alternatim sita, vascula seminalia operculo tecta, quod per maturitatem abscedit, calyx oris quadripartitis acuminatis insignis, vis narcotica & virosa. R. Synop. p. 101.

1. *Hyoscyamus Offic. niger* Ger. Vulgaris J. B. Niger vel vulgaris C. B. Park. Bilsens Kraut/ Zigeuner-Kraut/ Sau-Bonen/ Dollkraut/ Schlaf-Kraut/ &c. In incultis & ruderalis. Junio floret. *Usu*. Radix, Herba. *Vires*. Refrigerat & emollit mirè, somnum inducit, dolores sedat, acrimoniam mitigat, at rationem perturbat. Schrod.

2. *Hyoscyamus albus Offic. J. B. Ger. Park.* Albus major C. B. In Hortis Botanicorum sed rariùs. *Usu*. Semina parva, rotunda, compressa, ex cinereo fulca, saporis pinguis aliquantulum viscosi, odoris narcotici & ingrati. *Vires*. Exhibetur ad Hæmoptysin curandam. *Usum* mitior & tutior est quàm nigri multò.

II. De *Nicotiana*.

**N**Otæ sunt, Flos è tubo longo in latitudinem expansus, vasculum seminale bivalve, seminibus minutissimis innumeris refertum, folia in caulibus alternatim posita. R. Hist. p. 713.

*Nicotiana*, Petum & Tabacum *Offic.* *Hyoscyamus Peruvianus* Ger. Tabacco latifolium Park. *Nicotiana major latifolia* C. B. Major, sive Tabacum majus J. B. Petúme Pison. Pycielt seu Tabaco Hern. Toback. In hortis colitur. Julio floret. *Usu*. Folia lata & longa,



*acuminata, mollia & pingua, saporis acris, odoris virosi & narcotici. Hyoscyamus luteus, Mulierculis Botanopolis Londinensibus non sine errore pro foliis hujus plantæ ad Unguentum conficiendum non rarò venditur. Vires. Abstergit, incidit, resolvit, aliquantulum astringit, resistit putredini. Sternutatoria est ac apophlegmatizans, anodyna, vulneraria, Vomitoria, &c. Schrod. Præp. Syr. Ungt. Vide plura apud Everbardum, Magnenum, Neandrum, Simonem Pauli, Thorium, Scriverium, &c.*

### *III. De Gentiana.*

*Nota sunt, folia nervosa, in caulibus ex adverso bina, flores calathoides, margine in lacinias aliquot totidem folia imitantes plerumque diviso, sapor amarus. R. Syn. p. 102.*

*Gentiana Offic. major Ger. Major lutea C. B. Park. Vulgaris major Ellebori albi folio J. B. Englian. In hortis curiosorum. Junio floret. Usu. Radix oblonga, crassa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, saporis intensè amari. Vires. Alexipharmaca est, aperit, attenuat. Usus præcip. in Peste, aliisque venenatis affectibus, in obstructione Epatis, Lienis, &c. Schrod.*

### *IV. De Convolvulo.*

*Nota sunt, cauliculi perticis, aut plantis vicinis se circumvolvendo scandentes, vasculum seminale interna loculamenta, quorum unumquodque semina bina majuscula angulosa continet, divisum; Flos campanulatus margine integro, succus lacteus. R. Synop. p. 102.*

*1. Scam-*

1. Scammonium *Offic.* Syriacum *Ger.* Scammonia Syriaca *C. B.* Syriaca legitima *Park.* Syriaca, flore majore Convolvuli *J. B.* Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca *H. Ox.* In Asia & Syria. *Ufu.* Succus concretus. *Vires.* Expurgat validè humores biliosos, acres, serosus è partibus remotis, adeoque creberrimi usus est, non modo per se, sed & cum aliis permixtum. *Schrod.* Probatum quod nitidum, splendidum, citò liquescens, friabile, colore cum frangitur cinericeo, non valde ponderosum, tactu linguæ lactescens, nec vehementer calefaciens.

2. Mechoacana alba *Offic.* Mechoacan *J. B.* Peruviana *Ger.* Bryonia Mechoacana alba *C. B.* Alba Peruana sive Mechoacan *Park.* Convolvulus Americanus Mechoacan dictus *R. H.* Jetucucu Brasiliensibus seu Radix Mechoacan *Margg.* Jetucu sive Mechoacanna *Pison.* An Tacuache seu Radix Michuacana *Hern?* Mechoacan. *Ufu.* Radix crassa, substantiæ laxioris quàm Jalapii, carnosa, surculosa, alba, ex America ad nos allata. *Vires.* Pituitosos, aquosos, serososque humores, ex toto corpore, ac imprimis ex capite, ac nervoso genere, pectoreque blandè ac sine molestia educit. *Schrod.* Eligatur recens, albicans, ponderosa.

3. Jalapium, & Mechoacana nigra *Offic.* Jalapium *Ger.* Convolvulus Americanus Jalapium dictus *R. H.* Mechoacanna nigricans sive Jalapium *Park.* Bryonia Mechoacanna nigricans *C. B. J. B.* An Convolvulus Americanus  
sub

sub nomine Jalapiæ receptus *P. P. Tab. 25?* *Jalap.* *Ufu.* Radix oblonga, crassa, resinosa, in taleolas transversas secta, Mechoacannâ nigricantior & ponderosior, saporis acris & nauseosi: ex India ad nos transportatur. *Vires.* Expurgat validè humores noxios omnes, imprimis autem serosos. *Schrod. Præp. Resina.*

4. Turbith, & Turpethum *Offic.* Turbith *Hern.* Alexandrinum *Officinarum Ger.* *Officinarum Park.* Turpethum repens foliis Althææ, vel Indicum *C. B.* Convolvulus Indicus, alatus, maximus, foliis Ibisco nonnihil similibus, angulosis *R. H. Herm. Cat.* *Ufu.* Modo Cortex, modo Radix oblonga, crassa, resinosa, foris fusca, intus albida, saporis subacris & nauseosi: ex India ad nos transferuntur. *Vires.* Crassos viscososque humores, sive pituitam, fortiter & à remotioribus partibus, juncturisque elicit; unde & diuturnis morbis maximè conducit.

5. Soldanella, & Brassica marina *Offic. marina Ger.* Maritima minor *C. B.* Vulgaris sive Volubilis marina *Park.* Brassica marina sive Soldanella *J. B.* Convolvulus maritimus nostras rotundifolius *H. Ox. Meerwinde.* In maritimis arenosis. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Aquam validè educit, adeoque confert in Hydrope, Scorbuto, &c. *Schrod.*

## V. De Stramonio.

*Nota sunt, flos ex oblongo tubo calathoides; conceptaculum seminis grande, spinosum, in quatuor loculamenta divisum, facultas virosa. R., H. q. 747.*

R

1. Stra



1. *Stramonium Offic.* majus album *Park.* *Spinofum Ger.* *Stramonia altera major sive Datura quibusdam J. B.* *Solanum foetidum* pomo spinoso oblongo *C. B.* *Stech-Alepfel / Dornapffel.* In hortis. Junio floret. *Ufu.* Fructus, sed rarius. Semen Hypnoticum.

2. *Datura Offic.* *Cochinensis spinosissima Zanon.* fructu spinosissimo *Garz. ab Hort.* *Stramonium ferox Bot.* *Stramonia sive Datura ferox,* pomo crassioribus & robustioribus aculeis donato *Herm. Cat.* *Solanum foetidum,* pomo grandibus aculeis donato *Mor. Præhud.* foetidum, pomo grandiore spinosissimo *Hort. Reg. Par.* An Hummatu *H. M?* *Daturæ Malabaricæ Hummatu dictæ prima species R. H.* *Igel Kolben / Stachel-Muß.* In India Orientali oritur. *Ufu.* Semina rugosa, renis forma, foris fusca, intus exalbida. *Vires.* Semen in pulverem redactum & in potu exhibitum mentem turbat, & alienat, insaniam quandam viginti quatuor horas durantem inducens. Miser qui eum hausit diu velut mente alienatus remanet, aut ridens, aut ejulans, aut dormiens, plerumque etiam alteri colloquens & respondens, ut interdum etiam sana mente esse credas, tametsi mentis non sit compos, neque eum agnoscat cum quo sermones confert, & colloqui habitus planè sit immemor, postquam ad se redit. *R. Hist. p. 749.*

## VI. De Linaria.

**C**haracter genericus est, Flos rictum exprimens, calcar donatus, cui succedit vasculum bivalve. *R.*  
*Synops. p. 105.*

1. *Linaria Offic. lutea vulgaris* Ger. J. B. *Vulgaris nostras* Park. *Vulgaris lutea*, flore majore C. B. *Scheiskraut / Harnkraut / Flachsakraut / Leinkraut*. Ad agrorum margines. Junio & Julio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Diuretica est. *Ufus præcip.* in ictero & obstructione Epatis; in Urinæ difficultate, in Hydrope. Extrinsecus imponitur abdomini in Stranguria, ano, in Hæmorrhoidum dolore. *Schrod.*

2. *Elatine, & Veronica foemina Offic.* folio subrotundo C. B. *Park.* Mas folio subrotundo. J. B. *Veronica foemina Fuchsi* sive *Elatine* Ger. *Chrenpreis / Weiblein*. In arvis. Julio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Vulneraria est.

## VII. De *Aristolochia*.

**N**Otae sunt, flos semistularis seu corniculatus, labello in palæ formam producto, pericarpium grande in sena loculamenta dispertitum. R. Hist. p. 761.

1. *Aristolochia longa Offic.* J. B. Ger. *Longa vera* C. B. *Park.* *Rechte lange Höllewurzel / Osterlucey*. Provenit in Gallia Narbonensi. Vere floret. *Ufu*. Radix oblonga, rotunda, crassa, rugosa, foris fusca, intus sublutea, saporis amari & acris, odoris non ingrati. *Vires*. Cephalica, Epatica, & Pulmonica imprimis est: attenuat, aperit. Hinc prodest ad tartaream mucilaginem resolvendam, expectorandamque, ad Menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena discutienda. Extrinsecus adhibetur usu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera. *Schrod.*

2. *Aristolochia rotunda* *Offic. Ger. J. B. rotunda vulgatio* *Park. Rotunda flore ex purpura nigro C. B. Rinde Hollwurtz. In Italia. Floret vere. Ufu. Radix crassa, rotunda, rugosa & tuberosa, foris fusca, intus lutea, saporis amari. Vires. Tenuiorum est partium quàm Longa, adeoque efficacior, & imprimis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima. Schrod.*

3. *Aristolochia clematidis* *Offic. Park. Clematidis erecta C. B. Clematidis vulgaris J. B. Saracenica Ger. In hortis. Junio floret. Ufu. Radix, sed rarò in usu occurrit.*

4. *Serpentaria Virginiana, Colubrina Virginiana, & Pistolochia Virginiana* *Offic. Tres radices sub hoc nomine in Officinis nostris vaneunt, ut nos monuit eruditissimus ille Botanicus Leonard. Plukenetius M. D. in literis ad me datis, viz.*

1. *Aristolochia polyrrhizos, auriculatis foliis Virginiana P. P. Tab. 78. Polyrrhizos Virginiana Park. Pistolochia Virginiana Ger. emac.*

2. *Aristolochia Violæ fruticosæ foliis Virginiana, cujus radix Serpentaria dicitur. P. P. Tab. 15.*

3. *Aristolochia, Pistolochia, seu Serpentaria Virginiana, caule nodoso D. Banister. Cat. MS. P. P. Tab. 148. In Virginia. Ufu. Radices fibrosæ, tenues, foris fuscæ, intus flavescentes, saporis & odoris resinosi. Vires. Alexipharmaca sunt. Morsum canis rabidi sanant & ab Hydrophobia defendunt: Certissimo & præsentaneo remedio sunt adversus lethiferos morsus serpentis Boicininga.*



## VIII. De Scrophularia.

**N**Otæ sunt, flos auriculatus; vasculum bivalve, subrotundum, acuminatum, seminibus parvis fuscis repletum; folia in caule contrariis inter se pediculis bina. R. Synop. p. 106.

1. Scrophularia Offic. major Ger. Major vulgaris Park. J. B. Nodosa foetida C. B. Braunkwurk/ Sârwurk/ Wurm-Kraut/ groß Feigwarcken Kraut. In sepibus, Julio floret. Ussu. Radix. Herba. Vires. Digerit, incidit, saporis est amari. Usus præcip. in Strumis seu Scrophulis, Ficis & mariscis ani, in cancriosis ac similibus serpentibus ulceribus, malignaque scabie. Schrod.

2. Betonica aquatica Offic. Ger. aquatica major Park. Scrophularia aquatica major C. B. maxima radice fibrosa J. B. Radice fibrosa H. Ox. Wasser Betonic. In aquosis. Junio floret. Ussu. Herba. Vires. Cum priore viribus convenit.

## IX. De Digitali.

**N**Otæ sunt, Flos concavus, labiatus, pendulus, dactyliothecam referens; vasculum bivalve innumeris seminibus repletum. Flores crebri in spica versus unam partem spectant. R. Synop. p. 106.

Digitalis Offic. purpurea Ger. J. B. Purpurea vulgaris Park. Purpurea folio aspero C. B. Fingerhut/ Wald-Blöcklein/ Spitz-Wundkraut. In sylvis & dumetis. Junio floret. Ussu. Herba, Flores. Vires. Emetica, & vulneraria est. Cum Scrophularia viribus convenit.

R ;

X. De

## X. De Gratiola.

**P**Arvitate sua, radice repente, foliisque Hyssopi & loco natali à reliquis differt.

Gratiola Offic. Ger. J. B. vulgaris Park. Centauriodes C. B. Kirch Zsop/ oder weiß Aurin. In hortis Julio floret. *Ussu* Herba. *Vires*. Efficax remedium est in humoribus aquosis, lentis, biliosisque specificè evacuandis. Hinc magnus ejus usus est in Hydrope, Ictero, &c. Vermes necat. Schrod.

## XI. De Euphrasia.

**N**Otæ sunt, folia venosa, serrata, flores galeati, semina albicantia seu cinerea. R. Synop. p. 106.

Euphrasia Offic. Ger. J. B. vulgaris Park. Officinarum C. B. Augentrost. In pascuis. Julio floret. *Ussu*. Herba. *Vires*. Ophthalmica & Cephalica est. Usus præcip. in Oculorum suffusionibus, caligine, memoria debilitata. Schrod.

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

## De Herbis floribus tetrapetalis.

**H**Arum notæ sunt, calix quadrifolius unà cum flore deciduus, flores plures simul in summis caulibus & ramulis, successivè se aperientes, nullis ad pediculorum bases appositis foliolis, loculamenta in singulis vasculis seminalibus plerumque singula, rarius bina. R. H. p. 777.

Her.

Herbæ floribus tetrapetalis sunt vel

Veræ

Siliquosæ, semine

Compresso lato foliaceo, radice

Tuberosa, seu dentata, caule non ramoso, foliis  
in uno pediculo ternis, siliquis compressis;  
*Dentaria.*

Æquali, tenui, siliquâ longâ, angustâ, flore ma-  
jore odorato, flavo; *Keiri.*

Rotundo seu globoso, foliis seminalibus

Bifidis, siliquis

Tenuioribus non articulatis membranâ in-  
tergerinâ, duplicem seminum seriem di-  
sternante, secundum longitudinem dis-  
septis; foliis

Lævibus

Majoribus, glaucis, carnosis, semine mi-  
tiore & minus acri, per maturitatem  
nigro; *Brassica.*

Minoribus, laciniatis, semine acriore &  
calidiore, siliquis brevibus; *Eruca.*

Asperiusculis, semine

Mitior & minus acri, radice carnosa  
esculenta,

Majore & rotundiore, substantia la-  
xior; *Rapa.*

Minore, longiore, & subacri, substantiâ  
solidiore; *Napus.*

Fervido & acerrimo; *Sinapi.*

Crassis, fungosis, articulatis, membrana non  
disseptis, radice carnosa, esculenta, acri;  
*Raphanus.*

Integris, siliquis teretibus,

Brevibus & exiguis, floribus albis, foliis am-  
plis, integris, oblongis, radice reptatrice  
& vivaci, floribus

Majoribus foliis & radicibus, acris; *Ra-  
phanus Rusticanus.*

Minoribus sapore & odore Piperis; *Lepidium*

Productioribus, floribus



{ Luteis, foliis tenuissimè dissectis; *Sophia Chirurgorum*.

{ Albis, siliquis per maturitatem dissilientibus & semina cum impetu ejaculantibus, foliis pinnatis; *Cardamine*.

{ Siliculosæ seu seminibus capsula brevi inclusis,

{ Monospermæ foliis glaucis, integris, siliquis compressis, latis, pendulis, per maturitatem nigris; *Glastrum*.

{ Polyspermæ, seminibus tumidioribus & rotundioribus, vasculo seminali

{ Tumidiore & rotundiore, semine rotundo seu globoso, foliis crassis, succulentis, sapore falso, caule humili; *Cochlearia*.

{ Latiore & compressiore, sapore

{ Acri, odore acutiore, foliis incis; *Nasturtium*.  
Et odore remissiore, foliis integris; *Thlaspi*.  
Fatuos, theculis marsupii æmulis; *Bursa Pastoris*.

{ Anomalæ

{ Siliculosæ, semine parvo

{ Lanugine obducto, siliquis quadripartitis flores antevertentibus; Flores in hoc genere, summis siliquis insident & unà cum calycibus decidunt; *Lythmachia*.

{ Sine lanugine, in siliquis bivalvibus inclusis, foliis divis; *Chelidonium majus*.

{ Siliculosæ, seminibus in capsula

{ Monococca, binis puliciformibus Floribus flaminosis, in spicas congestis caulibus

{ Nudis, foliis

{ { Latioribus nervosis; *Plantago*.

{ { Angustis, ad margines laciniatis; *Coronopus*.

{ { Foliosis, foliis angustis binis oppositis, florum spicis è foliorum alis egressis; *Psyllium*.

{ In bina loculamenta divisâ; flosculis parvis, petalis ad unguis junctis,

{ { E foliorum alis exeuntibus spicatis; *Becabunga*

{ { In summis caulibus, spicatis; *Veronica*.

{ Tricocca

- a Tricocca in summo stylo, succo lacteo, acris, & fervido, foliis
- { Magnis, crassis & spinosis; *Euphorbium.*
  - { Parvis & glabris; *Titbymalus.*
- In quaterna loculamenta partita; foliis in plures lobos seu segmenta divisus, glaucis, glabris, odore vehementi: *Ruta.*
- In plurimas cellulas divisâ, operculo stellato glabro. Florum petala tenuia sunt, ampla, fugacia, calyce bivalvi; *Papaver.*

## *De Plantis flore uniformi tetrapetalo siliquosis.*

### *I. De Cheyri.*

**F**oliorum colore viridi & formâ acuminata, sed præcipuè florum colore luteo, ab aliis differt. R. Synops. p. 108.

Cheyri & Leucoium luteum Offic. Leucoium luteum vulgare C. B. Luteum, vulgò Cheiri flore simplici J. B. Keiri sive Leucoium vulgare luteum Park. Viola lutea Ger. Gelbe Bielen. In muris antiquis & tectis. Junio floret. Usu. Flores. Vires. Flores cordiales sunt, dolores mitigant, Menses cient, Secundinam proritant, Apoplexiam, & Paralyticos juvant.

### *II. De Dentaria.*

**F**oliis divisus, caule non ramoso, seminibus compressis & radicibus dentatis à reliquis differt.

Dentaria & Dentillaria Offic. tryphillos C. B. Park. Enneaphyllos Clusii J. B. Coralloide

R 5

radi-

radice live Dentaria Enneaphyllos Ger. Schups  
pen-Wurk / Zahn-Kraut. In hortis Botanicis  
non infrequens. Aprili floret. *Ufu*. Radix. *Vi-*  
*res*. Siccat & astringit.

### III: De Brassica.

**N**Otae sunt, folia maxima, glauca, seu subcœrulea  
carnosa, semina rotunda, minus acria. R. H.  
p. 794.

Brassica sativa & Caulis Offic. capitata alba  
C. B. J. B. Ger. Park. Kohl Kraut / Kohl. In hor-  
tis colitur. *Ufu*. Folia capitata & non capitata.  
*Vires*. Vulneraria sunt, ebrietatem arcent. Ex-  
trinsecus usitatum est rusticis, vulneribus &  
Vesicis folia imponere ut consolidentur, quin-  
imo & Pleuriticis doloribus imposita, eos  
mitigant, Schrod.

### IV. De Rapo.

**A** Reliquis hujus generis Radice carnosâ dulci in  
grandissimum tuber excrecente facillè distinguitur.  
R. H. p. 800.

Rapa Offic. sativa rotunda C. B. Rapum  
Park. Majus Ger. Sativum rotundum J. B. Ru-  
ben / Scheibeleruben. In agris & hortis feruntur.  
*Ufu*. est Radix. *Vires*. Modicum nutrit, infla-  
tionem parit, humentem ac laxam carnem ge-  
nerat, Urinam ciet & genitale semen auget.  
Scorbuticum sanat, ardorem Febris quartanæ  
mitigat.

### V. De Napo.

**R**adice carnosâ, esculentâ, minore, longiore, &  
subacri, substantiâ solidiore à Rapo differt. R.  
Meth. p. 121. Na-



*Napus dulcis* & *Bunias Offic.* *Napus J. B. Park. parad. Sativa C. B. Bunias Ger. Stenchruben.* In hortis feritur. *Ufu.* Radices in culinis; Semina parva rotunda ex ruffo nigricantia, saporis amaricantis acris, in Officinis. *Vires.* Calefacit, siccant, abstergit, aperit, digerit, Veneri potenter resistit. *Schrod.*

## VI. De Sinapi.

*Nota sunt, sapor foliorum, sed præcipuè seminum, fervidus & acerrimus; folia tam quæ in caulibus quàm quæ ad radicem aspera, flores lutei, quorum calices quàm primum flores aperiuntur debescunt, & se aliquantulum expandunt.* S. Synop. p. III.

*Sinapi Offic. sativum, & sativum alterum Ger. emac. Rapi folio C. B. Sativum Rapi folio Park. Siliqua latiuscula glabra, semine ruffo sive vulgari J. B. Senff. In hortis & areis, inque aggeribus fossarum. Ufu.* Semina ruffa, parva, rotunda, saporis acris, amaricantis, fervidi. *Vires.* Calefacit & siccant, incidit, attenuat, attrahit. *Ufus præcip.* in appetitu excitando, chylicatione promovenda: caput purgat. *Extrinsècus* in sinapismis, in arcendo caro (naribus inditum, vel in sinapismo adhibitum) tumores maturos aperit, sternutationem movet. *Schrod.*

## VII. De Raphano.

*Nota sunt, siliquæ crassæ, fungosæ, membrana non intercepta, at neque manifestè bivalves.* R. H. p. 804.

i. *Raphanus hortensis & Radicula Offic. Raphanus J. B. Sativus Ger. Vulgaris Park. Mi-*  
nor

nor oblongus *C. B.* Radieß. In hortis seritur. *Ufu.* Radix, Semen. *Vires.* Aperit, abstergit, attenuat, Semen præcip. *Ufus* præcip. in calculo atterendo ac expellendo, Urina ac Mensibus ciendis, in obstructionibus Epatis ac Lienis, &c. *Schrod.* Radix culinaris potissimum est.

2. *Raphanus Sylvestris Offic. Ger.* Rapisrum album articulatum *Park.* Flore albo, siliquâ articulatâ *C. B.* Flore albo striato, Sinapi album agreste *Trago J. B.* Raphanistrum flore albo striato siliquâ articulatâ striatâ, minore *H. Ox.* *Armoracia Schrod.* Wilder Radieß. Inter segetes. Junio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Calefacit & siccatur, mucilaginem tartaream incidit, attenuat, resolvit, viscera aperit, diuretica, lithontriptica & antiscorbutica est. *Schrod.*

### VIII. De Eruca.

*H*ujus notæ sunt, folia laciniata glabra, siliquæ angulosæ, odor foetidus. *R. H.* p. 806.

*Eruca Offic. latifolia alba sativa Dioscoridis C. B.* *Sativa Ger. Sativa alba Park.* Major sativa, annua, flore albo, striato. *J. B. Rauken Kraut/ weisser Garten-Gensf.* In hortis seritur. *Ufu.* Semina parva, rotundiuscula, flavescentia, parum compressa, saporis acris, subamari & fervidi. *Vires.* Calefacit & siccatur. *Ufus* præcipuus in Venere stimulanda, Apoplexia præservanda, &c. *Schrod.*

### IX. De Sinapistro.

*N*otæ sunt, folia laciniata, flores minores, siliquæ breves & strictiores. *R. H.* p. 808.

Ery-

*Erysimum* Offic. vulgare C. B. *Dioscoridis* & *Lobellii* Ger. *Tragi* flosculis luteis, juxta muros proveniens J. B. *Irio* sive *Erysimum* vulgare Park. *Eruca* siliquâ cauli appressâ, *Erysimum* dicta R. H. *Hirsuta* siliquâ cauli appressâ *Erysimum* dicta R. Synop. *Begeesenff*/Hederich. Ad sepes & muros. Julio floret. *Ufu*. Herba, Semen. *Vires*. Calefacit & siccatur, attenuat, aperit, expectorat. *Ufus præcip.* in mucilagine contumaci Pulmonum atque Tussi chronica. Schrod.

### X. De Erysimo.

*FLoribus luteis, siliquis longioribus, tenuibus & striatioribus à reliquis differt.*

*Sophia* Chirurgorum Offic. Ger. Park. *Erysimum* *Sophia* dictum R. H. & Synop. *Nasturtium* sylvestre tenuissimè divisum C. B. *Sylvestre* tenuissimè divisum seu *Nasturtium* *μυερίσφυλλον*, flore luteo minimo H. Ox. *Seriphium* Germanicum sive *Sophia* quibusdam J. B. *Wellsamen*/Sophie Kraut. In locis ruderatis. Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Siccatur & astringit, Diarrhœas, Dysenterias & Menses sistit, Extrinsecus ad Vulnera & Ulcera valet.

### XI. De Cardamine.

*Nota sunt, flores albi, siliquæ angustæ valvulis per maturitatem revolutis, dissilientibus, & semina cum impetu ejaculantibus, folia pinnata.*

I. *Cardamine* Offic. Ger. *Nasturtium* pratense, magno flore, simplici H. Ox. *Pratense* magno flore C. B. *Pratense* majus, sive *Cardamine* latifolia Park. *Iberis* *Fuchsi*, sive *Nasturtium*



tium pratense sylvestre J. B. Grosse Feld-Kresse.  
In pratis. Aprili floret. *Ufu*. Herba. *Vires*; Ca-  
lida & acris est & Nasturtii pollet viribus.

2. Nasturtium aquaticum *Offic.* Aquaticum  
vulgare *Park.* Aquaticum supinum C. B. Aqua-  
ticum supinum flore albo H. Ox. Aquaticum,  
sive Cratevæ Sium *Ger.* Sisymbrium Cardami-  
ne sive Nasturtium aquaticum J. B. Brun-Kresse/  
Wasser-Kresse. In aquosis. Junio floret. *Ufu*.  
Herba. *Vires*. Calefacit & siccatur, attenuat, ape-  
rit. *Ufus*. præcip. in Calculo & Sabulo, obstru-  
ctione Lienis, Epatis ac Mensium. Specificè in  
Scorbuto commendatur. *Schrod.*

## XII. De Raphanistro.

*Floribus albis, foliis magnis, integris, oblongis, ra-  
dice reptatrice, vivaci, sapore acri, siliquis parvis  
curtis, ab aliis plantis distinguitur.* R. Synop. p. 115.

Raphanus sylvestris & rusticanus *Offic.* ru-  
sticanus *Ger. Park. C. B.* Sylvestris, seu Armo-  
racia multis J. B. Merrettid. In hortis. Junio  
floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Calefacit & sic-  
cat, incidit, attenuat, eandemque cum Ra-  
phano qualitates habet, sed fortiores: tarta-  
ream mucilaginem incidit, specificè Scorbuti-  
cis prodest. Calculum pellit, Menses ciet, &c.  
*Schrod.*

9

## De Tetrapetalis siliculosis seu capsulatis.

### XIII. De Cochlearia.

**N**otæ sunt, statura humilis, vascula modicè tumida, folia subrotunda, crassa, succulenta, semina globosa; locus maritimus, flores albi. R. Syn.

p. 115.

1. Cochlearia Batava, rotundifolia, hortensis Offic. Cochlearia J. B. Rotundifolia Ger. Folio subrotundo C. B. Major rotundifolia sive Batavorum Park. Major Batavica subrotundo folio H. Ox. Löffel: Blat. In hortis frequens, Aprili floret. Usu. Herba, Semen. Vires. Calefacit & siccatur, sale Volatili abundat unde fixos & crudos humores spirituales ac volatiles reddit. Morbis illis medetur, qui à sale fixo nimis copioso originem ducunt, imprimis verò Scorbuto. Verum cum partes illæ in quibus præcipua vis, & utilitas hujus plantæ consistit, admodum volatiles sint & coctione faciliè evanescant, succus herbæ expressus vel infusum efficaciora esse videntur, quàm decoctum. R. Cat.

p. 74.

2 Cochlearia Britannica marina Offic. Britannica Ger. Britannica folio sinuato H. Ox. Folio sinuato C. B. Vulgaris. Park. In maritimis. Aprili floret. Usu. Herba. Vires. Cum prior viribus pollet. Vide plura in Mollenbroccii Hist. Cochlear.

XIV. De

## XIV. De Nasturtio.

**N**Otæ sunt, sapor acris, odor acutus & nares feriens, folia plerumque variè incisa. R. Hist. p. 825.

Nasturtium hortense Offic. Ger. Park. Hortense vulgatum C. B. Vulgare J. B. Vulgare, seu hortense tenuiter divisum H. Ox. Garten Kresse. In hortis feritur. Junio floret. Usu. Herba. Semina parva, oblonga, sublutea, aliquantulum compressa, in cacumen desinentia. Vires. Semen attenuat, aperit, abstergit. Usus præcip. est in tumido Liene, mensibus obstructis, foetuque mortuo expellendo; tartaream mucilaginem Pulmonum incidit, in Scorbuto & Hydrope confert. Schrod. N. B. Semen hujus Plantæ Pharmacopolis nostris pro semine Thlaspeos frequenter venditur.

## XV. De Iberide.

**N**Otæ sunt, folia integra, serrata, odor acutus, sapor acris.

Iberis Offic. J. B. Latiore folio C. B. Ger. Park. Latiore folio serrato H. O. Wilde Kresse. In hortis Botanicis. Usu. Herba. Vires. Similis est Nasturtio tum odore, tum gustu, tum viribus, sed minus ea desiccatur. Gal.

## XVI. De Lepidio.

**N**Otæ sunt, Folia integra magna, flosculi parvi albi, siliquæ itidem parvæ, radix reptatrix, odor & sapor Piperis, R. Synop. p. 117.

Lepi-



*Lepidium* & *Piperitis* Offic. *Latifolium* C. B. *Latifolium serratum* H. Ox. *Pauli* J. B. *Piperitis* sive *Lepidium vulgare* Park. *Raphanus sylvestris* Officinarum, *Lepidium Agineta*, *Lobelio* Ger. *Pfeffer-Kraut* / *Ingber-Kraut* / oder *Senff-Kraut*. Ad fluviorum ripas, sed rarius. *Ufu*. Folia. *Vires*. Vis foliorum acris & excalesciens, quapropter trita herba *Ischiadicis* præsentissimum est auxilium, inquit, *Dioscorides*.

## XVII. De *Thlaspi*.

**N**Ota sunt, vascula seminalia compressa, membrana cellulas determinans ad latitudinem seu planum siliquæ transversa, semen acre. R. Synop. p. 117.

*Thlaspi* Offic. *Dioscoridis* Ger. *Arvense* siliquis latis H. Ox. *Drabæ folio* Park. *Bauern-Senff* / *Besen-Kraut*. In arvis sed rarius. Junio floret. In usu sunt Semina parva, nigra, oblonga, sapore acri. *Vires*. Siccat & abstergit. Usus præcipuus in internis abscessibus rumpendis, mensibus ciendis, *Ischiadicis* affectibus curandis, &c. *Schrod*.

2. *Bursa pastoris* Offic. Ger. J. B. Major vulgaris Park. Folio sinuato C. B. Major capsula cordatâ, foliis laciniatis H. Ox. *Thlaspi fatuum*, *Bursa pastoris* dictum R. H. & Synop. *Seckel-Kraut* / *Easchen-Kraut*. Ad vias. *Ufu*. Herba. *Vires*. Refrigerat & siccat, adstringit & constipat. Hinc valet in *Hæmorrhagia narium*, expuitione sanguinis, *Diarrhœa*, *Dysenteria*, Fluxu nimio mulierum, &c. *Schrod*.

XVIII. De *Glasto*.

**N**otæ sunt, folia ad tingendum utilia, siliquæ compressæ, latæ, pendulæ per maturitatem nigra. R. Hist. p. 842.

Isatis & *Glastum* Offic. sativa vel latifolia C. B. Sive *Glastum sativum* J. B. *Glastum sativum* Ger. Park. Weid. In Arvis seritur. Junio floret. Usu, Herba. Vires. Siccatur & astringit. Vulneraria est insignis, vulnera conglutinat, Sanguinis profluvia Menselque sistit.

---

De *Herbis flore tetrapetalo anomalis*.I. De *Veronica*.

**N**otæ sunt, flosculi parvi tetrapetaloides, petalis ad ungues junctis, quorum calyces non decidunt unâ cum flore, ut in *Tetrapetalis* siliculosus, sed à flore delapso restant ad seminis usque maturitatem: flores etiam è sinubus foliorum exeunt. Vascula seminalia in bina loculamenta divisa, & compressa. R. Synop. p. 119.

1. *Veronica mas* & *Betonica* Pauli Offic. mas supina & vulgatissima C. B. Mas vulgaris supina Park. Vulgarior folio rotundiore J. B. Supina vulgaris foliis serratis H. Ox. Vera & major Ger. Ehrenpreis / Grund-Heil. In pascuis siccioribus. Junio floret. Usu, Herba. Vires. Vulneraria insignis ac sudorifica est. Usus præcip. in erosione ac obstructione Pulmonum ac Lienis; hinc & imprimis in Colica, Phthisi, Scabie, Pruritu, Peste, Vulneribus &c. Schrod.

2. Ana-

2. *Anagallis aquatica* & *Becabunga Offic.*  
*aquatica minor folio subrotundo C. B. Aquatica*  
*flore cœruleo, folio rotundiore minor J. B.*  
*Aquatica vulgaris sive Becabunga Park. Aquatica*  
*sive Becabunga Ger. Veronica aquatica ro-*  
*tundifolia Becabunga dicta minor R. Synop. A-*  
*quatica major folio subrotundo H. Ox. Bachbun-*  
*gen/Wasserbungen. In rivulis. Majo floret. Usu.*  
*Herba. Vires. Calefacit, moderatè humectat.*  
*Ufus præcip. in Scorbuto, Urinam, Calculum*  
*renum & vesicæ insigniter expellit; Menses*  
*ciet, Fœtum mortuum ejicit, &c. Schrod.*

## II. De Papavere.

**N**Ote sunt, *florum petala ampla, tenuia, fugacia,*  
*succus lacteus aut flavus, acer; calyx floris bifolius*  
*seu bivalvis, caducus, vis narcotica. R. Synop. p. 121.*

1. *Papaver album Offic. hortense semine albo,*  
*sativum Dioscoridi, album Plinio C. B. Sativum*  
*album Ger. Simplex album sativum Park. Hor-*  
*tense simplex semine albo H. Ox. Sativum J. B.*  
*Weisser Mohn. In hortis feritur. Julio floret.*  
*Usu. Folia, Flores, capita, semina, Succus densa-*  
*tus Opium Offic. Est substantia ponderosa, den-*  
*sa, inflammabilis & ardens, partim resinosa, par-*  
*tim gummosa, nigricans, odore soporiferum ac*  
*graveolens, sapore amarum & acre. Incisione*  
*capitum è vulnere facto sponte exstillat lac seu*  
*succus, qui calore solis concrescit. A Turcia ad*  
*nos adfertur. Vires. Herba, capita & Semina,*  
*refrigerare & humectare vulgò feruntur. Usus*  
*præcip. in somno conciliando, in affectibus Pe-*



toris ac Pulmonum, ac imprimis in Tussi, Raucedine, Phthisi; Hinc & in fluxu alvi. Extrinsecus in dolore leniendo, somno introducendo, &c. *Schrod.* Opium anodynum, narcoticum & sudorificum est; frigidum esse non potest, cum sit amarum, & inflammabile, cumque ex destillatione Oleum & Salem volatilem præbeat. Constat enim (ut alii volunt) ex particulis acerbis, aëriis, spirituosiss, salinis, & etiam viscosiss; anodynum est, quod particulis suis viscosiss involvit particulas Sanguinis acres dolores excitantes: narcoticum seu hypnoticum, quia particulis suis viscosiss Spiritus animales implicat & sistit: sudorificum, quia particulis spirituosiss sudores excitat. Verum secundum aliorum opinionem contra sudores Phthysicorum, ac in Sudore Anglico dicto utile est, quia in hisce affectibus spiritus sunt adeo subtiles ut ægrè possint contineri, hos autem opiata fixant. Alii ajunt contineri in eo Sulphur quoddam narcoticum, quod cum sit Spirituosum & etiam Sulphureum, acidum, inde fixantur Spiritus animales & Sanguis incrassatur. Vomitus excitat in corporibus salinis & biliosis ex concursu Sulphuris cum sale.

2. *Papaver nigrum Offic. sativum nigrum Ger. Sativum simplex nigrum Park. Hortense nigro semine, sylvestre Dioscoridi, nigrum Plinio C. B. Hortense simplex semine nigro H. Ox. Schwarzer Mohn.* In hortis seritur. Junio floret. *Usu.* Folia, Flores, capita, semina. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. *Papaver rubrum, Rhœas Erraticum*

*Offic. Rhœas Ger. Erraticum Rhœas, sive sylvestre Park. Erraticum majus* *poia's Dioscoridi, Theophrasto & Plinio C. B. Erraticum rubrum campestre J. B. Klapper, Rosen / Korn-Rosen.* Inter segetes, Junio floret. *Ufu.* Flores. *Vires.* Refrigerat validè, somnum conciliat, dolorem sedat. *Ufus præcip. in* Febribus, Pleurisi, cui specificè prodest, Angina, &c. *Schrod. Præp. Aqua, Syrupus.*

4. *Chelidonium majus Offic. Ger. Majus vulgare Park. C. B. Chelidonia J. B. Papaver corniculatum luteum Chelidonia dictum R. Synop. Schölfraut / Schwalbenfraut / Goldwurz.* In locis ruderatis. Aprili floret. *Ufu.* Radix, Herba. *Vires.* Calefacit & siccatur, validè abstergit, attenuat, saporis est acris & amari, visum acuit, Bilem per alvum & urinam educit. Hinc conducit in Ictero, obstructione Lienis & Epatis, Ureterum, &c. *Schrod.*

### III. De Tithymalo.

**N**ote sunt, vasculum seminale tricoccum in summo stylo, succus lacteus, acer. *R. Synop. p. 124.*

1. *Esula major Offic. major Germanica Ger. Park. Tithymalus palustris fruticosus C. B. Magnus multicaulis, sive Esula major J. B. Grosse Wolffsmilch.* In hortis Botanicis colitur. *Ufu.* Radix oblonga, pollicem crassa, foris fusca, intus pallida, lacte acerrimo, purgante & nauseoso turgida. *Vires.* Pituitam validissimè præcipuè per inferiora purgat & non sine cautione usurpatur.

2. *Esula minor*, & *Pityusa Offic.* *Tithymalus foliis Pini* fortè *Dioscoridis Pityusa* C. B. *Pineus Ger.* *Pityusa*, *Tithymalus pinea* sive *Esula minor Park.* *Tithymalus Cyparissiae* similis, *Pityusa multis* J. B. *Kleine Wölffsmilch.* In hortis frequens. *Ufu.* Radix, Cort. Radicis, & Folia. Radix est oblonga, *Esula* majori tenuior, foris fusca, intus ex flavo albescens, saporis paulò acrioris. *Vires.* Gustatu linguam & fauces ignea acrimonia adurit, assumpta verò tanta cum vehementia & simul molestia *Hydropicorum* aquas per Vomitus ac Sedes exterminat, ut non sine cautione usurpanda sit. *Esulae* utræque corriguntur maceratione in acidis.

3. *Cataputia minor* & *Lathyris Offic. minor* R. H. *Lathyris major* C. B. *Major hortensis Park.* Sive *Cataputia minor Ger.* *Tithymalus latifolius Cataputia dictus Herm. Cat.* *Spring-Kraut/ Spring-Körner / Treib-Körner.* In hortis frequens oritur. *Ufu.* Semina seu grana oblonga, rotunda. Piso majora, includentia sub pellicula corticosa nucleum album, pinguem, saporis subdulcis, acris, nauseosi. *Vires.* Vim habent catharticam validam; hæc grana ut & aliæ *Tithymalorum* Species in usu rarò veniunt.

4. *Tithymalus Offic.* *Helioscopius Ger. Park.* C. B. *Helioscopius* sive *solisequus* J. B. *Sonnenwendt/ Wölffsmilch.* In hortis frequentissima est. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum *Tithymalis* viribus convenit. Succus ad *Verrucas* commendatur R. Cat. p. 286.

5. *Esula Indica Bontii*, ex quâ lacryma flava  
Gutta



*Gutta Gemoy* affinis, vel eadem, emittitur, sed hic notandum cum *D. Syen* duplicem *Gotta Gurumi* vel *Gutta Gamba* à Mercatoribus vendi, viz. Vulgarem ab *Esulæ Indicæ* affini planta collectam, ab Indis *Lonam Cambodia* vocatam. Alteram verò præstantiorem, quæ ab Arbore Orientali *Codam pulli*, & *Careapuli*, seu *Kanna Ghoraka* funditur, quâ suo loco.

#### IV. De *Euphorbio*.

*F*oliis longis crassis & spinosis ab aliis differt.

*Euphorbium Offic.* verum Antiquorum. *R. H. p. 873.* Indicum *Opuntia* facie, caule geniculato, triangulari *Breyn. Prod. 2.* *Tithymalus Mauritanicus*, aphyllus, angulosus & spinosus, ex quo *Euphorbium Officinarum Herm. Cat.* *Schadida-Calli H. M.* An *Tithymalus Africal* nus spinosus, *Cerei* effigie, ex *Cod. Compton.* *Plukenetii in Phytograph. Tab. 231. Fig. 1.* *Euphorbium.* In India Orientali & Mauritania crescit. *Ussu.* Succus est substantia gummosa & resinosa; concreta in guttas pallidè flavescentes, varia forma, saporis acerrimi, exurentis, nauseosi, odoris nullius. *Vires.* Insignem quidem vim obtinet serum ac aquas ex toto corpore purgandi, non nisi tamen *Hydropicis* robustioribus conceditur: Externè in *Carie Ossium* usus ejus egregius est. *Naribus* admotum *Sternuationem* excitat. Corrigitur acidis. Alias *Euphorbii* species invento in *Horto Malabarico* sub nomine *Ela-Calli.* *Tom. 2. fig. 43. p. 83.* & apud *Clarissimum Plukenetium in Phytograph. Tab. 230. fig. 5.*

Sarcocollam officinarum è Tithymalo Persico spinoso provenire affirmant nonnulli.

## V. De Ruta.

**N**Ote sunt, Vasculum seminale in quaterna locula-  
menta partitum, quæ superiore parte aliquousque  
disjuncta sunt, & in angulos elata; folia in plures lobos  
seu segmenta divisa, glabra, glauca, odore vehementi.  
R. H. p. 874.

1. Ruta hortensis & vulgaris *Offic.* Hortensis  
*Ger.* Hortensis major *Park.* Hortensis latifolia  
*C.B.* Hortensis major latifolia *H. Ox.* Sativa vel  
hortensis *J. B. Garten-Raute / Wein-Raute.* In  
hortis. Junio floret. *Ussu.* Herba; Semina sunt  
parva, recurva, aut semilunata, coloris nigri-  
cantis, saporis amaricantis, aromatici, ingrati o-  
doris gravis. *Vires.* Alexipharmaca, Cephalica,  
ac Nervina est. *Ussu* præcip. in variis mor-  
bis, Peste, aliisque affectib' malignis præservan-  
dis ac curandis, Veneno arcendo, visu acuendo,  
lascivia reprimenda, pleuritide curanda, imbe-  
cillitate ventriculi corrigenda, colica discutien-  
da, Morsu canis rabidi debellando, &c. *Schrod.*

2. Ruta sylvestris *Harmel. Offic.* sylvestris flo-  
re magno albo *C.B.* Sylvestris Syriaca, sive Har-  
mala *Park.* Quæ dici solet Harmala *J. B. Har-  
mala Ger. Wilde Raute.* In hortis Botanicorum.  
Julio floret. *Ussu.* Herba. Semina parva, angulo-  
sa, nigricantia. *Vires.* Scribunt Arabes hujus  
semine inebriari homines, adeò ut subinde diu-  
tius dormiant: maximeque confert in Melan-  
cholia,

## VI. De Plantagine.

**N**Ote sunt, flores staminosi, in spicas congesti, flosculorum tubi in vascula seminalia elliptica (quæ per maturitatem horizontali sectione in medio diffiliunt) intumescences; semina intus bina, puliciformia. R. Synop. p. 125

1. *Plantago latifolia, vulgaris, terrestris*, & *Septinervia* Offic. *latifolia vulgaris* Park. *Latifolia* Ger. *Latifolia sinuata* C. B. Major folio glabro non laciniato, ut plurimum J. B. *Breit blättericht* Wegerich. Ad vias ubique. *Ufu*. Radix, Folia, Semina. *Vires*. Refrigerant & siccant, Epatica sunt ac Vulneraria. *Ufus præcip.* in fluxionibus cujuscunque generis. *Schrod.*

2. *Plantago angustifolia* *Quinquenervia* Offic. *Quinquenervia* Ger. *Quinquenervia major* Park. *Major angustifolia* C. B. *Lanceolata* J. B. *Schmal blättericht* Wegerich. In pascuis. *Ufu*. Herba. *Vires*. Cum priore viribus convenit.

3. *Coronopus* Offic. *hortensis* C. B. *Vulgaris* sive *Cornu Cervinum* Park. Sive *Cornu Cervinum* vulgò *Spicâ Plantagineâ* J. B. *Cornu Cervinum* Ger. *Plantago foliis laciniatis* *Coronopus dicta*. R. Synop. Rrden-Fuß. In arenosis. *Ufu*. Folia. *Vires* Cum *Plantagine* viribus convenit.

## VII. De Psyllio.

**C**Aulibus foliosis, foliis angustis, binis oppositis, florum spicis è foliorum alis egressis à reliquis differt. R. H. p. 878.



*Psyllium Offic. vulgare Park. Majus erectum C. B. J. B. Sive Pulicaris herba Ger. Plantago caulifera Psyllium dicta R. H. Psyllien oder Stohs-Kraut. In hortis Botanicis. Usu. Semina parva, oblonga, lucida, ex fusco nigricantia, saporis mucilaginosi, simulque acris, & nauseosi. Vires. Evacuat bilem flavam, mucilaginemque sua acrimoniam humorum obtundere aptum est. Hinc convenit maximopere in Dysenteria & Corrosione intestinorum. Schrod.*

### VIII. De Cuscuta.

*Longissimis filamentis, aphyllis contiguis plantis sese circumvolvens floribus monopetalis, tetrapetaloidibus, vasculis seminalibus rotundis à reliquis discriminatur.*

1. *Cuscuta Offic. Park. Major C. B. Sive Casutha Ger. J. B. Silk-Kraut/ Dottern/ Glachs-Geide. In Ericetis. Usu. Herba. Vires. Splenetica imprimis est, hinc Hepatica. Abstergit, subastringit, aperit, Melancholicum humorem corrigit, utilis in Scabie, Ictero nigro, obstructionibus Epatis ac Lienis. Schrod.*

2. *Epithymum Offic. sive Cuscuta minor C. B. Thym-Geide. Usu. Integræ Plantæ seu filamentorum rufforum. Vires. Purgat blandè Melancholicos & serosos humores. Uusus præcip. in scabie, ulceribus, affectibus Melancholicis in Hypochondriorum & Lienis passionibus & obstructionibus. Schrod.*

## SECTIO DECIMA NONA.

## De Herbis flore papilionaceo, seu leguminosis.

**F**lores hi Papilionacei dicuntur, quia Papilionem alis expansis quadantenus referunt. Folia seu petala his difformia sunt, nec figurâ, nec situ inter se convenientia, numero quatuor, verum ad ungues juncta. R. Synop. p. 127.

Herbæ flore papilionaceo sunt vel

- { Scandentes,
  - { Volubiles, quæ perticis aut plantis vicinis se circumvolvendo, à dextra sinistram versùs scandunt, trifoliæ, semine reniformi: *Phaseolus*.
  - { Capreolatae, quæ capreolis plantas vicinas arripiunt foliis
  - { Glaucis, glabris, caule æquali, foliis pinnatis, pinnis paucis, in hoc genere maximis, duabus præcipuè ad præteritum exortum caulem amplexantibus, caulibus majoribus & fistulosis; *Pisum*.
  - { Viridioribus & hirsutis, è minoribus & pluribus pinnis compositis, semine
    - { Tumidiore, globoso, siliquis pro plantæ modo longioribus; *Vicia*.
    - { Compresso, & pro plantæ modo grandi, siliquis brevibus; *Lens*.

{ Non scandentes, foliis

- { Digitatis aut pinnatis, siliquis ad singulos flores
  - { Simplicibus, unico alveolo unicam seminum feriem continentibus, siliquis articulis non interceptis, visui expositis
  - { Erectis, foliis

a b c

Digitatis

- a b c { Digitatis, caule tereti, floribus in summis caulibus & ramulis in spicas digestis, semine amaro; *Lupinus*.
- { Pinnatis, pinnis
- { Majoribus, conjugationibus paucioribus, floribus è foliorum alis exeuntibus, siliquis & seminibus maximis, caule anguloso inani; *Faba*.
- { Minoribus & pluribus, radice
- { Dulci repente lutea, caule procero, siliquis brevibus compressis; *Glycyrrhiza*.
- { Inspida, saltem non dulci, floribus spicatis, siliquis tenuioribus; *Galega*
- { Propendentibus
- { Nodosis, torulis seminum protuberantibus velut articulatis; *Orobis*.
- { Aequalibus seu planis, brevibus, tumidis & vesicarum instar inflatis; *Cicer*.
- { Geminatis, duplicem seminum seriem continentibus, floribus albis, siliquis glabris, curtis, foliis pinnatis, spinosis; *Tragacantha*.
- { Trifoliatis, quæ terna dumtaxat folia habent in extremo pediculo, floribus
- { In spicas congestis, seminibus & siliquis
- { In calycibus occultatis, spicis
- { Mollibus & villosis; *Lagopus*.
- { Lanugine nullâ aut rariore obsitis, calycibus strigosioribus & striatis; *Trifolium*.
- { Expositis, & extra calyces apparentibus, floribus in spicis è foliorum alis egressis, pendulis, odoratis, siliquis seu vasculis seminâlibus scabris, aut rugosis; *Melilotus*.
- { Sparsis & rarius sitis, siliquis rectis aut nonnihil incurvis,
- { Productioribus, compressis, seminibus lineâ ab angulo ad angulum depressâ sulcatis; *Fenum Græcum*.
- { Brevioribus, semine reniformi; *Anonis*.



## I. De Phaseolo.

**N**Otæ sunt, caulibus scandere, trifoliis esse, semina habere reniformia, siliquas simplices. R. H. p. 884.

1. Phaseolus Offic. albus Ger. Vulgaris Park. Smilax hortensis sive Phaseolus major C. B. Hortensis J. B. Faselen oder Türckische Bohnen. In hortis seritur. Julio floret. Usu. Siliqua. Vires. Aperit, digerit, Urinam ciet, menses movet.

2. Couhage Vulgò Phaseolus Zurratensis, siliquâ hirsutâ, R. H. p. 887. Siliquâ hirsutâ Park. Pruritus excitans hirsutie siliquarum Ger. emac. Zurratensis siliquâ hirsutâ pungente H. Ox. Utriusque Indiæ lobis villosis pungentibus minor P. B. P. Nai corana H. M. In India Orientali oritur, unde siliquæ ad nos delatæ.

## II. De Piso.

**N**Otæ sunt, folia glauca, glabra, pinnis amplissimis, caulem adeò arctè amplectentia, ut ab iis transadigi videatur, è paucioribus & majoribus in hoc genere lobis composita; caulis quàm congeneribus major & fistulosior. R. Synop. p. 127.

Pisum Offic. arvense flore candido, fructu rotundo albo C. B. Minus Ger. Vulgare parvum album arvense J. B. Sylvestre primum Park. Erbsen. In arvis copiosè seruntur. Usu. Semina. Vires. In culinis potius quàm Officinis reperiuntur.

## III. De

III. De *Vicia*.

**N**Otæ sunt, folia non cæsia seu glauca, ut in *Piso*, sed viridiora, è minoribus & pluribus pinnis composita. R. Synop. p. 129.

*Vicia* Offic. Ger. vulgaris sativa Park. J. B. Sativa vulgaris semine nigro C. B. Major vulgaris sativa H. Ox. Wicken. In arvis seritur. Usu. Semina.

IV. De *Lente*.

**S**emine compresso & pro plantulæ modo grandi, siliquis latis, brevibus, cum binis plerumque duntaxat seminibus à reliquis differt. R. Synop. p. 130.

*Lens* Offic. H. Ox. J. B. minor Ger. Park. Vulgaris C. B. Linsen. Seritur in agris. Usu. Semina.

De *Herbis flore papilionaceo non scandentibus*.V. De *Lupino*.

**N**Otæ sunt, folia digitata, caules teretes, flores in summis caulibus & ramulis in spicas digesti, siliquæ erectæ. R. Hist. p. 906.

*Lupinus* Offic. sativus Ger. Sativus albus Park. sativus flore albo C. B. Vulgaris semine & flore albo, sativus J. B. Vulgaris sive sativus albus H. Ox. Lupinen / Feig. Bonen. In hortis seritur. Junio floret. Usu. Semina alba, plana, compressa, rotunda, saporis amaricantis. Vires. Menses & foetum elicit. Lumbricos pellit.

Ex-

Externè Achores, Pustulas, Pforas, Gangrænas, & Ulcera maligna juvat.

## *VI. De Faba.*

*Nota sunt, siliquæ erectæ, crassæ; semen maximum, ad latera compressum, cum hilo magno in extremo; caules angulosi, firmi, concavi. R. Synop. p. 130.*

*Faba Offic. C. B. major hortensis Ger. Park. Faba, Cyamos leguminosa J. B. Bohnen. In hortis in usum culinæ copiosè seritur. Usu. Flores, Siliquæ, Fabæ. Vires. Emplastica est, refrigerat & siccatur, incrassatur, extergit, utilis intra corpus in Diarrhœa, Lienteria, &c. Extra in maculis à sole contractis, aliisque cutis sordibus extergendis, &c. Schrod. Aqua siliquarum tormina infantum mitigat.*

## *VII. De Glycyrrhiza.*

*Nota sunt, radices dulces, repentes, luteæ; siliquæ breves, compressæ, erectæ. R. Synop. p. 131.*

*Glycyrrhiza & Liquiritia Offic. vulgaris Ger. Park. Siliquosa vel Germanica C. B. Radice repente, vulgaris Germanica J. B. Süß Holz / Süß Wurzel / Lachrichten. In hortis. Floret Julio. Usu. Radix, Succus inspissatus. Radix est oblonga, sarmentosa, digitali crassitie, coloris flavescentis, saporis subdulcis. Duæ species succi inspissati in Officinis nostris reperiuntur; una in Anglia confecta ex decocto sarmentosarum radicum cum pulpa Prunorum mixta, & in Pilulas formata; altera ex*  
*Hispa-*



Hispania ad nos in laterculos aut rotulas adfer-  
tur. *Vires.* Pulmonica ac Nephritica est, acri-  
moniam mitigans, expectorationem promo-  
vens, adspersitatem leniens, alvum infantum  
leniter molliens. Usus præcipuè, in Tussi, Rau-  
cedine, Vesicæ erosionem, Urinæ acrimonia.  
*Schrod.*

### VIII. De Galega.

**N**ota sunt, Flores spicati, penduli, siliquæ erectæ, te-  
retes, tenues. R. H. p. 911.

Galega & Ruta capraria *Offic.* Galega *Ger.*  
J. B. Vulgaris C. B. *Park.* Geißbrauthen / Fleckens-  
Kraut. In hortis non infrequens seritur. Junio  
flore. *Ufu.* Herba. *Vires.* Celeberrimum est  
Alexipharmacum ac Sudorificum, Venenum  
imprimis pestilentielle insigniter discutiens.  
Usus ejus præcipuus in Petechiis expellendis,  
aliisque Morbis pestilentialibus, ipsaque Peste  
curanda, in Morbillis, in Epilepsia infantum,  
in ictibus serpentum, in Lumbricis, quos etiam  
extrinsecus applicata fugat.

### IX. De Orobo.

**N**ota est, siliqua nodosa, torulis seminum protube-  
rantibus, velut articulata. R. H. p. 915.

Orobus & Ervum *Offic.* siliquis articulatis, se-  
mine majore C. B. *Receptus Herbariorum Ger.*  
Vulgaris *Herbariorum Park.* Sativus sive Er-  
vum semine anguloso, siliquis inter grana jun-  
ctis *H. Ox.* Sive Ervum multis J. B. *Erven.* In  
hortis sed rarius. Junio flore. *Ufu.* Semina seu  
grana angulosa, subrotunda, fusca, spadicea,  
saporis leguminosi, subamaricantis, & ingrati.  
*Vires.*

*Vires.* Ob farinaceam substantiam respondent Fœnugræco, continent quoque Sal diureticum, ideo commendantur ad pellendum calculus.

### *X. De Cicere.*

*Nota sunt, folia pinnata hirsuta, dentata, siliquæ breves, teretes, turgidæ.*

1. Cicer album *Offic.* sativum *C. B. Ger.* Arietinum *J. B.* Sativum album *Park.* Weisse Zieser Erbsen. In hortis curiosorum. *Usu.* Semina sæpe rarius.

2, Cicerrubrum & nigrum *Offic.* arietinum nigrum vel rubrum *Park.* Rohte und graue Zieser Erbsen. In hortis Junio floret. *Usu.* Semina. *Vires.* Jus eorum Ictericos juvat: Decoctum Lumbricos ejicit, Menses & foetus educit, & lac gignit. In Cataplasmatibus Pforas, Lichenes, Parotides sanant, Testes inflammatos discutunt, Ulcera maligna consolidant. *R. H.* p. 918. Diuretica sunt ac lenientia, proin conducibile est eorum decoctum Nephriticis. *Schrod.*

### *XI. De Indico sive Indigo.*

*Nota sunt, folia pinnata, flosculi exiles admodum Meliloti similes; siliquæ breves, membranis intergerinis distinctæ; semina ex tereti quadrata.*

Indicum *Offic.* Nil sive Anil, Glaustum Indicum *Park.* Sive Anil, sive Indigo Indica *H. Ox.* Anil sive Nil, Indorum color *J. B.* Caachira prima *Pis.* Herva de Anil Lusitanis *Marg.* Xivhquith pitzahac sive Anil tenuifolia *Hern.* Colutea Indica herbacea ex qua Indigo *Herm. Cat.* Sef-  
T  
baa

ban aniliferum Indicum Coronellæ foliis vel Indigo Indica Breyn. 2. P. Ameri H. M. Polygala Indica frutescens Hermannii R. H. p. 926. Phaeolus Americanus vel Brasilianus Sextus C. B. Isatis Indica foliis Rorismarini, Glasto affinis ejusdem. Blau Indigo. In India tam orientali quàm occidentali colitur. *Ufu.* Fæx seu Pigmentum cœruleum, sed rariùs in medicinam venit; præcipuus ejus usus est ad pannos linteos cœruleo colore tingendos. Parandi ejus Pigmenti referente Hernandez hic est modus. Folia incisa in abenum cortinamve ferventis aquæ, sed jam ab igne sepositæ, tepentisve aut melius (ut rei affirmant periti) frigescentis neque ignem expertæ conjiciuntur, concutunturque vebementer rutris, ac paulatim aqua infecta transfunditur in testam aut dolium, & tandem per foramina paulò subliminora effuso humore, quicquid è foliis discessit, permittitur residere. Fæx illa Pigmentum est: siccatur id sole, & sacco cannabino percolatur, mox efformantur parvæ rotæ, quæ catinis superpositis carbonibus solidantur, ut recondi tandem queant in annuos usus. *Vires.* Partium tenuium est & facilè penetrat; Hinc Ictericis affectibus prædesse ajunt. Fluxiones mirè sistit, nam valdè astringit; ut Lochiis nimium fluentibus & alvi uterique procidentia decantatum remedium præbeat. *Ephem. Germ. A. XI. Obs. 113.* Pigmentum hoc venenosæ qualitatis particeps a Medicis antehac haberi solitum. Dicitur aliàs corrosivum inquit Paulus Ammannus. Hinc Electores Saxoniæ expressè prohibuerunt, ne Mercatōres Indicum in regiones hæc adveherent.



---

*De Herbis flore papilionaceo non scandentibus siliquis geminatis.**XII De Tragacantha.*

**F**olia habet pinnata, Vicia in modum, costâ mediâ, cui pinnulae annexae sunt in longam, rigidam, acutam spinam, procurrente; siliquis geminatis, duplici alveolo duplicem seminum seriem continentes. R. Hist. p. 933.

Tragacantha Offic. C. B. vera Park. Massiliensis J. B. Massiliensis foliis incanis, perseverantibus seu non deciduis, flore albo H. Ox. Sive Spina hirci Ger. Dragant oder Bochs Dorn. In hortis curiosorum sed rarius. Usu. Gummi est Substantia gummosa, pallida, variae formae, saporis mucaginosi. Exudat ex radice plantae incisae, & ex Turcia ad nos adfertur. Vires. Humeſcat, lenit, cutis spiracula obstruit, acrimoniam mitigat, iacraſſat, hinc in Raucedine & Hæmoptysi, Aſperitate faucium & in Stranguria conducit.

---

*Herbae flore papilionaceo non scandentes trifoliae.**XIII. De Trifolio.*

**F**loribus summo pediculo in spicas congestis, seminibus in calicibus occultatis, & ternis foliis in extremo pediculo à reliquis differt.

1. *Trifolium vulgare* *Offic.* *Pratense* *Ger.* *Pratense purpureum* *C. B.* *Pratense purpureum vulgare* *H. Ox. Park.* *Purpureum vulgare* *J. B.* *Gemeiner Klee.* In pratis. Junio floret. *Ufu.* Herba.

2. *Lagopus* & *Pes Leporinus* *Offic.* *vulgaris* *Park.* *Trifolius quorundam* *J. B.* *Lagopodium* sive *Pes Leporis* *Ger.* *Trifolium arvense, humile, spicatum, sive Lagopus* *C. B.* *Lagopoides purpureum arvense, humile, annuum sive Lagopus minimus vulgaris* *H. Ox.* *Haasen Fuß/ Haasen Klee.* In arvis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Siccatur & adstringit. *Ufus præcip.* in profluvio Alvi, Uteri, Fluore albo, Dysenteria, Hæmoptysi, Stranguria, Ulceratione Vesicæ, &c. *Schrod.*

#### XIV. De Meliloto.

*NOTE* sunt, Flores penduli in spicis è foliorum alis egressis filiquæ seu folliculi breves, scabri rugosive. *R. Synop. p. 135.*

1. *Melilotus* *Offic.* *vulgaris* *Park.* *Germanica* *Ger.* *Officinarum Germaniæ* *C. B.* *Trifolium odoratum sive Melilotus vulgaris, flore luteo* *J. B.* *Odoratum, seu Melilotus fruticosa lutea vulgaris, vel Officinarum* *H. Ox.* *Stein Klee.* Ad sepes & inter segetes. Julio floret. *Ufu.* Herba, Flores. *Vires.* Emollit, discutit, dolores mitigat. *Ufus creberrimi præcipuè extrinsecus, in tumoribus, doloribus, &c.* *Schrod.*

2. *Lotus urbana* & *Trifolium odoratum* *Offic.* *Hortensis odora* *C. B.* *Sativa odorata annua* *J. B.* *Trifolium odoratum* *Ger, Park.* *Melilotus major,*

major, odorata, violacea *H. Ox.* Siebengezeit. In hortis feritur. Junio floret. *Ufu.* Herba, Semen. *Vires.* Alexipharmaca, anodyna, diuretica ac Vulneraria est.

### *XV. De Fœnu Græco.*

*N*Ota ejus sunt, siliquæ productiores, incurvæ, compressæ, seminibus angulosis, lineâ ab angulo ad angulum depressâ sulcatis, repletæ *R. H. p. 954.*

Fœnugræcum *Offic.* *J. B.* Fœnumgræcum *Ger.* Sativum *C. B. Park.* Bockshorn oder Mutter Kraut. In arvis feritur. Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Emollit, digerit, maturat, discutit, Paregoricum est, crebrique usus in clysteribus emollientibus &c. *Schrod.* Dolorem Ischiadicum mitigat & Tumorem mammarum discutit.

### *XVI. De Anonide.*

*S*lliquis brevioribus, seminibus deliquium passis à reliquis differt. *R. Synop. p. 136.*

Ononis & Aresta bovis *Offic.* Anonis sive Resta bovis *Ger.* Sive Resta bovis vulgaris, purpurea & alba spinosa *J. B.* Spinosa flore purpureo *C. B. Park.* Purpurea vulgaris spinosa flore purpureo, siliquis erectis lentiformibus *H. Ox.* Stall Kraut / Ochsen Kraut / Hen-Hechel. In paucis sterilioribus. Junio floret. *Ufu.* Radix, Herba. *Vires.* Abstergit, attenuat, discutit. Usus præcip. in Diuresi, Lithiasi, Ictero, obstructione Epatis, in carnosio Ramice absumendo. Hæmorrhoidibus cæcis, Mariscisve discutiendis. Extrinsecus in putredine oris ac dolore Dentium, *Schrod.*



XVII. De *Fumaria bulbosa*.

**N**Otae sunt, flores Spicati ad Papilionaceos accedentes, calcaribus retrorsum productis quorum medio circiter tubo pediculus interitur, siliqua bivalves, folia dissecta aut pinnata. R. H. p. 974.

*Fumaria bulbosa* Offic. Schrod. *Bulbosa radice cava major* B. C. *Bulbosa*, radice cava flore purpurascente & albo J. B. *Tuberosa major*, radice cava H. Ox. *Radix cava major alba & purpurea* Ger. *Cava major flore albo & carneo* Park. *Hollwurz*. Colitur in hortis. Aprili floret. *Usu*. *Radix*. *Vires*. Calefacit, siccatur, abstergit, subastringit, aperit. Epatica est, Uterina, Alexipharmaca, sudorifera, diuretica, & vulneraria. *Uusus præcip.* in ciendis mensibus, lochiis, foetum mortuum expellit, Ictero medetur, sanguinem mundificat, adeoque & Scabiei succurrit. Extrinsicus commendatur quam maximè ad vulnera etiam inveterata, & fistulosa, utpote quæ mundificat & consolidat; ad Scabiem, ad dolores podagricos (à frigidis humoribus) ad sanguinem coagulatum in contusionibus, ad putredinem oris. Schrod.

## SECTIO VIGESIMA.

## De Herbis Pentapetalis vasculiferis.

*Titulus bis pro Nota characteristica sufficit. R. Meth.*

*Florem Pentapetaloidem dicimus potiùs quàm pentapetalon, quia folia seu petala florem componentia ad ungues juncta sunt, adeò ut flores integri decidant. R. Method. p. 144.*

*Herbæ Pentapetalæ sunt*

*{ Veræ, i.e. petalis ad ungues disjunctis, foliis*

*{ Integris in caule conjugatim dispositis, flore pentapetalo, terrestres, calice*

*{ Integro, concavo seu fistuloso,*

*{ Oblongo & cylindraceo; petalis margine extremo incisís; vasculo itidem seminali cylindraceo, angustifolio, folio glauco, gramineo, seminibus compressis, rugosis, nigris; *Caryophyllus.**

*{ Tumidiore; pericarpio pyriformi; summa parte per maturitatem se aperiente in oras dentatas, seminibus turgidioribus, florum petalis bifidis; *Lychnis.**

*{ Ad modum floris expanso in plura segmenta*

*{ Fruticosæ, superficie perenni; flore specioso, caduco, majore & elatiore, capitulis pentagonis; *Cistus Ledum.**

*{ Herbaceæ, superficie annua; seminis conceptaculo*

*{ E tribus carinis composito, flore flavo, comâ tritâ velut cruentante; *Hypericon.**

*{ Bivalvi, flore itidem flavo, foliis salicis oblongis, ad genicula interdum ternis aut quaternis; *Lyfimachia.**

*{ Simplici, semina in medio sita exterius protegente; florum petalis.*

a b

{ Disjunctis, bifidis, colore albis; *Alfne.*  
 { Ad ungues junctis, integris; in singulis fo-  
 liorum alis singulis; *Anagallis.*

{ In caulibus nullo aut alterno ordine positis, vasculo  
 feminali,

{ Simplicis, i.e. non diviso in loculamenta, quod per  
 maturitatem horizontaliter rumpitur; flore  
 flavo, calice bivalvi, foliis crassis, lævibus,  
 extremis subrotundis; *Portulaca.*

{ Diviso in loculamenta,

{ Bicorni; foliis

{ Teretibus, crassis, succulentis; *Sedum.*

{ Minus succulentis, subrotundis, crenatis;

{ *Cotyledon.*

{ Tricocco, flore pentapetalo,

{ Uniformi, specioso, seminibus mollissima  
 lanugine candida intermixta; *Xylon.*

{ Difformi, calcari donato, odorato; *Viola.*

{ Pentacocco loculamento vel

{ Rostrato; *Geranium.*

{ In quinque cellulas plura semina continen-  
 tes diviso, suntque vel

{ Corniculato, i. e. singulis loculamentis  
 summa parte corniculatis; *Nigella.*

{ Plano, calice tumido & velut inflato vesti-  
 cæ instar, flore specioso; *Alcea Indica.*

{ Decem, totidem semina continentia dispersito;  
 flore caduco; seminibus oblongis, compres-  
 sis, splendentibus, colore melino; *Linum.*

{ Anomalæ, sive petalis ad ungues junctis

{ Terrestris, foliis

{ Integris, caulibus

{ Nudis, flore è tubo oblongo in quinque lacinias  
 seu folia bifida expanso; foliis rugosis, tex-  
 turæ rarioris; floris calyce oblongo, conca-  
 vo, striato; *Paralyfis.*

{ Foliis vestitis

a b

Adversis



a b

Adversis seu binis in caulibus oppositis

Siliquosæ, succo limpido,

Lanigera & elatior, flore parvo, siliquis singularibus, Ciconiæ rostrum referentibus; *Asclepias*.

Humilior, provoluta & repens, foliis glabris, flore amplo, siliqua bicorni; *Clematis Daphnoides*.

Pericarpis femine minutissimo refertis, floribus in summis caulibus & ramulis crebris, sapore amaro insignes, flore è tubo oblongo in quinque segmenta acuta expanso; *Centaureum Minus*.

Alternis, floribus in thyrsis oblongis confertis, pericarpio bivalvi turbinato; *Verbascum*.

Ternis in uno pediculo, vasculo pentagono, sapore acido; *Lujula*.

Aquaticeæ, foliis

Ternis, floribus in thyrsis speciosis; *Trifolium paludosum*.

Integris, subrotundis,

Flagellis reptatricibus, in alis foliorum florens; *Nummularia*.

Caulibus nudis erectis, floribus albis unam partem spectantibus, vasculis seminalibus oblongis, feminibus minutissimis repletis; *Ros Solis*.

*Herbæ pentapetalæ foliis in caule ex adverso binis.*

*I. De Cariophyllo.*

**N**otæ sunt, calyx floris oblongus, cylindraceus, levis, integer, in margine duntaxat summo dentatus, vasculum itidem continens oblongum, cylindraceum; Petala margine extremo incisa aut laciniata;

niata; semina compressa, rugosa, per maturitatem nigra. R. H. p. 986.

Caryophyllus ruber, Veronica, & Tunica Offic. Hortensis Park. Multiplex Ger. Altilis major C. B. Betonica coronaria sativa, sive Caryophylleus flos J. B. Nagel-Blumen/ Nelken. In hortis colitur. Julio floret. Usus est Floris. Vires. Cephalici flores sunt ac Cordiales. Usus præcip. in Vertigine, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, aliisque capitis & Nervorum affectibus. In Syncope, ac Palpitatione cordis: fugant Lumbricos, allevant partum. In Ventriculi imbecillitate, Cardialgia, Febribus pestilentibus, &c. Schrod.

## II. De Lychnide.

**N**Otae sunt, Calyx floris integer, striatus & tumidior; vasculum seminale, pyriforme, summa parte se aperiente in oras dentatas, seminibus turgidis repletum. R. Synop. p. 139.

1. Behen album Offic. Ger. Been album Officinarum J. B. Lychnis sylvestris quæ Been album vulgò C. B. Sylvestris perennis quæ Been album vulgò H. Ox. Papaver spumeum vulgò Herm. Cat. Spumeum, sive Ben album vulgò Park. Marien Roslein oder Wiederstoß. Inter segetes. Julio floret. Ufu. Radix, quæ Modernis Behen album nominatur ad differentiam alterius, quod rubrum dicitur, quodque Limonium Herbariis censetur, ut superius ostendimus: neutrum tamen Verum Been Arabum est non Veteribus solum, ut in Capite de Limonio ostendimus, sed, etiam Modernis quid sint

sint hæ radices inter se minimè convenit, alii enim Behen album *Lychnidis sylvestris* quam *Lob.* *Papaver spumeum* vocat, alii *Angelicæ*, alii *Eryngii*, alii *Zedoariæ*, alii *Pastinacæ sylvestris* speciem esse autumant. Nos verò cum *Neotericis* Radicem hujus *Lychnidis*, vel ipsum *Behen album* esse, vel pro succedaneo ejus haud temerè usurpari posse opinamur.

2. *Saponaria Offic.* *Ger.* major lævis *C. B.* *Vulgaris Park. J. B.* *Vulgaris simplex H. Ox.* *Lychnis Saponaria dicta R. Synop.* *Lychnis Saponaria dicta major vulgaris simplex Herm. Cat.* *Geiff Kraut.* Juxta torrentes nascitur, sed rarius. Julio floret. In *Ussu* sunt, Radices, Herba. *Vires.* Strenuè attenuat, aperit, sudorifica est. *Ussus* in *Asthmate*, *Utero* & mensibus ciendis, in *Lue Venerea*. *Extrinfecus* ptarmica est, tumores ac præcipuè pannos discutit.

### III. *De Cysto Ladanifera,*

*Nota* sunt, *Fruticosum* esse & substantiâ lignea florem habere pentapetalon amplum & quasi roseum, caducum; capitula pentagona. *R. H.* p. 1006.

*Cistus Ledon Cretense C. B.* *Latifolium Creticum J. B.* *Quartum Clusii Ger.* *Ladanifera Cretica vera Park.* *Eisten Rößlein.* Ex foliis hujus plantæ in *Insula Creta* exudat *Resina* illa odorata *Laudanum* & *Labdanum* in *Officinis nostris* dicta, quæ in *Catalogo simplicium* nescio quo casu omissa est. *Laudatur* odoratum, odore valido sed suavi, inflammabile, accensumque gratum odorem halans, pingue, faciliè mollescens,



scens, friabile, colore ex purpureo fusco. *Vires.* Emollit, digerit, maturat, attenuat, orificia venarum referat, inspissat. *Ufus præcip.* in capite humido ac catarrhoso, in Dysenteria, &c. *Extrinsècus* ejus usus est in Emplastris emollientibus, Anodynis, Tussim sedantibus, in Alopecia, in Odontalgia, in Cardialgia, doloreque ventriculi, in suffocatione Uteri, cicatrices curat. *Schrod.* Vide plura apud *Bellonium* in *Itinerario*; & *Jobannem Baubinum* in *Historiâ Universali*.

#### IV. De Hyperico.

**N**otæ sunt, flores flavi staminibus multis cum stylo triplici: vasculum seminale è tribus partibus compositum; coma attritu sanguineum succum reddens. *R. Synop.* p. 142.

*Hypericum Offic. Ger. Vulgare C. B. Park. Vulgare* sive *Perforata* caule rotundo, foliis glabris *J. B. G. Johannis Kraut.* In dumetis & ad sepes. Julio floret. In *Ussu* sunt, Herba, Flores, Semen. *Vires.* Est partium tenuium, Diureticum ac Vulnerarium, *Ufus præcipui* in Vulneribus munificandis, consolidandis, in Sanguine coagulato resolvendo, in calculo renum atterendo, in Lumbricis fugandis. *Extrinsècus* in contusionibus, (præcipuè Nervorum) in Tremore, in vulneribus. *Tinctura* florum in Maniâ.

#### V. De Lysimachia.

**H**ujus notæ sunt, capsula bivalves, flores lutei, folia Salicis oblonga, ad genicula interdum terna aut quaterna. *R. Synop.* p. 144.

*Lyfimachia* Offic. lutea Ger. J. B. Lutea major, quæ *Dioscoridis* C. B. Lutea major vulgaris Park. Gelb Wïderich. Ad rivos. Junio floret. *Ussu* est herba. Offic. *Vulneraria* est, sed in *Ussu* rarò occurrit.

## V. De *Anagallide*.

**N**Ote sunt, folia ex adverso bina, subtus maculosa, Flores in singulis foliorum alis singuli, pediculis longis, tenuibus, bærentes petalis ad unguës jundis, adeo ut flores integri decidunt: Vascula seminalia per maturitatem transversim seu horizontaliter dissiliunt. R. Synop. p. 145.

1. *Anagallis terrestris mas* Offic. mas Ger. Flore phœniceo C. B. Park. Phœnicea mas J. B. Rohter Gauchheil/ Vogel Kraut. In arvis. Junio floret. *Ussus* est Herbæ. Vires. Alexipharmaca ac Pulmonica est, moderatè calida & sicca; unde & pro *Vulneraria* habetur.

2. *Anagallis terrestris fœmina* Offic. fœmina Ger. Cœruleo flore C. B. Park. Cœrulea fœmina J. B. Blau Gauchheil. In arvis sed rarius. *Ussus* est Herbæ; & Viribus cum priore convenit.

## VII. De *Alsine*.

**N**Ote sunt, Folia conjugatim in caule sita, calyx ad modum floris in plura segmenta, seu folia expansus; vascula seminalia, simplicia, unica intus cavitate, seminibus medium occupantibus, exterius protegente vasculo. R. Synop. p. 145.

*Alsine* Offic. minor Park. Media C. B. Minor

nor sive media Ger. Vulgaris sive Morfus Gal-  
linæ J. B. Günerdarm/ Myre/ Vogelkraut. *Vires.*  
Refrigerat & humectat, easdem vires obtinet  
quas Parietaria, præterquam quòd non astrin-  
gat: insigniter nutrire creditur, unde Atro-  
phia, Phthisique laborantibus esca salutaris  
æstimatur. Schrod.

*Herbæ pentapetalæ foliis in caule alter-  
no, aut nullo ordine positis.*

### VIII. De Portulaca.

**N**Otæ sunt, vasculum simplex, seu non divisum in  
loculamenta, quod per maturitatem horizontali-  
ter rumpitur, flos flavus, calyce bivalvi inclusus,  
folia crassa, succulenta, levia, extremis rotunda. R.  
H. p. 1038.

Portulaca Offic. domestica Ger. Hortensis  
Park. Latifolia sive sativa C. B. Hortensis lati-  
folia J. B. Burkel-Kraut/Portulack. In hortis  
feritur. Julio floret. In usu sunt, Herba, & Se-  
mina pusilla, pulla. Inter semina quatuor fri-  
gida minora numerantur. *Vires.* Refrigerat, sic-  
cat, adstringit, Lumbricos fugat & expellit.  
Usus præcip. in mitigando fervore bilis, & hinc  
in Febribus putridis & malignis, ardore Urinæ  
& Scorbuto prodest. Schrod.

### IX. De Sedo.

**N**Otæ sunt, Folia angusta, crassa & succulenta non  
dentata aut serrata, vascula seminalia bicornia.  
R. Syn. p. 150.



*Sedum minus* *Offic.* minus *Officinarum* *Ger.*  
*Minus teretifolium album* *C. B.* *Minus folio*  
*longiusculo tereti, flore albo* *J. B.* *Vermicula-*  
*ris flore albo* *Park.* *Klein Hausmark.* In muris  
& tectis. Junio floret. *Ufus* est *Herba.* *Vires.*  
Nullam acrimoniam habet, ergo cum *Semper-*  
*vivo* majori viribus convenit.

### *X. De Cotyledone.*

*F*oliis latis subrotundis, crenatis, vasculo seminali  
bicorni, radice granulosa à reliquis differt.

*Saxifraga alba* *Offic.* *Ger.* *Alba* vulgaris *Park.*  
*Rotundifolia alba* *C. B.* *Alba radice granulosa*  
*J. B.* *Sedum foliis subrotundis, crenatis, radi-*  
*ce granulosa, Saxifraga alba dictum* *R. Synop.*  
*Sanicula radice granulosa, flore albo* *Herm. Cat.*  
*Weisser Steinbrech.* In arenosis pascuis. Aprili  
floret. In usu sunt *Herba, Semen.* *Vires.* Cale-  
facit & siccatur evidentissimè, diuretica est, aper-  
rit. *Ufus præcip.* in Sabulo ac Calculo Re-  
num ac Vesicæ expellendo, in Mensibus ob-  
structis.

### *XI. De Radice Ninzin dicta.*

*F*oliis longis, angustis, acuminatis, alternatim dispo-  
sitis, floribus albis pentapetalis, radice *Scorzonerae*  
simili à reliquis hujus generis differt.

*Ninzin* & *Ginseng* *Offic.* *P. P. Tab.* 101. *N. 7.*  
*Ginseng* & *Gensing* quibusdam *R. H.* p. 1338.  
*Ginseng Cleyeri.* *Radix Ninzin* *Pis. Mant. Arom.*  
In regno Japonico crescit. *Usu.* *Radix oblonga,*  
*digiti minimi crassitie, & plurimum ramosa, in-*  
*tus exalbida, foris fusca, saporis subacris & sub-*  
*amari-*

amaricantis, odoris aromatici: rarò in Officinis nostris Invenitur. *Vires.* Temperatissima est, & propterea cum Sanguine nostro analogiam quandam habere videtur; laudatur ad memoriam confortandam, & in Convulsione, Lipothymia, Vertigine, Colica convulsiva, &c. Venerem quoque excitare dicitur.

## XII. De Viola.

**N**Ote sunt, Flos pentapetalos, difformis, calcari donatus; vasculum seminale ternis loculamentis distinctum. R. Synop. p. 152.

1. Viola Martia *Offic.* Martia purpurea J. B. Ger. Martia purpurea, flore simplici odorato C. B. Simplex Martia Park. P. Blaue Merckz Biolen. Ad sepes & in aggeribus fossarum. Martio floret. In usu sunt Folia, Flores & Semen. *Vires.* Flos recens refrigerat, humectat, emollit, laxat. Usus præcipuè in fervore febrium compescendo, doloreque capitis inde nato, in Tussi, asperitate Gutturis & Pleuritide. Semen insigne est Lithontripticon. R. H. p. 1050.

2. Viola tricolor *Offic.* Ger. Tricolor major & vulgaris Park. Tricolor hortensis repens C. B. Jacea tricolor sive Trinitatis flos J. B. Freissam/ Drensfaltigkeit Blumen/ Sieben Frauen-Blumen/ Stieffnutter. In hortis. Majo floret. Usus est Herbaræ. *Vires.* Easdem habet vires cum præcedente.

## XIII. De Gossypio.

**V**asculo seminali in terna loculamenta diviso, & molliissima lanugine candida seminibus intermixto, aut adharente, repleto ab aliis differt.

*Bombax Offic. Gossypium sive Xylon Ger. Frutescens annum Park. Frutescens semine nigro C.B. Xylon sive Gossypium herbaceum J.B. Baumwollen Baum. In Insula Melita & alibi. In Usu sunt, Semina nigra, rotunda. Vires. Pulmonarium est, Tussientibus & Asthmaticis maxime proficuum; auget Semen. Schrod.*

#### *XIV. De Geranio.*

*Vasculo pentacocco, rostrato, ab aliis differt. R. Synop. p. 154.*

2. *Geranium moschatum Offic. Ger. Park. Cicutæ folio moschatum C.B. Moschatum folio ad Myrrhidem accedente majus J.B. Storchen-Schnabel / Schnabel Kraut. In arvis rarius, in hortis frequens. Junio floret. Usus est Herbæ. Vires. Vulneraria est insignis.*

2. *Geranium Robertianum & Gratia Dei Offic. Robertianum Ger. C.B. Robertianum vulgare Park. Robertianum murale J.B. Robertianum flore dilutè rubello H.Ox. S. Rupperß Kraut / Gottes Gnad. Ad sepes ubique. Majore floret. Usus est Herbæ. Vires. Moderatè siccatur, subastringit, extergit, Sanguinem coagulatum resolvit, Vulneribus convenit. Schrod.*

3. *Geranium Columbinum & Pes columbinus Offic. Columbinum Ger. Columbinum vulgare Park. Folio Malvæ rotundo C.B. Folio malvæ rotundo majus H.Ox. Folio rotundo multum serrato, sive Columbinum J.B. Eaubensuß. Ad sepes. Junio floret. Usus est Herbæ. Vires. Vulneraria est.*



'XV. De *Alcea Indica*.

**N**Otæ sunt, Flos amplius pentapetalos; vasculum seminale majusculum, in quinque loculamenta divisum, seminibus intus reniformibus.

1. *Bamia Moschata* Offic. *Alcea* sive *Bamia Moschata* *Ægyptiaca* Breyn. P. I. *Ægyptia Moschata* Park. *Ægyptiaca villosa* C. B. *Belmoschus* *Ægyptia* Honorio Bello J. B. *Althea* *Ægyptia villosa* H. Ox. Abel Mosch vulgò *Herm. Cat. Musfus* Gaat. In *Ægypto* crescit. *Ussu*. Semina fusca, reniformia, odoratissima, seu Moschum redolentia. *Vires*. Leviter exiccatis pulverem Caovæ admiscunt *Ægyptii*, ut roborandi capitis, ventriculi, cordisque, majorem acquirerent efficaciam. Apud nos in suffimentis recipiuntur.

2. *Bangue* Offic. Park. Cannabi similis J. B. Cannabi similis exotica C. B. *Alcea Indica* Cannabino folio, Acetosæ sapore quibusdam. *Kalengi-Cansjava* H. M. Tom. X. *Tsyeru cansjava ejusd.* In *Insula Zeilania* succrevit. *Ussu*. Fragmenta foliorum cum pediculis suis, & Semina splendentia cinerei coloris, magnitudine & forma Cannabis seminum, *Vires*. Infatuat ut Opium, somnum conciliat, multi autem affirmant, ad libidinem ciendam, & Venerem stimulandam magnæ esse efficacis. Verum enimvero nostrâ sententiâ, perniciofa est planta, & non sine periculo sumenda.

Sunt qui *Bangue Cannabis* speciem esse affirmant; eruditissimus autem D. Paulus Herman-

*mus, M. D.* qui diu vixit apud Indos Orientales  
*Alceæ Indicæ speciem facit.*

Postquam hæc scripseram, (Caput autem de  
Cannabe impressum erat) à doctissimo viro  
*D. Tancredo Robinson, M. D.* certior factus sum  
*Bangue* herbam Cannabis genuinam speciem  
esse; unde didici me, quod dolet, alieno eam in  
loco posuisse. Qui plura desiderat de hac In-  
dicâ Cannabe, adeat Tomum decimum *Hort.*  
*Malab.*

## *XVI. De Nigella.*

*F*oliis tenuiter dissectis, flore magno, conceptaculo iti-  
dem seminis magno, membranaceo, in quinque locula-  
menta diviso, singulis loculamentis summa parte cor-  
niculatis, à reliquis differt. *R. H. p. 1070.*

*Nigella* & *Gith Offic.* flore minore simplici,  
candido *C. B.* *Romana* sive *Sativa Park. Me-*  
*lanthium Ger.* Calyce & flore minore, semine  
nigro *J. B.* *Schwarzer Coriander / schwarzer*  
*Rümmel.* In hortis seritur. Julio floret. In  
Uso sunt Semina nigra, rugosa, angulosa, saporis  
subacris, nonnihil oleosi. *Vires.* Attenuat, ape-  
rit. Usus præcip. in mucilagine Pulmonum re-  
solvenda, & expectoranda, lacte augendo, Uri-  
na ac Mensibus ciendis, morsibus venenatis  
corrigendis. Specificè in Febribus quartanis  
ac quotidianis, &c.

## *XVII. De Lino,*

*N*otæ sunt, Vascula seminalia subrotunda, in decem  
loculamenta totidem semina continentia, dissipitata,  
*emina melina, flores caduci.* *R. H. p. 1072.*

*Linum Offic. J. B. Sativum C. B. Ger. Park. Glachs.* In arvis feritur. In *Ufu* sunt Semina. *Vires.* Digerit, emollit maturat. *Ufus* præcip. in Tussi, Pleurisi, Phthisi. Extrinsicus maturat tumores, lenit dolores, foetum expellit. *Schrod.*

## XVIII. De Rhabarbaro.

**N**Ote sunt, Folia longa lanuginosa, flores pentapetalis, ampli, radices crassæ, vi purgatrice præditæ.

Rhabarbarum *Offic. J. B. Ger. Officinarum C. B. Genuinum Officinarum Park. Lanuginosum, sive Lapathum Chinense longifolium Munting. Rhubarber.* Duplex venale prostat: unum Orientale, ex regno Chinensi adfertur, quod ponderosum est, aureis ac rufis venulis præditum, amaricans, & adstringens, odoratum, flavo magis colore, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat, præstantioribus viribus insignitum: alterum ex Moscovia, quod ponderosius est, ac obscurius flavescit, & vilius censetur, *Vires.* Purgat benignè bilem flavam, pituitamque viscosam, ac tartaream in Ventriculo, primaque regione stabulantem. Epatis specificè confert, curat lèterum, & quia vim quoque adstrictoriam obtinet, in omnibus morbis dissolutis, Dysenteria, Diarrhœa, &c. præ aliis commendatur. Vide *Tilingii Rhabarbarologiam.*



*Herba Pentapetaloides vasculifera.*XIX. De *Primula* & *Paralyfi*.

**N**Ota sunt, Caules foliis nudi, flores è tubo longo in folia seu potiùs laciniis quinque bifidas expansis, eorumque calyces oblongi, concavi, laxi, striati: Folia rugosa, molliora, minus crassa seu spissa. R. Syn. pag. 158.

1. *Primula veris* Offic. *veris minor* Ger. *Veris vulgaris* Park. *Veris*, floribus ex singularibus pediculis, majoribus, simplicibus J.B. *Veris*, sive *Verbasculum sylvaticum majus*, singularibus floribus singularibus cauliculis insistentibus *Herm. Cat.* *Verbasculum sylvarum majus*, singulari flore C.B. *Sylvestre majus*, singularibus floribus singularibus cauliculis insistentibus *H. Ox. Himmelsschlüssel-Blumen.* In Sylvis & sepibus. Vere floret. In *Ufu* sunt, Folia, Flores. *Vires.* Calida est & sicca. Ufu efficaci pollet ad medendum Melancholicis & pituitosis affectibus.

2. *Paralyfis* Offic. *Vulgaris pratensis flore flavo*, simplici odorato *Park. P.* *Primula veris major* Ger. *Veris odorata flore luteo simplici* J.B. *Veris* sive *Verbasculum pratense odoratum* *Herm. Cat.* *Verbasculum pratense odoratum* C.B. In pascuis. Aprili floret. In *Ufu* sunt, Herba, Flores, *Vires.* Calefacit & siccat, saporis est subacris ac subamari, subastringit, anodyna est. Ufus præcip. in affectibus capitis, Apoplexia, *Paralyfi*. In articulorum doloribus, Arthritide, &c.

## XX. De Asclepiade.

**S**ucco limpidō, siliquis singularibus Ciconia rostrum referentibus ab aliis differt. R. H. p. 1090.

Asclepias, Vincetoxicum, & Hirundinaria Offic. flore albo Ger. Park. C. B. Sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus J. B. Schwalben-Burzel. In hortis. Julio floret. Usus est Radicis. Vires. Alexipharmaca ac Sudorifica est insignis. Usus præcip. in Peste, aliisque venenosis affectibus, in obstructionibus Mensium, in Palpitatione Cordis ac Lypothymia, in Hydrope, &c. Schrod.

## XXI. De Vinca Pervinca.

**N**ota sunt, sarmenta longa, repentia; folia glabra colore & consistentiâ Hederaceorum; Flores ampli; siliquæ ad singulos flores geminae, non lanigerae, R. Synops. p. 159.

Vinca pervinca Offic. minor Ger. Vulgaris Park. Clematis Daphnoides minor C. B. J. B. Ingrün / Singrün. Ad sepes. Majo floret. Usus est Herbæ. Vires. Vulneraria est insignis. Usus præcip. in fluxionibus alvi, Dysenteria, Hæmorrhoidibus, eruptione Sanguinis, Hæmorrhagia narium, profluvio Mensium, ac vulneribus seroso liquore manantibus. Schrod.

## XXII. De Centaurio Minore.

**N**ota sunt, flores Splendidi, purpurei, è tubo oblongo in quinque segmenta acuta expansi, in summis caulibus crebri, umbellam mentientes, semina minutissima, amaror insignis. R. Synop. p. 159.

*Centaurium minus Offic. C. B. Parvum Ger.* Minus vulgare *Park.* Minus flore purpureo *J. B.* Minus rubrum *H. Ox.* Fieber- oder Tausendsgulden-Kraut. In pascuis siccioribus. Julio floret. *Ufus* est *Herbæ* cum floribus. *Vires.* Spleneticum & Epaticum est. Calefacit & siccatur, amarum est citra mordacitatem, unde & leniter astringens, extergens, aperiens, vulnerarium, biliosos & pituitosos humores quàm lenissimè per alvum educit, serum per poros discutit. Hinc utile in Febris, Ictero, Menstruis suppressis, Scorbuto, Arthritide, Lumbricis, & specificè in morsu canis rabidi.

### XXIII. De *Verbasco.*

*Notæ sunt, folia in caulibus alterno ordine sita; flores in thyrsis oblongis conferti; Capsula bivalves conice aut turbinatæ. R. Synop. p. 160.*

*Verbascum* & *Tapus barbatus Offic. mas, latifolium luteum C. B.* Vulgare, flore luteo magno, folio maximo *J. B.* Foliis incanis mas latifolium, floribus luteis arctè caulibus adherentibus sine foliis angustis inter flores emanantibus *H. Ox.* Album vulgare, sive *Tapus barbatus communis Park.* *Tapus barbatus Ger. Königsferke / Wollkraut.* In aggeribus fossarum. Julio floret. In *Ufu* sunt, Folia, Flores. *Vires.* Emollit, discutit, dolores lenit. *Ufus præcip.* in morbis Pectoris, Tussi, expuitione sanguinolenta, torminibus ventris, *Schrod.*



XXIV. *De Lujula.*

**F**oliis in eodem pediculo ternis, flore pentapetaloides, sapore acido, vasculo seminali pentagono, quod per maturitatem levi tactu diffiliens cum impetu semina ejaculatur, ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 161.

Acetosella & Lujula Offic. Trifolium acetosum vulgare C. B. Park. Oxys alba Ger. Sive Trifolium acidum flore albo & purpurascens J. B. Acetosella vulgò Herm. Cat. Buchampffer / Gaurflee. In opacis frequens. Aprili floret. Usus est Herbæ. Vires. Ut sapore ita & viribus cum Acetosa convenit, ideoque æstum febrilem mitigat, sitim sedat, & Ventriculi ardores; Jecur refrigerat & Corroborat. R. Hist. p. 1098.

XXV. *De Trifolio paludoso.*

**F**oliis formâ & magnitudine sabaceorum, tribus in eodem pediculo floribus in thyrsos speciosis, interioribus candidis filamentis crispis pubescentibus, locoq; natali ab aliis distinguitur. R. Synop. p. 161

Trifolium aquaticum Offic. palustre C. B. J. B. Paludosum Ger. Park. Fibrinum Tabernemontani & Germanorum R. Hist. p. 1099. Synop. Biberflee / Lungenflee. In palustribus & aquosis. Majo floret. Usus. Herba. Vires. Nonnulli ad morbum articulare, alii ad Scorbuticos affectus, ad Febres intermittentes & Catarrhos eum commendant, & in Hydropicis affectibus valdè proficuum fore existimant. R. Synop. p. 310.

## XXVI. De Nummularia.

**A** Foliorum figura rotunda nammi æmula dicta, flagellis reptatricibus, floribus è foliorum alis exeuntibus, locoque natali in aquosis, se manifestat. R. Synop. p. 161.

Nummularia Offic. Ger. Vulgaris Park. Major lutea C. B. Major flore luteo H. Ox. Sive Centimorbia J. B. Pfenning-Kraut. In aquosis. Major floret. Usus est Herbæ. Vires. Refrigerat, siccatur, & subastringit, vulneraria est. Usus præcip. in Pulmonum exulceratione, Venis ruptis, Tussi sicca infantum: in fluxu cujuscunque generis, Diarrhœa, Dysenteria, Hæmoptysi. Commendatur in Scorbuto, Herniisque omnis generis. Schrod.

## XXVII. De Rorella.

**F**oliis setis seu ciliis rubentibus, circumquaque fimbriatis, quibus guttula velut roris adhærescunt, cauliculis nudis, locoque natali in aquosis ab aliis discriminatur. R. Synop. p. 161.

Ros solis Offic. folio rotundo Ger. C. B. Park. J. B. Sindow/Sonnen-Dau. In humidis palustribus. Junio floret. Usus est Herbæ. Vires. De viribus hujus plantulæ non convenit inter Botanicos: Sunt qui ad Phthisin & ad Pestem eam commendant: alii, nec sineratione, quoniam caustica est, usum ejus internum vetant. R. H. p. 1100.

## XXVIII. De Nymphæa.

**N**Ote sunt, folia subrotunda, in summis aquis fluitantia. R. Synop. p. 207.

1. Nymphæa alba Offic. Ger. J. B. Alba major C. B. Alba major vulgaris Park. Aguape Pison. Weiße See-Blumen/ Wasser-Lilien. In fluviis. Julio floret. In Usu sunt Radix, Folia, Flores. Vires.. Radix refrigerat & siccatur. Folia & Flores refrigerant & humectant. Singularis sunt usus præcip. ad Fluxum alvi, ad Pollutionem nocturnam, feminis acrimoniam, Sanguinis æstum & tenuitatem, &c. Schrod.

2. Nymphæa lutea Offic. Ger. J. B. Major lutea C. B. Park. Gelbe Wasser-Lilien. In fluviis frequens. Julio floret. In Usu sunt Radix, Folia, Flores. Vires. Cum priore viribus convenit.

## SECTIO VIGESIMA PRIMA.

## De Herbis radicibus bulbosis.

**R**adicem bulbosam voco, quæ unico constat tubere seu capite, fibras plurimas ex ima sede seu basi emittente. R. Meth. p. 151.



Herbæ radice bulbosa sunt, vel radice

Squamosa, caule multis foliis cincto, florum petalis  
rectioribus, floribus etiam ipsis erectis; *Lilium Album*

Tunicata, odore

Gravi, flosculis multis è summo caulis fastigio ena-  
tis, & in Umbella aut Corymbum diffusis; foliis

Fistulosis, capitulis non proliferis, grandibus,  
esculentis, major & elatior, caule in ventrem  
utrinque turbinatum intumesciente; *Cepa.*

Solidis & planis, longis, gramineis, bulbo

E multis nucleis seu spicis composito, odore  
graviore, caule recto, sativâ; *Allium,*

Simplici, non composito ex nucleis, floribus  
minus speciosis, elatior & major, radice an-  
gusta, odore mitiore, flosculis plurimis in  
sphæram conglobatis; *Porrum.*

Nulla aut minus gravi, floribus hexapetalis, nudis,  
fructus seu vasculi seminalis ex basi cohærenti-  
bus, caulibus aphyllis; floribus in singulis cauli-  
bus pluribus,

Maritima, bulbo grandi, floribus folia antever-  
tentibus; *Scilla.*

Mediterranea, staminulis florum tenuibus, flo-  
rum petalis unicoloribus; *Hyacinthus.*

Solida; floribus in singulis caulibus singulis, folia  
antevertentibus, ab ipsa radice ortis, erectis.

Major foliis latis Autumno florens: *Colchicum.*

Minor foliis angustis gramineis: *Crocus.*

## I. De Lilio.

**F**loribus erectis & eorundem petalis non reflexis ab  
aliis hujus generis differt.

*Lilium album* Offic. Ger. Album vulgare J. B.  
Park. Album flore erecto & vulgare C. B. Album  
vulgare & odoratum flore erecto H. Ox. Weiße  
Lilien. In hortis frequens. Junio floret. In *Ussu*  
sunt, Radix, flores. *Vires*, Flores moderatè  
Cale.

calefaciunt & humectant, partium sunt diversarum, & anodynæ, digerunt, maturant. Radix emollit, maturat. Usus externus in Tumoribus maturandis & leniendis, in clavis pedum tollendis, in pudendis parturientium emolliendis, in ambustis emendandis. V. plura apud *Tiltingum in Histor. Lili.*

## II. De Cēpa.

**N**Otæ sunt, folia fistulosa, radices magnitudine insignes non proliferae, caulis in ventrem utrinque turbinatum intumescens.

Cēpa Offic. vulgaris C.B. Alba & rubra Ger. Park. Rubra & alba, rotunda & longa J.B. Zwiebel/ Zipollen. In hortis seruntur, Julio florent. In *Uso* sunt, Radices, Semina. *Vires.* Calidæ sunt, partium crassarum, adeoque flatulentæ. Utiles sunt iis qui frigidis & viscidis abundant humoribus. R. H. p. 1116.

## III. De Moly.

**F**Loribus speciosis ab *Allio* differt.

Victorialis Offic. Schrod. Allium montanum latifolium maculatum C.B. Latifolium sive Victorialis Ger. Anguinum Park. Alpinum J.B. Siegmurk / alii Sieben-Hausen / Pastores montani Lanbruch appellant, referente *Clusio*. In alpidibus. Junio floret. *Uso.* Radix. *Vires.* Calefacit & siccant, perinde ac Allium agreste, cui & in facultatibus aliis per omnia similis existit. Schrod.

## IV. De Allio.

**N**Otae sunt, bulbus è multis nucleis, seu spicis compositus, odor gravis vehementior, caulis rectus singularis. R. H. p. 1125.

Allium Offic. Ger. Park. Sativum C. B. H. Ox. Vulgare & Sativum J. B. Knoblauch. In hortis. Junio floret. *Uusus est Radicis. Vires.* Calefacit & siccatur, incidit, aperit, discutit, alexipharmacum est. *Uusus præcipuus internus & externus in Colica flatulenta, Lumbricis, Peste, Tussi, Calculo, Scabie, Urinæ obstructione, Hydropo, &c.*

## V. De Porro.

**N**Otae sunt, radix angusta, florum Corymbi magni, seu fasciculi plurimi in capitulum sphericum grande conglobati. R. A. p. 1126.

Porrum Offic. Park. J. B. Capitatum Ger. Commune capitatum C. B.lauch. In hortis. Julio floret. In *Uusu.* sunt, Radices, Folia, Semina, *Vires.* Calefacit insigniter, siccaturque, attenuat, aperit, incidit, resolvit. *Uusus præcip. in Serpentum moribus, & unctionibus, mucilagine Pulmonum. Semen, urinam ciet. Schrod.*

## VI. De Hyacintho.

**S**Picam florum nudam, seu nullo perianthio involutam producit: Florum staminibus tenuibus & angustis, petalis puris seu unicoloribus ab aliis differt. R. Synop. 167.

Hyacinthus Offic. Angelicus Ger. Park. J. B. Oblongo flore cœruleus major C. B. Hyacinten. In sylvis & dumetis. Aprili floret. *Uusus est Radicis Vires.* Sistit alvum & Urinam ducit pota. Morbum regium depurgat Galen. VII.



## VII. De Scylla.

**F**loribus folia antevertentibus, bulbo grandi, & loco natali ab omnibus hujus generis differt.

Scylla Offic. Scilla vulgaris radice rubra C. B. Rubra magna vulgaris J. B. Rubra, sive Pancratium verum Park. Pancratium Clusii Ger. Meerzwiebel. Floret Septembri. In Usu est Radix, ex Hispania ad nos delata. Vires. Saporis acris & amari est, attenuat, aperit, discutit, Diuretica est. Usus præcip. in obstructione Epatis, Lienis, Meatus biliarii, Mensium, Urinæ; In mucilagine Pulmonum, Tussi, &c. Schrod.

## VIII. De Croco.

**N**otæ sunt, flores nudi, erecti, ab ipsa statim radice orti, absque pediculis herbaceis; folia angusta, graminea, linea in medio alba secundum longitudinem decurrente, R. Synop. p. 167.

Crocus Offic. Ger. J. B. sativus C. B. Verus sativus Autumnalis Park. P. Autumnalis sativus H. Ox. Saffran. In Anglia & Hispania seritur. Septembri floret. Usu. Stamina florum. Eliguntur aurei coloris, saporis subacris & subamari & pinguis, odoris fragrantissimi. Vires. Cordialis est ac Pulmonicus, Uterinus, aperit, digerit, emollit, anodynus est, Somnum conciliat, Menses ac foetum pellit. Usus ejus frequens in Syncope, in Apoplexia, in Hysteriis affectibus, in Ictero, in Peste, aliisque venenosis morbis Schröd. V. plura in Hertodtii Crocologia.

IX. De

IX. De *Hermodaëtulo*.

**H**ermodaëtulus *Offic. Park. Officinarum Ger.*  
*Colchicum radice siccata alba C. B. Hermodactel Wurzel. Ufu.* Radix oblonga, tuberosa, compressa, albida, saporis subdulcis. Probatur candidus, corpulentus, plenus, gravis, compactus, qui leni contusione in pulverem facile redigitur. Ex Syria ad nos transportatur. *Vires.* Pituitam crassam, lentam aliosque humores viscidos, peculiariter à juncturis, efficaciter trahit, ob id articulorum affectibus, Chiragræ, Podagræ, &c. conducit. *Schrod.*

An Colchici radix sit Hermodaëtulus *Officinarum* non ausim determinare, inter Authores enim controvertitur, aliis id affirmantibus, aliis negantibus. Quin & Botanicis qui Colchicum esse negant, quid sit hæc radix inter se minimè convenit; alii enim Dentis canini, alii Iridis tuberosæ, alii Cyclaminis speciem esse autumant.

## SECTIO VIGESIMA SECUNDA.

*De Herbis bulbosis affinis.*

**H**erbas bulbosis affines voco, quæ cum hujus generis sint foliis, floribus, pericarpis aut radicibus Bulbosas imitantur. R. H. p. 1179.

Herba.

Herbæ Bulbosæ affines dividi possunt vel à

{ Numero petalorum in flore, in

{ Enneapetalas, folio gladii figuram referente, cum acie cauli obversa; *Iris*.

{ Hexapetalas, radicibus tuberosis aut crassis

{ Maximas, foliis crassis succulentis, ad margines aculeatis, radice succum crassum, flavum, insigniter amarum fundente; *Aloe*.

{ Minores, flore minore stellato, semine triquetro; *Asphodelus*.

{ Pentapetalas, florum petalis reflexis, ad ungues junctis, radice orbiculata; *Cyclamen*.

{ Tetrapetalas, radice tuberosa; *Curcuma*.

{ Monopetalas, flore sedi fructus cohærente, radice tuberosa, pistillo pro stylo in medio flore nudo, sapore acri, foliis

{ Laciniatis, caule pellis serpentini in modum maculato; *Dracontium*.

{ Integris major; *Arum*.

{ Figurâ floris galeatâ aut labiatâ quæ vel sunt

{ Aphyllæ, nullis neque à radice, neque in caulibus foliis virentibus; radicibus squamosis; *Hypocistis*.

{ Foliosæ, radicibus

{ Tuberosis, gemino tubere adhærente; *Orchis*.

{ Fibrosis, foliis planis virentibus, perpetuis; *Pyrola*.

## I. De Iride.

**N**ote sunt, flores enneapetali folia gladii figuram referentia, acie cauli obversa R. Synop. p. 168.

1. *Iris nostras* Offic. vulgaris Ger. *Purpurea* sive vulgaris Park. *Vulgaris Germanica* sive *sylvestris* C.B. *Vulgaris violacea* sive *purpurea sylvestris* J.B. *Blau Eügen*. In hortis frequens. *Majo* floret, *Ussu*, *Radix* recens. *Vires*, *Siccatur*, *valde*



valde hydragoga est, acerrhina Usus præcip. in Hydropicorum aqua educenda. Extrinsecus in impetiginibus, aliisque corporis maculis detergendis.

2. Iris Florentina, & Iris Illyrica *Offic.* Florentina *Ger.* Alba Florentina *C. B. Park.* Flore albo *J. B.* Florentinisch Weil Wurk. In hortis colitur. Majo floret. *Usu.* Radix oblonga, digitum crassa, paululum compressa, odoris fragrantis. *Vires.* Incidit, attenuat, expectorat, digerit, abstergit, emollit. Usus præcip. in mucilagine seu tartaro Pulmonum, Tussi, Asthmate, obstructione Mensium, torminibus ventris Infantum. Extrinsecus abstergit cutis maculas & lentigines, Oris foetorem emendat, *Schrod.*

3. Acorus adulterinus, Pseudoacorus, & Gladiolus luteus *Offic.* Adulterinus *C. B.* Palustris, sive Pseudoiris, & Iris lutea palustris *Park.* Iris lutea palustris *Ger.* Palustris lutea, sive Acorus adulterinus *J. B.* Gelbe Eilien. In palustribus. Majo floret. *Usu.* Radix. *Vire.* Exsiccatur, parum calefacit, attenuat, astringit, roborat, resolvit, vi peculiari ad nervosi generis & cerebri affectus commendatur, ut & ad Dysenteriam, aliosque fluxus alvi ac uteri sistendos. *Schrod.*

4. Spatula foetida *Offic.* foetida, plerisque Xyris *J. B.* Xyris *Ger.* Sive Spatula foetida *Park.* Vel Iris agria foetida *H. Ox.* Gladiolus foetidus *C. B.* Iris sylvestris, quam Xyrim vocant *Rt Synop.* Stinckende Schwertlilien. Ad  
X  
sepes

sepēs & in dumetis, sed rariùs. Junio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Exsiccatur. *Ufus* præcip. in Scrophulis, passione Hyſterica, Orthopnœa & Hypochondriacis affectibus.

## II. De Asphodelo.

*Nota sunt, radices multis tuberibus ex uno capite dependentibus constantes, flores stellati, semina triquetra.* R. H. p. 1191.

1. Asphodelus verus albus *Offic.* Ramosus *Ger.* Albus ramosus mas C. B. Major albus ramosus *Park.* Major ramosus flore albo J. B. Albus ramosus *H. Ox.* Weiſſe Affodillwurk. In hortis Botanicorum colitur. Julio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Urinam & Menſes ciet. *Dioscorid.*

2. Asphodelus verus luteus ☿ Hasta regia *Offic.* luteus *Ger.* J. B. Luteus & flore & radice C. B. Luteus minor ſive Haſtula regia *Park.* Folio fiſtuloſo, ſtriato non ramosus, luteus, & flore & radice *H. Ox.* Gelbe Affodillwurk. In hortis. Julio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Eisdem viribus cum priore pollet.

## III. De Aloe.

*Floribus hexapetalis, vasculis ſeminalibus in ternis loculamenta diviſis, ſoliis craſſis, ſucculentis ad margines aculeatis, à reliquis differt.*

Aloe vulgaris C. B. J. B. Vulgaris ſive Sempervivum marinum *Ger.* *Park.* Kadanacū vel Catevala *H. M.* Gemeiner Aloe. In hortis curioſorum. *Ufu*. Succus in ſpiſſatus. Genera ejus moderno tempore *Officinis* in *Ufu* ſunt quatuor,

tuor, quæ tamen non nisi puritate, impuritate, & loco vegetandi discrepant. Nam Aloes pars impurior arenosa; sordibus conspurcata, & idcirco nigricans; *Aloe Caballina* dicitur. Pars paulò purior, colorem hepatis referens; *Aloe Hepatica*. Purissima *Aloe*; *Succotrina* vocatur. Ex Insula Barbados adfertur quæ *Aloe Barbadiensis* nominatur. Hujus colligendi modum hodiernum D. *Raio* communicavit D. *Josua Palmer*, M.D. quam videtis in *Historia Plantarum* ejusdem D. *J. Raii*, p. 1196. Ex Insulis *Succotora* in India Orientali & Barbados in America ad nos adfertur. *Vires*. Vim præter purgantem obtinet & exiccantem, calefacientemque; Obstructiones aperit, Meatus referat, proritat Hæmorrhoides & Menfes; roborat Ventriculum, enecat & expellit Lumbricos, purgat autem biliosos & pituitosos humores. Vide plura in *Aloedariis Mindereri*, & *Muntingii*.

#### IV. De Arthanita.

*Nota sunt, radix orbiculata, caules præter floris pediculum nulli, flos pentapetalos, petalis reflexis & ad ungues junctis.* R. Hist. p. 1205.

Arthanita & Cyclamen Offic. Cyclamen orbiculato folio Ger. Orbiculato folio infernè purpurascense C. B. Autumnale vulgare folio rotundo Park. Cyclaminus folio rotundiore vulgatio J. B. Schwein-Brod / Sau-Brod / Erd-Äpfel / Wald-Ruben. In hortis curiosorum. Septembri floret. *Ussu*. Radix. *Vires*. Potenter incidit, aperit, abstergit, Errhinum est.



Uſus præcip. in obſtructis Menſibus, in pellen-  
do foetu mortuo, &c. *Schrod.* Internè cauto  
opus habet.

*V. De Curcuma, Cardamomo, Coſto,  
Galanga, Zedoaria, & Zinzibere.*

*NOTæ ſunt, Radix tuberoſa, folia lata, oblonga, al-  
ternatim poſita, flores tetrapetali, diſformes, vascu-  
la ſeminalia tricapsularia.*

1. *Curcuma Offic. Park. Officinarum Hort. Amſt.* Foliis longioribus & anguſtioribus *Breyn.*  
2. *Prod.* Sive *Terra merita Officinarum radice* crecea *J. B.* Radice longa *Herm. Cat.* *Cyperus Indicus* ſive *Curcuma Ger.* *Cyper* genus ex *India* & *Crocus Indicus C. B.* *Crocus Indicus, Arabibus Curcum, Officinis noſtris radix Curcuma dicta Bont. Manjella-Kua H. M. P. II. Gilbwurf/ Geelsucht; Wurz.* Ex *India Orientali* ad nos adfertur. *Uſu.* Radix oblonga, parva, tuberoſa, nodosa, intus crocei coloris, ſaporis ſubacris, ſubamaricantis, odoris non ingrati. Duæ ſunt ſpecies, Longa & Rotunda, quarum prior eſt *Officinalis.* *Vires.* Abſtergit, attenuat, aperit, diſcutit, Menſes movet, diſcultatem pariendi aufert, Obſtructiones viſcerum aperit, Urinam ciet, Calculum expellit. In *Ictero, Hydropo, Cachexia, &c.* Specificum eſt.

2. *Cardamomum majus Offic. Bont. majus vulgare Ger. Park. Majus Officinarum C. B. Jonſ. D. Groß Cardamomlein.* Ex *Java* ad nos defe-

deferuntur, sed rariùs in nostris Officinis inveniuntur, alii enim Grana Paradisi Officinis dicta seu Meleguetam non sine errore, alii Amomum verum Ger. horum loco substituunt. In *Ufu*. Theca seu siliquæ tricoccæ, oblongæ, digitali aliquando longitudine, semine anguloso, fusco, aromatico repletæ. *Vires*. Calefacit & siccatur, partes principes recreat, attenuat, flatu discutit, coctonem juvat, Urinas ciet, Menstrua movet, anhelitum commendat, obstructionibus Hepatis, Lienis & Mesenterii conducit.

3. Cardamomum minus *Offic. Bont. Jons. D.* Minus vulgare Ger. Park. Simpliciter in Officinis dictum C. B. Cum siliquis seu thecis longis & brevibus J. B. Elettari 2. H. M. Klein Cardamomlein. Ex Malabar, aliisque locis in India Orientali ad nos adferuntur. In *Ufu* sunt, Siliquæ breves, triangulæ, colore pallidæ, intus semina parva, angulosa, fusca, aromatica, continentes. *Vires*. Cum majore viribus convenit.

4. Amomum *Offic.* verum Ger. Genuinum Park. Racemosum C. B. Jons. D. Novum, Cardamoni vulgaris facie, sive Indicus racemus J. B. Elettari 1. H. M. P. XI. Ex India Orientali ad nos adfertur. In *Ufu* sunt Thecæ seu siliquæ rotundæ, tripartitæ, semina angulosa, & rugosa, nigra, aromatica, claudentes. *Vires*. Ut externa facie ita & viribus cum Cardamomis convenit. Pro Cardamomo majore Pharmacopolis nostris venditur. N. B. Adeò breves sunt & imperfectæ

apud veteres , præsertim Arabes, simplicium descriptiones, ut ad hodiernum usque diem, in tanta Botanicæ scientiæ, luce, quid Amomum Antiquorum sit, non pateſcat, Herbariis peritioribus in varias sententias distractis. *Cordus* Roſam Hierichuntinam vulgò dictam C. B. pro Amomo habet. *Quatramus*, teste *Parkinsono*, Rhoem myrtifoliam Belgicam C. B. *Anguillarius* Piper racemosum caudatum ex Guinea C. B. *Gesnerus* Solanum fruticosum bacciferum C. B. *Cluſius* Amomum spurium folioſum C. B. Cui ſimilem pro Amomo plantam ab *Ormuz* accepit *Valerandus Dourez*: eadem fortasſe fuerit quæ è Persia ad *Jacobum Golium* Linguarum Orientalium in Academia *Lugduno-Batava* Professorum miſſa eſt, & ſub titulo Amomi Arabum *Breyonii* in *Ephem. German. An. 3. Obſ. 291.* deſcripta. *Garcias ab Horto* qui in India Orientali diu vixit, *Pedis columbini* ſpeciem quandam illud eſſe ſupponit. Alii Amomum *Botryn* Ambroſiodem vulgarem C. B. eſſe volunt; Alii *Sison*, quod Amomum Officinis noſtris C. B. Qui error eoſque invaluit, ut Semen hujus plantæ à *Pharmacopolis* etiam *Londinenſibus* pro Amomo divendatur, & quod pejus eſt, à *Pharmacopœis* pro Amomo vero nobili illi compoſitioni *Theriace Andromachi* inferatur. Alii inſuper Piper oblongum nigrum C. B. Alii *Cubebas* vulgares C. B. Alii denique *Caryophyllum aromaticum* fructu rotundo ejuſdem C. B. Amomum verum Antiquorum eſſe exiſtimant, quorum ſententiæ à *Maroneo*



in erudito suo *de Amomo commentario* non immerito refutantur; in quo etiam solidè demonstrat verum & legitimum Amomum esse à se descriptum, & à nobis hoc in loco propositum; quod nostro etiam iudicio, si ipsissimum veterum Amomum non sit, ad illud tamen proximè accedit, & in omnibus compositionibus, in quibus Amomum præscribitur, potissimum usurpandum est.

5. Grana Paradisi *Offic.* Paradisi *Officinarum*  
*C. B.* Cardamomum maximum *Ger.* Melle-  
guetta *Jons.* *D.* Melligette sive Cardamomum  
maximum & Grana Paradisi *Park.* Paradis-  
Körner. Ex Guinea ad nos transportantur. *In*  
*usu sunt* Grana angulosa, extus spadicea, intus  
alba, sapore acri & fervido inter Cardamo-  
mum & Piper. Sunt qui pro Cardamomo ma-  
jore non sine errore substituunt. *Vires.* Vir-  
tutibus cum Pipere coincidunt. *Vis specifica*  
est in omnibus affectionibus Paralyticis.

6. Zingiber *Offic.* *Ger.* *C. B.* *J. B.* Orientale  
*Park.* Iris latifolia, tuberosa. Zingiber dicta  
flore albo *H. Ox.* Mangaratia *Pison.* Gingibil  
*Bont.* Chilli Indiæ Orientalis seu Zingiber fœ-  
mina *Hern.* Inschi vel Inschi-kua *H. M. P. II.*  
Zngber. Advehitur copiosum ex Calecut In-  
diæ Emporio. *Ufu.* Radix tuberosa, nodosa,  
ramosa, paululum compressa, pallida, sapo-  
ris acris, aromatici & fervidi, odoris fragran-  
tissimi. *Vires.* Calefacit potenter, sed non pri-  
mo statim occurso, adeoque partium est cras-  
siorum, aperit, incidit, attenuat. *Confert*

Ventriculo, Thoraci, aliisque visceribus, appetitum prostratum excitat, putredini ac malignitati humorum resistit. V. *Hofmannum in Schroderum, & Herman. in Catalog. Hort. Lugdun. Batav.*

7. Zedoaria longa *Offic. C.B. Park. Ceylanica* Camphoram redolens *Herm. Cat. P.B.P. Officinarum Hort. Amstel. Gedivar aut Geidvar. Ger. Langer Zittwer.* Ex India Orientali ad nos transfertur. *Ufu.* Radix, tuberosa est, nodosa, paululum compressa, foris cinerea, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Calefacit & siccatur, incidit, flatus discutit, Alexipharmaca est. *Ufus præcip.* in doloribus Colicis atque Ventriculi: animalium venenatorum moribus opitulatur, Lienteriam sistit, Vomitiones reprimit, Mentes ciet, Alvi tineas quascunque enecat. *Schrod.*

8. Zedoaria rotunda *Offic. C.B. Park. Malankua H. N. P. II. Runder Zittwer.* Cum priore crescit, sed In Officinis nostris rarò invenitur, N.P. Zedoaria longa & rotunda non aliter inter se differre nobis videntur, quàm quòd ejusdem radice partes sint diversæ,

9. Zerumbet *Offic. Garz.* sive Zedoaria rotunda *Ger. Zinziber latifolium sylvestre Herm. Cat. Hort. Amstel. P.B.P. Kua H. M. P. II.* In regno Malabar sponte oritur, sed in Officinis nostris non invenitur, præcedens enim cum ea confundunt. *Vires.* Cum Zedoaria longa viribus convenit. An hoc aroma sit Zerumbeth Arabum, an verò ab illo diversum difficile

cile nobis est determinare. Quippe non tantum in his, sed & innumeris aliis describendis tam breves & incerti reperiuntur Arabes, & quod maximum, inter se adeò dissidentes, ut non sine ratione dubitetur, an Arabibus accurata dictorum simplicium fuerit notitia.

10. *Costus Offic.* Tres sunt species Costi in Officinis quibusdam, viz. Arabicus, Amarus, & Dulcis; Hinc *Casparus Baubinus* & alii Botanici in quatuor aut plures species eum dividunt, rectè enim *Bontius* unam eandemque monet esse radicem, solùm loco, ætate, aut corruptione differentem; *Garcias ab Horto* quoque *Acosta* & *Clusius* unum duntaxat Costi genus esse credunt, recentem incorruptumque, dulcem esse & candidum, ubi autem corrumpi incipit vetustate amaritudinem contrahere, fierique nigricantem: quibus & nos consentimus, descriptio enim *Tsiana-Kua* in Horti Malabarici Tomo xi. (quæ secundum clarissimi illius viri *D. Joannis Commelini* in commentario suo sententiam, *Costus verus seu Arabicus* est) cum *Costo dulci Officinis nostris dicto* per omnia convenit; hæc ergo! Synonyma Costi sunt, *Costus Arabicus Dioscoridis C. B.* Iridem redolens ejusdem, *amarus Officinarum, seu Helenium, & Comagenium Dioscoridis ejusdem, dulcis Officinarum, Centaurio magno cognatus ejusdem, Helenii facie Officinarum J. B.* *Dulcis Officinarum ejusdem. Indicus odoratus Ger. Indicus Classi Park. Tsiana-Kua H. M. Tom. xi. Costwurk. Ex India*

X s

orien-



orientali ad nos transportatur. *Uſu.* Radix oblonga, craſſa, buxei coloris, cortice craſſo, pallido, ſaporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis ad Iridem Florentinam accedentis. Eligatur recens, denſus, odoratus, ſubamarus, non carioſus, ille, qui jam in Officinis ex uſu eſt, omnes optimi notas quas *Dioſcorides* aſcribit habens. *Vires.* Stomachicus, Epaticus, Uterinus, ac Nephriticus eſt; attenuat, aperit, diſcutit. Hinc convenit in Colica, obſtructis menſibus & Urina, Hydrope, Paralyſi. *Schrod.*

11. *Galanga major* *Offic. Ger. C. B. J. B. Park.* *Acorus Pharmacopolis, Groſſer Galgant.* In Java & Malabar ſponte oritur, unde ad nos adfertur. *Uſu.* Radix tuberoſa eſt, ad pollicem aut amplius craſſa, nodosa, & inæqualis, ſuperficie circulis quaſi geniculis notata, ſuſca, intus pallescens, ſaporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Stomachica eſt, Cephalica ac Uterina, incidit, aperit. Uſus in cruditate ac inflammatione Ventriculi, Vertigine, aliisque totius corporis affectibus à frigiditate ac flatulentia oriundis. *Schrod.*

12. *Galanga minor* *Offic. Ger. C. B. J. B. Park.* *Kleiner Galgant.* In China ſponte oritur. *Uſu.* Radix tuberoſa eſt, nodosa, & inæqualis ſuperficie, curculis quaſi geniculis notata, minimi digiti craſſitie, coloris ruſcentis, ſaporis & odoris fragrantis, jucundiorisque quàm in præcedente. *Vires.* Eiſdem viribus pollet,

let, sed hæc priori præfertur. Simili omnino fructificatione gaudent Bengala Indorum, Cardamomum majus & minus, Costus Arabicus, utraque Galanga, Zedoaria, Zerumbeth, Garzia, Zingiber, & proindè unà sub eodem genere summo merentur reponi; donantur sale oleoso volatili, partibus blandis viscosis immerso. V. pleniorum horum omnium Historiam in *Herman. Hort. Lugdun. Batav. & Hort. Malabar. Tom. XI.*

## *VI. De Aro, & Dracontio.*

*Nota sunt, pistillus in medio flore pro stylo nudus, flos monopetalos, sed fructui imo cobarens; pro fructu bacca multæ pulpæ humidæ semina ambiente, constantes; radix acerrimo sapore prædita. R. Synop. p. 169.*

1. *Dracontium Offic. majus Ger. Dracunculus major vulgaris J. B. Park. Polyphyllus C. B. Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule maculato, majus & elatius Herm. Cat. Schlangen-Kraut / Drachenswurk / Natterwurk. In hortis nutritur. Uss. Radix, Herba. Vires. Alexipharmaca ac Sudorifica est. Usus præcip. in Peste, Febribus malignis & ictibus Serpentinis & aliis venenatis.*

2. *Arum Offic. J. B. vulgare Ger. Vulgare maculatum, & non maculatum Park. Maculatum maculis candidis vel nigris, & non macu-*

maculatum C. B. Psaffenpint / Teutscher Jinger / Zehrwurk. Ad sepes & in umbrosis. *Ufu.* Radix. *Vires.* Calefacit & siccatur, Tartarum præcipuè primæ regionis, tum quoque Pectoris, & Pulmonum peculiariter incidit, resolvit, discutit. Proin usus ejus creber est in Cachexia, Asthmate, &c. Hernias curat, Urinam ciet, obstructions viscerum resolvit. *Schrod.* Aq. destillata ex foliis recens, specificum est in Mania & Melancholia.

## VII. De Satyrio.

**B**ulbo bino, fibrisque supra bulbos exeuntibus, & floribus labiatis à reliquis differt.

1. Satyrium mas *Offic.* Cynosorchis morio mas *Ger.* Orchis morio mas foliis maculatis C. B. *Park.* Major, tota purpurea, maculoso folio J. B. Stendelwurk / Knaben-Kraut. In pratis & dumetis. Major floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Calefacit & humectat, saporis dulcis, Usus præcip. ad virilem fortitudinem restaurandam. Sic & Uterum confortare creditur, & ad conceptionem disponere. *Schrod.*

2. Satyrium fœmina *Offic.* Cynosorchis morio fœmina *Ger.* Orchis morio fœmina C. B. *Park.* Minor purpurea, & aliorum colorum cum alis virentibus J. B. Cum priore nec minus frequens, sed tardior floret. *Vires.* Eisdem viribus pollet. N. B. Genera Satyriorum seu Orchidum passim quàm plurima nascuntur, quæ etsi promiscuè in usum accersi queant; atta-



attamen eliguntur Officinæ præ reliquis superio-  
rem.

## VIII. De Hypocisto.

*F*lorum viridium & herbaceorum carentiâ ab aliis  
plantis differt. R. Synop. p. 173.

Hypocistis Offic. C.B. J. B. Park. Orobanche  
quæ Hypocistis dicitur R. H. *Ufu*. Succus in-  
spissatus niger est & nonnihil resinofus, sapo-  
ris austeri, seu acidi & adstringentis. *Vires*.  
Refrigerat, siccatur, potentissimè astringit, con-  
densat. *Ufus præcip.* in quibuscunque fluxio-  
nibus sistendis. Diarrhœa, Dysenteria, Liente-  
ria, Profluvio Uteri, Vomitu, in excretionem  
Sanguinis, &c. Schrod.

## IX. De Pyrola.

*F*lorum spica & semine pulvisculi instar minutissimo,  
cum Orchidibus convenit, radicibus fibrosis, foliis,  
semper virentibus, Pyri figurâ ab eisdem differt. R.  
Synop. p. 176.

Pyrola Offic. J. B. Ger. Nostrâs vulgaris Park.  
Rotundifolia major C. B. Wintergrün. In mon-  
tosis & sylvosis. Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*.  
Refrigerat & siccatur, astringit, consolidat, Vul-  
neraria est, usu interno & externo celeberrima,  
Schrod.

## SECTIO VIGESIMA TERTIA.

*De Herbis Graminifoliis non Culmiferis, flore stamineo.*

**N**otæ sunt, Folia graminea, flores imperfecti seu staminei, caules vel sarcti vel enodes. R. Meth.

Herbæ graminifolix non culmiferæ, flore stamineo sunt vel folus

{ Teretibus, medullâ sarctis; *Juncus*.

{ Tenuioribus cum aliqua latitudine, ut superficies folii interna ab externa differat,

{ Graminis modo sitis, hoc est latitudine suâ cauli obversa; caule

{ Triquetro, floribus minus speciosis; *Cyperus*.

{ Tereti; floribus & seminibus in paniculis papposa lanugine obsitis; caulibus medullâ fungosâ sarctis, tota planta jucundi odoris; *Schoenanthus*.

{ Iridis modo sitis, hoc est acie folii cauli obversâ, odoratis flosculis, & seminibus in sulcum feti nucamentum coactis; *Calamus Aromaticus*.

I. *De Cypero.*

**N**otæ sunt, Folia graminea & flores staminei, caules triquetri. R. Synop. p. 194.

I. *Cyperus longus* Offic. Ger. Longus odoratus Park. Odoratus radice longa, sive *Cyperus Officinarum* C. B. Paniculâ sparsa speciosa J. B. Lange *Cypernourg*. In palustribus sed rarius. *Usu*. Radix, longa, tenuis, nodosa, & geniculata, contorta, foris subnigra, intus albicans, saporis suavis, subacris & aromatici, odoris fragrantis. *Vires*. Stomachica ac Uterina

rina est, Uſus præcipuus in Urina ac Menſibus ciendis, cruditate ventriculi conſumenda, Hydrope inchoata præſervanda, Colica ac Vertigine diſcutienda, intellectu roborando, Maſticata oris foetorem emendat, &c. *Schrod.*

2. *Cyperus rotundus Offic. rotundus Orientalis major C. B. Rotundus Syriacus Ger. Rotundus odoratus Syriacus Park. Syriacus & Creticus rotundior J. B. Runde Cypernwurk. Ex Ægypto ad nos transfertur. Uſu. Radix, rotunda, Olivæ magnitudinis ac figuræ, foris ruſa, ſcabra, intus alba, pluribus ex uno capite quaſi filis dependentibus, ſaporis & odoris fragrantis. Vires, Eiſdem viribus cum Longo convenit.*

3. *Nardus Indica & Spica Nardi Offic. Indica Ger. Indica vulgaris J. B. Indica ſive Spica Nardi Park. Indica, quæ Spica, Spica Nardi, & Spica Indica Officinarum C. B. Gramen cyperoides aromaticum Indicum Breyn. 2. Prod. Indianiſche Spicanarden. Uſu. Radix longa, fungoſa, digiti craſſitie, & longitudine comoſa, ex marcidorum foliorum nervis, aut nervoſis filamentis convoluta & congeſta, colore ex fuſco ruſeſcente, Saporis amari, acris, aromatici, odoris grati. Ex India orientali, Alexandria & aliunde ad nos transportatur. Eligenda recens. levis, longam comam habens, aliquantulum redolens Cyperum, ſapore amaro. Vires. Calefacit, ſiccatur, attenuat, astringit, Nephritica & Stomachica eſt. Uſus præcip, in Urina & Menſibus ciendis, in*  
*Venæ*



Ventriculi rosione, inflatione, in Ictero, &c. Schrod. Vermes necat. Vide plura apud Joannem Fabrum de Nardo adversus Josephum Scaligerum.

Papyrus Nilotica apud veteres Ægyptios, & Orientales magni & varii usus, Cyperis adjungi potest ob caulem triquetrum seu ensiformem; vide ejus Historiam & usum apud Guilandinum, Veslingium, &c.

## II. De Juncō.

**C**aulibus teretibus, fungosis, paniculâ ex latere caulis exeunte, & multis seminibus majusculis compositâ à reliquis differt. R. Hist. p. 1302.

Juncus vulgaris Offic. acutus Ger. Acutus vulgaris Park. Acutus paniculâ sparsa. C. B. Binsen / Schenelen. In pascuis & aquosis. Ufu. Integra planta. De usu ejus Medico nihil invenio inter Authores.

## III. De Schœnantho.

**C**aule tereti medulla fungosa fardo, seminibus in paniculis papposa lanugine obsitis à reliquis differt.

Schœnanthus & Juncus odoratus Offic. J. B. Schœnanthum Ger. Juncus odoratus aromaticus C. B. Odoratus tenuior Park. Gramen dactylon aromaticum, multiplici paniculâ, spicis brevibus tomento candicantibus ex eodem pediculo binis Plukenetii Phytogr. Tab. 190. Fig. 1. Cameelsheu / Cameelstroh. Affertur ex Arabia. Ufu. Culmus cum foliis, saporis acris, amaricantis, & suavis, odoris fragrantissimi. Vires. Calefacit, subastringit, tenuium est partium, discutit. Usus præcip. in obstructis

structis menſibus, Epate, Liene, in Ventriculi inflatione, vomitu ac ſingultu, in Urinæ difficultate, Renum, Veſicæ ac Uteri dolore, *Schrod.*

#### IV. De Acoro.

*A*corum ſpica quam proſert ſimplicem elegantem. Julii ſpecie, folia Iridis aromatica, odorata, ab aliis discriminant. R. Synop. p. 205.

Acorus verus ☿ Calamus aromaticus Offic. Verus ſive Calamus Officinarum Park. Verus ſive Calamus aromaticus Officinarum C. B. Verus, Officinis falſo Calamus Ger. Calamus aromaticus vulgaris, multis Acorum J. B. Kalmuß / Ulfermurr. In aquoſis ſed rarius. Julio julum producit. Uſu. Radix oblonga, nonnihil compreſſa, in ſuperficie geniculata, foris ex flavo rubeſcens, intus alba atque fungoſa, ſaporis acris & amaricantis, cum odore aromatico. Vires. Stomachicus eſt, Calefacit & ſiccatur, partium tenuium eſt, attenuat, aperit. Uſus præcipuus in Obſtructionibus Menſium, Lienis ac epatis, in dolore Colico, &c. *Schrod.* N. B. Plantam hanc non eſſe verum Calamum odoratum Antiquorum, ſed Acorum verum Dioſcoridis Botanici eruditiores conſentiunt. Calamus Aromaticus veterum eſt Plantæ Ægyptiacæ (*Alpin. Exot. Caſſabel Darrira* dictæ, quæ tetraperala eſt, ſili- culis oblongis, acuminatis, in baſi cauliculatis, feminibus nigris minutiffimis reſertis) cauliculi tenues, geniculati, foris pallide flaveſcentes, intus candidi, includentes medullam fungoſam, levem, ſimilem telis aranearum

Y

rum

rum in se collapsis & convolutis, saporis acris, suaviter amaricantis, odoris aromatici, & fragrantissimi. *Ex prælect. Manuscriptis Hermannii.*

## SECTIO VIGESIMA QUARTA.

### De Herbis Culmiferis.

**N**otæ sunt, Caulis cavus, teres, geniculatus, foliis cinctus ad singula genicula singulis, flores staminei.

Herbæ culmiferæ sunt vel grano

Major, frumentacæ dictæ, vel grano homini

Esculento, quæ propriè Frumenta, sunt quæ vel

Spicatæ, grano itidem vel

Major & oblongo

Nudo, glumis vel

Triturando facile abscedentibus, seu quæ grano est

Turgidiore & lucidiore, sulcato, farinâ candidiore & leviori, nutrimenti optimi; *Triticum*.

Strigiosiore & fusco, farina crassiore, nigriore & viscidior; *Secale*.

Artius adhærentibus, ut eas triturando non deponat; *Zea*.

Cortice crassiore testæ, Spicâ

Compactâ simplici; *Hordeum*.

Laxâ & ex pluribus compositâ; *Oryza*.

Minore & rotundior; *Panicum*.

Paniculatæ, grano

Oblongo, gluma crassiore testæ; *Avena*.

Subrotundo, minore & splendente; *Milium*.

Paniculatæ simul & spicatæ, Paniculâ in cacumine crassâ, spicis maximis è geniculis ad culmi latera exeuntibus; *Frumentum Indicum*.

Non esculento spicatæ, spicâ longâ, compressâ, strigosâ; *Lolium*.

Minore

Major & elatior; *Arundo*.

Minor & humilior; *Gramen*.



## I. De Tritico.

**G**rano est majore, oblongo, nudo, turgido, lucido & flavescente, ab uno latere sulcato, farina candidiore & levior, nutrimenti optimi. R. Synop. p. 177.

Triticum Offic. Spicâ muticâ Ger. Park. Hybernium aristis carens C. B. Vulgare, glumas trititando deponens J. B. Weizen. In agris feritur. Usus. Seminis Farina volatilis, furfur. Vires. Extrinsecus adhibetur Farina in tumoribus molliendis, leniendis, &c. In oculorum inflammationibus ac fluxionibus (cataplasmatibus forma imposita) in Erysipelate, Podagricisque doloribus leniendis. (sicca, farina imposita) Furfures abstergunt squamulas capitis, leniunt dolores. Amylum Offic. Weisse Stärcke. Conficitur ex Farina; scilicet, Maceratur sæpius quotidie aquâ affusâ & effusâ, donec ita mollescat ut cremor exprimi possit, deinde in Sole siccatur. Vires. Siccatur & adstringit.

## II. De Secali.

**A** Tritico differt culmo elatiore, grano strigiosiore, tenuiore & nigriore, glumis non operto, sed magna ex parte nudo, farina nigriore, humidior, lenta & obstruente. R. Synop. p. 178.

Secale Offic. Ger. J. B. Vulgatus Park. Hybernium vel majus C. B. Rosten. In agris feritur. Usus. Farina. Vires. Usus ejus potissimus Culinaris est, adhibetur tamen non raro extrinsecus ad Tumores & dolores discutiendos. Schrod.

## III. De Zea.

**Z**EA & Spelta Offic. J. B. Ger. Dicoccos sive Spelta vulgò Park. Dicoccos vel Zea major C. B. Speltz / Dincelsforn / St. Petersforn. In Italia seritur. *Ufu*. Semen sed rarius.

## IV. De Hordeo.

**A** Reliquis culmiferis spicatis grano cortice crassiore, undiq, arctè adhaerente testò, differt. R. Syn. p. 178.

Hordeum Offic. distichum C. B. Ger. J. B. Park. Gerste. Seritur in agris verno tempore. *Ufu*. Semen. *Vires*. Refrigerat & siccatur, abstergit, aperit, digerit, emollit, est diureticum, nutritivum. Schrod. Præp. Hordeum mundatum, & perlatum. Offic. Perl-Gerste.

Hordeum Gallicum nostratibus dictum, quod è Gallia in Angliam adferri solet, nihil aliud est, quàm Hordeum molâ quadam ad id parata cortice exutum. Vide D. Plot, *Hist. Nat. Oxon.* Optimum habetur rotundum, album, lucidum. Hordeum perlatum dictum, quod perlas seu margaritas Scoticas refert, eodem modo præparatur quo præcedens, verùm bis terve molæ subjicitur, ut deteratur & minus evadat. Præfertur parvum, album, farinâ undique aspersum, recens & non mucidum. N.B. Nonnulli Hordeum perlatum è milio factum esse volunt, ob parvitatem sc. alii è Triticò. *Vires*. Utraque cum Hordeo vulgari viribus conveniunt, sed magis nutriunt.

De modis faciendi Ptisanam, ejusque usu vide Dodonæum, Honestum, Vassæum in *Epistol. Claudinum*, &c.

V. De

## V. De Oryza.

**G**Luma seu cortice crassiore arctè adhaerente granis, spicâ laxâ è pluribus composita à reliquis distinguitur. R. H. p. 1246.

Oryza Offic. Ger. C. B. J. B. Park. Reisß. In India Orientali copiosè seritur. Usu. Semen decorticatum. Vires. Datur utiliter in Cibis, Dysentericis, Coeliacis, & Diarrhœâ affectis. Matth.

## VI. De Panico.

**S**Picâ laxiore, & velut è racemis composita, granis minoribus à reliquis differt. R. H. p. 1247.

Panicum Offic. vulgare Ger. J. B. C. B. Vulgare album Park. Germanicum sive panicula minore C. B. Buchweizen / Heidentorn. In agris Germaniæ seritur. Usu. Semen, sed rarius. Vires. Siccat & refrigerat, alvum astringit. Usus præcip. in Hæmoptoicis & Pollutione nocturna.

## VII. De Frumento Indico.

**I**Nsignibus notis ab aliis omnibus frumentaceis differt: Est enim paniculata simul & spicata. Panicula scilicet crassâ, acerosa summo culmo insidet, spicæ crassæ, tres quatuorve è foliorum sinubus exeunt. R. H. p. 1249.

Triticum Indicum Offic. J. B. Frumentum Turcicum & Indicum Ger. Indicum Mays dictum C. B. Milium Indicum maximum Mays dictum, seu Frumentum Indicum Park. Tlaolli seu Mayz Hern. Türkischer Weiz. Indiæ occidentalis indigena est. Usu. Fructus, in compositione Chocolata. Vires. Tempera-



tum est, inquit *Hernandez*, aut ad caliditatem, humiditatemque paulisper declive, substantia mediocri, concoctu facile, &c.

### VIII. De Milio.

**E**ffusâ iubâ, granis minoribus, subrotundis, lucidis à reliquis distinguitur. *R. H. p. 1250.*

Milium *Offic. Ger. J. B. Vulgare album Park. Semine luteo C. B. Hirsut. Ussu. Semen. Vires. Refrigerat & siccatur, alvum constipatur; Sudorem ac Urinam potenter movet. Schrod.*

### IX. De Avena.

**P**aniculâ sparsâ, semine angusto, oblongo, gluma crassiore tecto, in locustis bifidis à reliquis distinguitur. *R. Synopf. p. 178.*

Avena *Offic. Vesca Ger. Park. Vulgaris seu alba C. B. alba J. B. Haber. In agris seritur. Ussu. Semen. Vires. Culinare potius est, quam officinale. Crudum sacco inditur, qui ventri optimè calefactus imponitur ad dolores Colicos & Uterinos leniendos.*

### X. De Lolio.

**S**pica strigosa, compressa, granis cum glumis utrinque ad scapum in eodem plano sitis à reliquis differt. *R. Synop. p. 181.*

Lolium *Offic. Album Ger. Park. Gramineum spicatum, caput tentans J. B. Gramen loliaecum spica longiore C. B. Treppen oder Sulch. Inter segetes. Ussu. Semen. Vires. Calefacit & siccatur, attenuat, resolvit, abstergit. R. H. p. 1263.*

## XI. De Gramine.

**R**adice repente, geniculata, spicâ triticeâ à reli-  
quis facile distinguitur.

Gramen Offic. Caninum Ger. Caninum vul-  
gatus Park. Caninum arvense seu Gramen  
Dioscoridis C. B. repens Officinarum fortè, spi-  
cæ Triticeæ aliquatenus simile J. B. Spicâ tri-  
ticeâ repens vulgare, caninum dictum R. Synop.  
Quick-Grass. In agris & hortis, Ufu. Radix. Vi-  
res. Refrigerat & siccatur, aperit, subaltringit,  
substantiæ est tenuis ac penetrativæ. Schrod.

## XII. De Arundine.

**P**lanta est in culmiferis maxima, paniculâ lanugi-  
nosâ, aquosis gaudens. R. Synop. p. 185.

Arundo Offic. Vallatoria Ger. Vulgaris palu-  
stris J. B. Vulgaris sive phragmites Dioscoridis,  
καλαμὸς χαρῆκίας Theophrasti C. B. Harundo  
vulgaris sive vallatoria Park. Gemein Rohr.  
In aquosis. Ufu. Radix. Vires. Urinam & Men-  
ses ciet. Ischuriæ succurrit. Matth.

## XIII. De Calamo Saccharifero.

**M**edius inter Miliaceas, atque Arundinaceas plan-  
tas videtur Saccharatus calamus. R. H. p. 1278.

Arundo Saccharina J. B. Ger. Saccharifera  
C. B. Hern. Harundo Saccharifera Park. Ta-  
comaroe Pis. Zucker-Rohr. Sponte oritur in  
utraque India. E succo hujus plantæ conficitur  
Saccharum album & rubrum Offic. Weisser und  
Brauner Zucker. De modo ejus conficiendi  
videtis R. H. Saccharum cantum, candum & cry-  
STALLINUM album Offic. Weisser Zuckerkand / &

*Saccharum eantum & candum rubrum* Offic. *Brauner Zuckerandz*. Est saccharum depuratum candisando in crystallinam formam s. a. redatum, ad modum quo Salia crystallifari solent. *Vires*. Sacchari facultates & usus in cibo & medicina, quin & præparationum modi adeò numerosi sunt ut singulos recensere & accuratiùs expendere vel justum volumen requireret. C. B. Vide *J. Baubini Histor. Plant. Tom. 2. p. 536. 537. Item J. Raii H. Pl. Lib. 22. p. 1278. 1279. Vide etiam Ligonem in Histor. Barbado. & Hughesium in American. Med.*

---

## SECTIO VIGESIMA QUINTA.

### *De Herbis anomalis seu incertæ sedis.*

Hæ sunt vel

- { Aquaticæ, floribus perfectis seu bracteatis, foliis angulosis, fructu magno muricato; *Tribulus aquaticus*.
- { Terrestres, foliosæ, quibus
  - { Siliquæ breves, quadrangulæ, erectæ; *Sesamum*.
  - { Florum folia rictum quodammodo exprimentia, thyrsus oblongus; vaseula feminalia oblonga, Cardui æmula planta, facie externa; *Acanthus*.

#### I. De *Tribulo aquatico*.

**F**oliis angulosis, fructu magno, muricato, & loco natali à reliquis differt.

*Tribulus aquaticus* Offic. Ger. C. B. J. B. *Aquaticus major* Park. *Wassernuß / Stachelnuß / Epißnuß*. In aquosis. Junio floret. Usu. Nuces,

II. De



## II. De Acantho.

**F**Lorum, rictum quodammodo exprimentium, thyrsus oblongus; vascula seminalia oblonga, Cardui æmula, planta facie externa Acanthi notæ sunt.

Acanthus ☿ Branca ursina Offic. sativus Ger. Park. Sativus vel mollis Virgilii C. B. Carduus acanthus, sive Branca ursina J. B. Bärenklau. In hortis botanicis, Julio floret. Usu. Herba seu Folia. Vires, Urinam ducit & alvum sistit.

## III. De Sefamo.

**N**otæ sunt siliquæ breves, quadrangulæ, erectæ.

Sesamum Offic. Ger. C. B. J. B. Park. Semine fusco & albo Herm. Cat. Schit-el. H. M. An Gangila sive Sesamum Africanum Pison. Marcg? Canariens: Saat. Usu. Semen. Vires. Calefacit, modicè humectat, emollit, paregoricum, viscosum, pingue, adeoque & Emplasticum est; Nervorum duritiem illitu discutit, Colicis doloribus medetur. Schrod. Vide etiam Hofmannum in Schrod.

CLASSIS TERTIA,  
SEU  
DENDROLOGIA.  
SECTIO PRIMA.

*De Arboribus caudice simplici non  
ramoso.*

*De Palma.*

**N**otæ sunt, folia striata & velut *Arundinacea*, flores tripetalæ. R. H. p. 1352.

1. Palma Ger. J. B. *Vulgaris Park.* Major C. B. *Dactylifera Herm. Cat.* *Dactylifera major vulgaris Jons. D.* *Palmbaum / Dattelnbaum.* In *Ægypto* & aliis locis fervidis nascitur. *Ussu.* Fructus oblongo-rotundi glandium magnitudine & forma sed majores, includentes sub pellicula fulva ac tenui pulpam saporis subdulcis & viscidæ, & sub hac nucleum oblongum, durum, per longitudinem sulco notatum. *Dactylus* Offic. *Datteln.* Eligendi magni, fulvi, parum rugosi, molles, pleni, carnosæ, carne subdura ad nucleum candicante, ad corticem rubescente, sapore vinoso. *Vires.* Calefaciunt, subastringunt, asperitatem faucium leniunt, foetum in Utero roborant, fluxus Ventris sistunt, vitiis Renum ac Vesicæ succurrunt. *Schrod.*

2. Palma cujus fructus sessilis *Faufel* dicitur C. B. *Arecifera*, nuclea versicolori, Nuci *Moschatae* simili P. B. P. *Faufel* sive *Areca*, *Palmae*

næ foliis J. B. Sine Pynang Bont. Areca sive  
Faufel. Ger. Sive Faufel, Avellana Indiana ver-  
ficolor Park. Caunga H. M. Indianische Nuß.  
In Malabar aliisque locis Indiæ Orientalis suc-  
crescit. Ufu. Succus inspissatus Terra Japonica,  
& Catechu Officinis dictus. Est substantia gum-  
mosa indurata, è ruffo nigricans, saporis ad-  
stringentis & austeri, postmodum dulcis &  
grati, odoris nullius. Duplex est, una purior,  
de gustata leviter in lingua quasi liquefcit; al-  
tera verò durior & impurior, adeoque fere nul-  
lius usus, quæ fortasse decepit Schroderum, ut  
pro terra habuerit. Vires. Adstringit, ventricu-  
lum roborat, nauseam arcet, appetitum exci-  
tant, vomitum juvat, Fluxum alvi, mensium  
& sanguinis reprimat. De exotico illo medica-  
mento Terra Japonica Catechu seu Caetchu dicto,  
quid nimirum sit, non convenit inter crudi-  
tos: nonnulli qui pro vera seu genuina terræ  
specie, ut nomen sonat, illud habent, inter mi-  
neralia reponunt: Alii compositum quiddam  
vitriolicæ naturæ particeps esse existimant:  
Alii denique, & quidem rectè, Vegetabilibus  
annumerant, pro succo inspissato habentes.  
Quorum omnium opiniones à Wedelio Ephem.  
Germ. An. 2. Obs. 128. traduntur. Cæterum Ca-  
techu isthoc in aqua communi facilè solvitur,  
eidemque incorporatur, & tincturam rubram  
communicat, ut alii non pauci succi vegeta-  
biles inspissati, & extracta; à qua filtrando  
non separatur, ut terræ solent, sed filtrum  
unà transit; & calcinatione in cineres abit per-  
fectos



fectos, quod Terræ non faciunt. Quodd autem vitriolicæ naturæ particeps non sit tria sequentia experimenta abunde evincunt. 1. Quodd Sal vitriolicus ab eo nequeat separari. 2. Quodd Alkali admixtum ne minimam quidem effervescentiam aut præcipationem excitet aut producat. 3. Ejusdem solutio vitriolicis quibuscunque additis in Atramentum facessit *Garcias* & sequaces *Lycium Dioscoridis* esse volunt, quibus *Clusius* & *Veslingius* se opponunt, quoniam arbores *Lycium* fundentes, & *Catechu* plurimum inter se differunt, tum figurâ tum magnitudine foliorum & fructuum. Alii succum inspissatum seu extractum fructus illius *Anacardium occidentalium* dicti esse contendunt, ob nomen, ut videtur, affinitatem, siquidem ille *Cajou* & *Catzu* dicitur. Verum *Cleyerus* Extractum fructus *Acaciæ Orientalis* plantæ *Tamarindo* admodum similis esse affirmat. *Paulus Ammannus* compositum quoddam artificiale esse ait, Ingredientia ejus, inquit, sunt Extractum *Glyrrhizæ Indicæ*, & *Calami Aromatici Indici*, atque *Succus Arecæ*; qui ipsi colorem purpureum conciliat. Tandem *Johannes Otto Helbigius* simplicium *Indiæ Orientalis* peritissimus, eam educi tradit è fructu quodam parvo resinoso, astringente, velut in uvis dependente, pediculis longis; qui fructus, inquit, una cum foliis *Betle* & calce per totam *Indiam* masticator ad os mundandum, estque nihil aliud quam *Fausel Javanis* & *Malais Pynang*, dictum, cujus sententiæ & nos subscribimus.

Hinc

Sine hi versiculi.

Qui foliis credat commixta calce tenellis,  
Cum fructu hoc Indos vesci, unde ore cruento  
Purpureum ejiciunt succum, tam dentibus atris  
Horrendum attingunt, & dentibus ore minantur?

Res istæ, de quibus jam acturi sumus inquit  
contius, adeo familiares sunt apud omnes In-  
diæ populos, ut videamur operam velle per-  
dere si latius de iis agamus.

N.B. Pharmacopolæ nostrates Londinenses  
terre Japonicæ nomine Extractum ipsum prout  
ad nos adfertur intelligunt: Catechu vero ap-  
pellatione Compositum quiddam ex Extracto,  
Moscho, Ambra, &c. vid. Hagendornium de  
terre Catechu.

## SECTIO SECUNDA.

De Arboribus quarum fructus à floribus  
remoti vel sejuncti sunt.

Nuciferæ, hoc est, nuce duro & fragili putamine testæ,  
fructus in tegumento

{ Crasso & carnosio testam undique obducente, nu-  
cleo, in quatuor lobos profundè diviso, folio  
pinnato; *Juglans*.

{ Tenui & Membranaceo, summa parte aperto, fo-  
liis integris subrotundis; *Corylus*.

Glandiferæ, hoc est, nuce coriaceo tegmine obducta

{ Unica in unoquoque folliculo, seu calyce, qui nucem  
totam non integit, sed inferiorem ejus partem  
tantum; foliis

{ Deciduis, arbore procera; *Quercus*.

{ Semper virentibus, cortice

{ Crasso & fungoso; *Suber*.

{ Tenuiore; *Ilex*.

Pluribus

a b Pluribus nucibus communi tegumento inclusis, fructu  
 1 ſtu majore echinato, foliis longis ferratis; *Castanea*.

Coniferæ, hoc eſt, fructu squamofò, polyſpermo, in conis  
 ſeu metæ formam turbinato, ſuntque vel

Resiniferæ, fructu

[ Squamofò, binis ſub ſingulis ſquamis, ſeminibus,  
 foliis

[ Perpetuis, anguſtis,

[ Sparſim undique à ſurculis exeuntibus, iſſi-  
 que vel

[ Longioribus & binis ex eadem theca ſeu  
 tubulo exeuntibus; *Pinus*.

[ Brevioribus & ſingulatim enaſcentibus;  
*Abies*.

[ Breviſſimis, duris, & pungentibus conis  
 minimis; *Sabina*.

[ Agminatim in tuberculis, in penicillos velut  
 congeſtis, conis magnis ſurſum ſpectan-  
 tibus; *Cedrus*.

[ Deciduis, conis parvis; *Larix*.

[ E clavatis tuberibus per harmoniam coaptatis,  
 foliis brevibus in ſquamas degenerantibus;  
*Cupreſſus*.

[ Succo aqueo præditæ, foliis ſubrotundis, minori-  
 bus, conis minimis; *Betula*.

Bacciferæ, foliis perpetuis, ſimplicibus, anguſtis, mu-  
 cronibus acutis & pungentibus, colore foliorum  
 glauco, granis in ſingulis baccis ternis, ligno odo-  
 rato; *Juniperus*.

Lanigeræ, ſeminibus vaſculis incluſis, multis ſimul  
 confertis in fructum oblongum cylindraceum Ju-  
 lum dictum, è foliorum alis exeuntem, foliis

[ Anguſtioribus & longioribus, viminibus lentis;  
*Salix*.

[ Latoribus & anguloſis ſubrotundis; *Populus*.

*Arbores*



## Arbores flore à fructu remoto Nucifera.

**N**uces autem voco, fructus majores putamine duro & fragili nucleum claudentes.

### I. De Juglande.

**N**uce fragili & dura, tegumento exteriori clauso, testam undique obducente crassiore & carnosio, nucleo in quatuor lobos profundè diviso folio pinnato à reliquis differt. R. Meth. p. 36.

Nux Juglans Offic. Ger. J. B. Juglans vulgaris Park. Jons. D. Juglans sive regia vulgaris C. B. Ein Welscher Nußbaum. In areis & agris scribitur. Juli erumpunt Martio; Nuces maturescunt autumnò. *Ufu*. Cortex arboris, Juli, Nuces, Putamina nucum externa eaque viridia, *Vires*. Nuces recentes calefac. & siccant, in Peste præservare dicuntur. Putamina externa, viridia, vi vomitum leniter movendi prædita sunt. Cortex interior, de arbore decerptus, dum adhuc succulentus est siccatusque, ciet vomitum sat validè. Juli itidem vomitum excitant, sed lenius. *Ufus* præcipuus in Colico Nephriticoque dolore; sistunt & Diarrhœam, exhibiti. Schrod.

### II. De Corylo.

**N**uce fragili & durâ, tegumento tenui & membranaceo summa parte aperto, & foliis integris subrotundis à reliquis differt.

Avel-

Avellana Offic. *Corylus sylvestris* Ger. C. B. Seu Nux Avellana sylvestris J. B. Park. Nux Avellana sylvestris Jons. D. Haselstaude. In sylvis & sepibus. *Ufu*. Lignum, Nuces, & earum Cortices. *Vires*. Lignum per se raro Officinale est, Nucleos Stomacho infestos esse & difficulter concoqui, necnon caput gravare Medicorum communis est Sententia.

---

### *Arbores fructu à flore remoto Glandiferae.*

**G**landes autem voco, fructus majores putamine coriaceo nucleum claudentes.

#### *III. De Castanea.*

**C**orticoso & coriaceo putamine cum glande convenit; echinato calyce, totam nucem tegente, ab eadem differt. R. H. p. 1382.

Castanea Offic. Ger. J. B. Sativa C. B. Jons. D. Vulgaris Park. Castanien Baum. In sylvis sed rarius. *Ufu*. Nuces, earumque cortices. *Vires*. Membrana sistit valenter immodicos alvi fluores & Sanguinis rejectiones. Schrod.

#### *IV. De Quercu.*

**N**utae coriaceo in calice, qui nucem totam non integrit sed inferiorem ejus partem tantum; & foliis deciduis à reliquis distinguitur.

Quercus Offic. vulgaris Ger. Latifolia Park. Cum longis pediculis C. B. Vulgaris longis pediculis J. B. Eich-Baum. In sylvis & sepibus.  
*Ufu*.

*Ussu.* Cortex arboris, Germina, Folia, Glandes, Caliculæ, & Gallæ seu tuberculæ excrementitiæ, rotundæ, in superficie parvis tuberculis exasperatæ, unico foramine, intus fungosæ & carnosæ, saporis austeri, acerbi & adstringentis. *Vires.* Folia, Glandes, Cortex, Calyces & Gallæ, refrigerant, siccant, astringunt. *Ussus* in fluxu alvi, Uteri, Seminis, &c,

*V. De Illice.*

*Folia perpetuis aculeatis à Quercu differt.*

*Ilex coccigera* Ger. J. B. *Aquifolia* sive *coccigera* Park. *Aculeata, cocciglandifera* C. B. *Jons.* D. *Tabern.* *Scharlach Grün.* *Ussu.* *Grana Cherms* & *Coccus baphica* Offic. *Karmasinbeer.* In usu sunt Grana excrementitia, vel potius nidi Insectorum, pili magnitudinis, rubentia, substantia fungosa & rara, saporis subacris & subamaricantis, odoris non ingrati. Eligenda sunt grana rubicundo-nigra, integra. *Succus Cherms* Offic. vel potius *Syrupus.* Ex Monspeliensi agro ad nos adfertur, ubi fit ex Granis hoc modo. In mortario marmoreo tunduntur, & deinde per cribrum trajiciuntur, ut pulpa, inde separatur æquali Sacchari quantitate permiscendo. *Vires.* Cardiaca sunt, siccant, adstringunt, vapores tetros discutiunt, Spiritus vitales reficiunt, parturientibus subveniunt, vulneratis nervis medentur, Morbillos erumpere faciunt. *Schrod.* De Cherme plura vide apud *Quinqueranum de laudibus Gallo Provincia,* & apud *Bellonium in Itinerario Insule Cretæ.*



## VI. De Subere.

**F**oliis perpetuis non aculeatis, cortice crasso à reliquis differt.

Suber Offic. latifolium Ger. Park. J. B. Latifolium perpetuò virens C. B. Tabern. Pantoffel-Baum/ alii Korck-Baum. In Italia & aliis regionibus. *Ufu.* Cortex ad usum mechanicum, in medicina rarò. *Vires.* Tritus ex aqua calida potus Sanguinem sistit; ejusdem cinis ad idem valere dicitur. R. H. p. 1393.

---

*Arbores fructu à flore remoto  
Coniferae.*

**C**onos voco, fructus squamosos & siccos, polysspermos, in coni seu metæ formam plerumque turbinnatos. R. H.

## VII. De Abiete.

**N**otæ sunt, folia singularia ramulos undique cingentia, crebra, angusta, & in plerisque brevissima; proceritas eximia, materies levis. R. Synop. p. 212.

I. Abies Offic. Park. Ger. Mas conis sursum spectantibus C. B. Fœmina sive ἐλάτη ὀηλεία J. B. Taxi foliis R. H. p. 1394. R. Synop. Tannen-Baum. In areis. *Ufu.* Lignum, Summitates, Resina duplex in usu est. 1. *Liquida*, hanc Officinæ Terebintbinam Argentoratensem vocant, Strasburger Serpentin. Lariceæ consistentiâ similis, sed magis transparens, amaricans, valdè fragrans, & sapore Citrii mali corticem proximè refe-

referens. 2. *Sicca*, quæ uti *Thus* commune figurâ e mentitur, ita usum ejus æmulatur. *Vires*. *Ralura Ligni* & summitatibus in *Scorbuto*, bono cum successu sæpenumero usus sum. *Resina* ut externa facie, ita & viribus cum *Laricea* convenit.

2. *Picea Offic. Park.* Major *Ger.* Major prima sive *Abies rubra C. B.* *Latinorum* sive *Abies mas Theophrasti J. B.* *Abies* conis deorsum spectantibus *R. H.* p. 1396. *Kohter Tannenbaum.* In *Alpibus Scoticis* sed rarius. *Usu.* *Resina.* *Vires.* Cum *Abiegna* viribus convenit. Ex hujus *Resina* præparata sunt, 1. *Resina communis Offic. Gemein Harz* / coctione in lebetæ cum aqua dum ad consistentiam advenit. 2. *Pix liquida Offic. Schiff-Pech* / ustione in fornace, ut describit *J. Conradus Axtius* *Tractatu de Arboribus coniferis*. 3. *Pix Offic.* coctione liquidæ in fornace ad consistentiam; *Pix* illa ubi denuo coctione dephlegmatur crassescit magis ac magis, diciturque *Pix sicca Offic. Vires.* Ut resinam sapit ita & *Pix* resinarum vires obtinet: idque eò magis, quò liquidior *pix* fuerit, sicca enim exiccat fortius: facultatis itaque *pix* liquida est calefacientis, discutientis, mollientis, digerentis, anodynæ, &c. *Schrod. N. B.* *Pix* non tantum ex *Abietis*, sed ex *Pinûs*, *Cedri* & aliarum etiam arborum resiniferarum lignis vi ignis excoquitur. 4. *Pix Burgundica Offic.* Substantia est resinosa, solida, mollis, coloris rufescentis, odoris grati. Ex *Germania* ad nos adfertur. *Piceæ arboris Resinam* esse existimat

*Parkinsonus*, cum primo effluit liquidam, tempore indurescentem, ut tandem friabilis reddatur: quod an verum sit nescio, nedum enim certi quicquam de ea comperi. *Vires*. Cum Pice & Terebinthina viribus convenit.

### VIII. De Pinu.

**N**Ota sunt, folia longiora, bina ex eadem theca seu tubulo prodeuntia. R. Synop. p. 213.

1. *Pinus Offic. sativa C.B. Jonsf. D. Sativa sive domestica Ger. Urbana sive domestica Park. Officinalis duris, foliis longis J. B. Fichten Baum.* In Italia. *Ufu*. Coni, Nuclei, earumque cortices, & Resina Strobilina, quæ circa conos seu Strobilos concreta reperitur. Nuclei sunt oblongi, candidi, inclusi (mediate tunica rutila) officulis crassis & duris, squamato cono dispositis, saporis subdulcis. *Vires*. Nuclei caliditate temperati sunt, & humidi, maturant, leniunt, agglutinant, resolvunt, impinguant, adeoque *Ufus præcipuus* est in Phthisi, Tussi, Stranguria, ac acrimonia urinæ mitiganda, *Schrod.*

2. *Pinus sylvestris Ger.C.B. Sylvestris, vulgaris Genevensis & Tæda C. B. Berg Zirbelbaum.* Habetur in viridariis nostris frequens. *Ufu*. Resina quæ duplex est, vel liquida *Terebinthina communis* seu *vulgaris Offic. Gemeiner Terpentini* dicitur; vel sicca *Thus vulgare Offic. Weirauch* Römer. 1. *Terebinthina communis* quæ minus liquida & crassior est quam laricea aut abiegna, nec pellucida, albicans, consistentia fere Olei, frigo-



frigore nonnihil densati, ex hac conficitur *Oleum* per destillationem cujus residuum *Colophonia Offic.* Resina nigra vulgò *Geigen-Harz* dicitur, quæ est substantia resinosa, arida, fusca, saporis pinguis, oleosi & resinosi. 2. *Thus vulgare Offic.* *Fœmininum quibusdam.* Resina est mollis, citò ardens, colore ochroleuco, odore & sapore *Terebinthinæ* communis. *Vires.* Virtutem habent leniendi, temperandi, urinam movendi, &c.

3. *Balsamum de Tolu Offic. Park. J. B.* *Tolutanum* foliis *Ceratiae* similibus quod candidum *C. B.* *Balsamifera quarta seu Provinciæ Tolu Hern. Usu.* Resina seu Balsamum coloris ex spadiceo ad aureum tendentis, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, valdè glutinosæ, saporis dulcis & grati, odoris excellentissimi, Limoniorumque fragrantia. Advehitur in Cucurbitis parvis ex Provincia Tolu in America. *Vires.* Calefacit, siccatur, attenuat, resolvit, vulnerarium est, Pectus expurgat, &c. *Usus præcip.* in Asthmate, Phthisi, in ventriculi cruditate & dolore. Extrinsecus doloribus à causa frigida quibuscunque subvenit & imprimis Capitis, Arthriticis & Nephriticis: Celebratur in vulneribus articulorum, sectionibus nervorum, puncturis, &c. *Schrod. N. B.* Arbores è quibus colligitur hoc Balsamum pumilis Pinis sunt similes, ergo ad hunc locum referimus, & pro tertia specie Pinus proponimus.

## IX. De Cedro conifera.

**F**olius perpetuis angustis, agminatim in tuberculis, in penicillos velut coaggestis, conis magnis sursum spectantibus à reliquis differt. R. Meth. p. 38.

Cedrus Offic. Libani Ger. Conifera foliis Laricis C. B. Magna, sive Libani conifera J. B. magna conifera Libani Park. Cedern Baum. In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. *Usu.* Pix, quæ rarò aut nunquam in Officinis nostris reperitur. *Vires.* An à pice vulgari differat viribus nescio.

## X. De Larice.

**F**olius deciduis, brevibus, cedrinorum in modum nascentibus; conis parvis à reliquis differt. R. Meth. p. 38.

Larix Offic. Ger. Park. C. B. Folio deciduo conifera J. B. Lerchen Baum. In Alpibus abundè provenit. *Utu.* Resina liquida, Terebinthina Veneta Offic. Benedischer Serpentin dicta. Substantia est liquida, consistentia Mellis novi, coloris flavescentis, saporis acris & amaricantis, odoris grati & fragrantis. Pix quæ rarò aut nunquam invenitur. *Vires.* Terebinthina calefacit, emollit, abstergit. *Uusus* præcipuus intrinsecus in pulmonibus expurgandis, in Gonorrhœa sistenda, Urinam ac alvum ciet. Extrinsecus Chirurgis usitatissima est, fereque in Emplastris omnibus adhibetur, movet enim pus, maturat, &c. Schrod.

## XI. De

## XI. De Cupresso.

**N**ote sunt, præter communes huic generi, fructus è clavatis lignosis tuberibus, per harmoniam in formam globosam coaptatis, compositi: foliola breviter acuta in squammas degenerantia. R. Hist. p. 1406.

Cupressus Offic. Park. C. B. J. B. Sativa & sylvestris Ger. Vulgaris Jons. D. Cypressen Baum. In hortis & areis colitur. Usu. Ligna, summitates, Coni, seu nuces. Vires. Lignum refrigerat, siccatur, astringit. Summitates & Fructus calefaciunt parùm, exsiccant, astringunt. que validè, proin usus sunt præcip. in Hæmoptysi, Diarrhœa, Dysenteria, in mictione involuntaria, & in Herniis curandis intus & extus adhibita. Schrod.

## XII. De Sabina.

**N**ote sunt, folia perpetua, angusta, brevissima & pungentia, coni minimi, odor gravis.

Sabina Offic. vulgaris Park. Folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Jons. D. Sterilis Ger. J. B. Steubenbaum. In hortis colitur. Usu Summitates. Vires. Calefacit & siccatur, partium est tenuium, incidit, attenuat, discutit. Usus præcip. in Mensibus fortiter ciendis, Foetu ejiciendo, Uterina pellenda. Extrinsecus in affectibus Uterinis, &c. Schrod.

## XIII. De Betula.

**F**ructu squamoso semina continente, folio deciduo ad Populum accedente, à reliquis distinguitur. R. H. p. 1410.

Betula Offic. C. B. Ger. Park. J. B. Bircken Baum. In Silvis humidis & ericetis. Usu. Cortex.



tex, Lacrymæ, ex perforato caudice verno tempore proleſtæ. *Vires*. Cortex calefacit & emollit, Lacrymæ commendantur ad comminuendas calculos Renum & Veficæ, maculasque cutis abſtergendas. *Schrod.*

*Arbores flore à fructu remoto  
Bacciferæ.*

*XIV. De Junipero.*

**N**otæ ſunt, lignum odoratum, folia perpetua, anguſta, acuta; terna in ſingulis baccis grana. *R.* Synop p. 214.

Juniperus Offic. Ger. Vulgaris Park. *Jonſ. D.* Vulgaris fruticoſa C. B. Vulgaris baccis parvis purpureis *J. B.* Wacholder Baum. In Ericetis. *Uſu*. Lignum, Baccæ & Gummi. Baccæ ſunt rotundæ, ſubruſſæ, per maturitatem nigricantes, ſaporis ſubacris & reſinoſi, odoris grati. *Gummi Sandaracha Arabum*, eſt ſubſtantia reſinoſa, arida, pallidè flaveſcens, in guttas concreta, ſaporis reſinoſi. *Vires* Lignum calidum ac ſiccum eſt, ſuave olet, unde & raſura ejus non ſine cauſa in Cucuphis adhibetur, quippe cephalicum eſt. Baccæ incidunt, diſcutiunt. *Uſus præcipui*, in cienda Urina, Sudore, obſtructis Menſibus, in affectibus capitis, Lienis, Nervorum, Pectoris, &c. *Gummi*. *Uſus præcipui* in nervorum affectibus, reſolutione, frigidityte &c. *Schrod. N. B.* Vernix liquidus factitiuſ eſt liquor ex hoc Gummi in Oleo Terebinthinæ ſoluto.

*Arbo-*

*Arbores flore à fruûu remoto  
Lanigera.*

*XV. De Populo.*

**S**Emine julis lanigeris incluso cum Salice convenit, foliorum formâ latâ, & angulosâ ab ea differt. R. Synop. p. 214.

Populus nigra Offic. Ger. C. B. Park. Jons. D. Nigra sive *Айвег* J. B. Schwarzer Pappels Baum. In aquosis, & ad fluvios. Usu. Oculi seu Gemmæ, Aprili Mense collectæ. Vires. An calidæ sint an frigidæ varia est sententia. Verisimilior eorum sententia videtur qui moderatè calidas faciunt.

*XVI. De Salice.*

**J**ulis seu nucamentis è multis vasculis seminalibus compositis, quæ semen continent pappo involutum, cum Populo convenit, foliis longis, &c. ab eadem differt. R. Synop. p. 215.

Salix Offic. Ger. Vulgaris alba arborescens. C. B. Alba arborescens Jons. D. Arborea angustifolia, alba, vulgaris Park. Maxima fragilis, alba, hirsuta, J. B. Gemeiner Weidenbaum. In aquosis & ad rivulos. Usu. Folia. Vires. Refrigerant & siccant, subastringunt. Usus præcip. in libidine arcenda. Extrinsecus in Hæmorrhagia vulnerum, narium, & simil. adstringenda. Schrod.

## SECTIO TERTIA.

### De Arboribus flore fructuque aggregato.

Arbores flore fructuque aggregato sunt vel flosculis  
 } Intra fructum occultatis, quæ flore omni carere vul-  
 } go creditæ sunt; *Ficus*.  
 } Apertis, fructui insidentibus  
 { Tripetalis, fructu Sphærocephalo, foliis aceris,  
 { quinquepartitis; *Liquid-Ambra arbor*.  
 { Tetrapetalis, per maturitatem esculentis; *Morus*.  
 { Monopetalis; scandens, fructu longo, terete, julo-  
 { rum instar; *Piper longum*.

#### I. De Ficu.

**A**B aliis omnibus arboribus distinguitur flore vel  
 nullo, vel intra fructum edulem dulcem occultato.  
 R. H. p. 1431.

*Ficus Offic. Ger. J. B. Vulgaris Park. Com-  
 munis C. B. Feigenbaum.* In hortis & poma-  
 riis, in calidis regionibus colitur. *Uss.* Fructus  
 tam virides, quam sicæ, quæ *Caricæ & Passæ*  
 dicuntur. *Vires.* Utræque humectant, Pulmo-  
 nariæ sunt & bechicæ, arenulis Renum & vesti-  
 cæ medentur, venenis resistunt: præcipui usus  
 sunt in Variolis & Morbillis ad cutem pellen-  
 dis: maurant, emolliunt, attrahunt; unde &  
 bubonibus Pestilentialibus (innuente Scriptu-  
 ra) conferunt, &c. *Schrod.*

#### II. De Moro.

**N**Otæ sunt, Folia ex rotunditate in acumen desinen-  
 tia, serrata, hirsuta, flores seu juli ex plurimis flos-  
 culis



*culis tetrapetalis compositi, & in fructu ipso superstites.*

1. *Morus Offic. Ger. fructu nigro C. B. Nigra J. B. Nigra Vulgaris Park. Maulbeerbaum.* In hortis colitur, Serotino germinatu floret, fructum maturat Augusto. *Ussu.* Cortex radicis, & Fructus. *Vires.* Cortex radicis calefacit & siccant, abstergit, adstringit. Epar ac Lienem aperit, alvum laxat, tineas latas enecat. Fructus immaturus refrigerat & siccant, validè adstringit. *Ussus præcip.* in omnibus fluxibus. e. g. Diarrhœa, Dysenteria, Fluxu menstruo, & exputatione sanguinis. Extrinsecus in faucium inflammationibus, ulceribusque. Maturi refrigerant & siccant, parum solvunt alvum, sitim sedant, appetitum excitant. *Schrod.*

2. *Lignum R. Hist. p. 1810. Arbor Baccifera Brasiliensis, fructu tuberculis inæquali, Mori æmulo Ejusdem p. 1639. Tatai-iba Pis. Brasiliensibus Margg. Zanthoxylum aculeatum Carpinifoliis Americanum, cortice cinereo Plukenetii in Phytograph. T. 239. F. 3. Nasceitur in sylvis Brasiliensibus. Ussu. Lignum durum crocei coloris, in usum medicum nunquam recipitur, sed Tinctoriis expetitur ad colorandas lanas flavo colore.*

### III. De Pipere longo.

**N**ote: Planta est sarmentosa, foliis latis subrotundis, acuminatis, ad singulos nodos singulis alternatim positis, flosculis monopetalis, quinque partitis, fructu longo aggregato.

1. *Piper longum* *Offic. Ger. Park. J. B. Longum orientale C. B. Piperi longo similis, Pistolochiæ foliis, absque pediculis, Maderaspatana P. P. Tab. 104. Pimpilim Pis. Mant. A. Tlatlan-cuaye sive Piperis longi species 11. Hern. Catta-Tripali H. M. Tom. 7. Sanger Psesser. In Java, Malabar, &c. oritur. Usu. Fructus immaturi, oblongi, teretes. Julorum instar cinerei, ex numerosis minutis granis vermiculato plexu dispositis compacti, saporis fervidi & amaricantis. Vires. Piper longum intensa mordacitate præditum est, & subamarum quoniam immaturum, antidotis item & Theriacis medicaminibus opportunum *Dioscorid.* Cum Piperi rotundo viribus convenit.*

2. *Betle* *Offic. sive Betre Ger. Betre, Betle, Betele sive Bethle Park. Betre sive Tembul C. B. sive Betelle J. B. Betele Bont. Beétla-Codi H. M. Tom. 7. In Malabar & alibi Indiæ Orientalis crescit. Usu. Folia, sed raro aut nunquam in Officinis nostris reperitur. Vires. Calida est & sicca, Cor corroborat, oris halitum emendat.*

3. *Mecaxochitl* *Offic. Hern. Schmalzer Amer-icanischer Sanger Psesser. In Nova Hispania succrescit. Usu. Folia: ingreditur potum Cho-cولاتam, sed in Officinis nostris raro invenitur. Vires. Calida est & sicca, ad Piperis longi species attinens; Bibitur cum Chocolata cui gra-tum saporem conciliat, corroborat, ventricu-lum calefacit, oris halitum emendat; crassos lentosque humores attenuat, adversatur vene-nis; Iliacis & Colicis confert, &c. *Hernard.**

**IV. De Liquid-Ambari arbore.**

**N**Ote sunt, folia quinquepartita, divisura ad Aceris accedentia, fructus Spherocephalus, floribus ripetalis, seminibus oblongis.

Liquidambar Offic. C. B. Park. Resina arboris Ocosolt dictæ foliis Hederæ, odore Styracis liquidæ J. B. Liquidambari arbor sive Styracifera Aceris folio, fructu tribuloide i. e. pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens P. P. Tab. 42. Xochio-gotzo Quahuatl, seu Arbor Liquidambarum Indicum Hern. Styrax Aceris folio R. H. p. 1681. Arbor Virginiana Aceris folio, potius Platanus Virginiana Styracem fundens ejusd. p. 1799. Platanus Virginiana Styracem fundens seu Styrax Arbor Virginiana Aceris folio Breyn 2. P. Virginiana Styracem fundens Raii P. B. P. Acer Virginianum odoratum Herm. Cat. Weicher oder fließender Storax. In Virginia, Nova Hispania & alibi Indiæ Occidentalis succrevit. Usus. Resina est substantia liquida, pinguis, consistentia Terebinthinæ Venetæ, ex flavo rube-scens, saporis acris, aromatici, odoris fragrantis. Vires. Calefacit, humectat, resolvit, obstructions expellit, emollit, maturat. Usus præcip. in Utero obstructo ac indurato, tumoribus duris, &c. in suffitibus & simil. Schrod.

Balsamum hoc, arbore ipsa vel sponte, vel incisa extillare ait Hernandez. Sunt autem qui ex arboris ramis comminutis & coctis pinguedinem innatantem, colligunt & vendunt præ legitimo Balsamo: Atque hic liquor à nonnullis



lis Storax liquida putatur, in Pharmacopolarum & Pharmacopœorum officinis vulgò venalis.

## SECTIO QUARTA.

### De Arboribus fructu Umbilicato.

**A**rbores & Frutices fructu umbilicato voco, in quibus Flos summo fructui insidet, unde fructus à calyce floris plerumq; residuo velut umbilicatus est.

Arbores & Frutices fructu umbilicato sunt vel

{ Pomiferæ, foliis deciduis, fructuque testato

{ Membranâ tenuiore,

{ Acerbo; umbilico

{ Latissimo, pediculo brevi, intus ossiculis duris, foliis vel integris vel laciniatis; *Mespilus*.

{ Contractiore, pediculis fructuum longis, foliis pinnatis, seminibus folliculis membranaceis inclusis; *Sorbus*.

{ Mitiore & per maturitatem esculento, foliis integris, loculamentorum seminalium parietibus

{ Duris, & cartilagineis, arbore magis patula, fructu ad imum seu basin latiore ferè, succo acidior; *Malus*.

{ Mollibus & membranosis; fructu ad imum seu pediculum productiore ferè & turbinato, succo dulciore, arbore

{ Proceriore & rectiore, fructu lævi, sapore mitiore; *Pyrus*.

{ Humiliore ramis contortis, fructu lanugine rasili obrito; *Cydonia*.

{ Cortice crassiore, numerosis intus acinis

{ Angulosis in succo acido & grato contentis; *Granata*.

{ Planis cucurbitæ formis; *Cannanaperide*.

{ Bacciferæ, quæ sunt vel foliis

Deciduis,

Deciduis,

Spinosæ, fructu simplici, foliis

Pinnatis, fructu majore, flore specioso, odorato, cum plurimis intus apicibus; *Rosa*.

Laciniatis, humilior & fruticosior, fructu grandiore esculento, flore herbaceo; *Grossularia*.

Non spinosæ,

Scandentes, circumvolvendo sese plantis vicinis, floribus tubulosis oblongis cornu venatorum quodammodo figurâ, odoratis; *Caprifolium*.

Erectæ, humiliores & fruticosæ, floribus & bacis in racemalis, foliis angulosis laciniatis; *Ribes*.

Semper virentibus, simplicibus latis, suntque vel

Scandentes, quæ præter cirros quibus aliis plantis adhærescit, radices etiam in terram agunt, bacis in corymbos coactis; *Hedera*.

Erectæ, foliis suaveolentibus

Majoribus & latioribus, floribus

Tetrapetalis, fructu dipyreno odorato, seminibus compressis; *Caryophyllus Aromaticus*.

Pentapetalis, fructu polyspermo, seminibus angulosis uvarum vinaceis similibus; *Periclymenum odoratum*.

Minoribus & angustioribus, seminibus albis incurvis; *Myrtus*.

## De Arboribus fructu umbilicato majore seu de Pomiferis umbilicatis.

### I. De Malo.

**A**Rbor est notissima, nec ulla indiget, vel descriptione vel characteristica. R. Synop. p. 218.

I. Malus, sativa Offic. R, H, R. Synop. Malus  
J. B.

*J. B. Vulgaris Park. Domestica vulgaris Jons.*  
*D. Apffel-Baum.* In hortis & pomariis colitur.  
 Aprili floret. *Ussu.* Fructus Pomum aqueum  
 dictus, è majoribus est, exterius albicans, suc-  
 co prægnans, acido, grato, & nonnihil un-  
 amaricante, & succus Pomorum fragrantium  
 ut Pipini & Pyri magni dicti. *Vires.* Subacida  
 seu vinosa, naturæ sunt mixtæ, conveniuntque  
 Ventriculo & Cordi. *Acida* sunt naturæ fri-  
 gidiore ac astringentis. *Schrod.*

2. *Malus sylvestris Offic. Ger. Park. Sylve-*  
*stris sive agrestis J. B. R. H. Mala sylvestria*  
*quæ & alba, & rubra, & majora, & minora*  
*C. B. Jons. D. Bilder Apffelbaum.* In sylvis &  
 sepibus. Aprili florens. *Ussu.* Fructus & succus  
 ejus *Agresta Offic.* dictus. *Vires.* Vehemen-  
 ter austerus est, acidus & astringens.

## II. De Pyro.

**N**on minus nota est quam *Malus*, ergo neque indi-  
 get characteristica.

*Pyrus Offic. R. H. J. B. Ger. Sativa C. B. Park.*  
*R. Synop. Birnbaum.* In hortis & pomariis fre-  
 quens. Aprili floret. *Ussu.* Fructus. *Vires.* Re-  
 frigerat, astringit, &c. *Schrod.*

## III. De Cydonia.

**A**rbor est humilis ramis contortis, fructu majore  
 turbinato, lanugine rasili obsito.

*Mala Cydonia & Cotonea Offic. Cotonea*  
*Ger. J. B. Cotonea vulgaris Park. Mala Coto-*  
*nea majora C. B. Quitten oder Ruten Apffel-*  
*Baum.*



**Baum.** In hortis & viridariis colitur. Aprili  
flore. *Ufu.* Fructus seu Mala, & Semen. *Vires.*  
Mala stomachica sunt, refrigerant, siccant,  
astringunt. *Ufus præcip.* in Vomitu, alvi flu-  
ctu, Singultu, laxitate Stomachi. Semen refrige-  
rat, & humectat, mucilagine sua lenit, acrimo-  
niam obtundit, &c. *Schrod.*

#### *IV. De Sorbo.*

*Fructu acerbo, cum Mespilo convenit; foliis pinna-  
tis ab eadem differt.*

Sorbus *Offic.* Ger. J. B. Sativa C. B. Legitima  
Park. Pyriformis D. Plot. Speierling/ Speerbeer-  
Baum. In hortis colitur. Aprili flore. *Ufu.*  
Fructus. *Vires.* Refrigerat, siccant, astringit.  
*Ufus præcip.* in fluxionibus alvi, uteri, &c.  
Extrinsècus adstringit vulnera. NB. Sorba  
colliguntur potissimum immatura, exiccanturque in  
Clibano. *Schrod.*

#### *V. De Mespilo.*

*A sorbo differt foliis simplicibus non pinnatis, fru-  
ctu magis sparsa, non umbellatim nascente. R.*  
*Synop. p. 219.*

1. Mespilus *Offic.* sativa Ger. Vulgaris J. B.  
Vulgaris sive minor Park. Germanica folio  
Laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris  
C. B. Laurifolia Germanica folio non serrato  
Jons. D. Mespel-Baum. In hortis colitur.  
Flore. Majo. *Ufu.* Fructus, Semen. *Vires.* Fru-  
ctus refrigerant, siccant, saporis sunt austeri,  
astringunt, constipant validè, ventriculo noxi  
sunt, præcipuè dum duriusculi adhuc extiterint,

emolliti enim astringunt levius, nocentque minus, ac faciliè putrescunt. Usus esse possunt in Diarrhœa, Dysenteria, extrinsecus in Vomitu, fluxuque alvi sistendo. Semina commendantur summopere ad calculum atterendum & expellendum. *Schrod.*

2. Spina alba *Offic.* appendix vulgaris *Park.* Oxyacanthus *Ger.* Mespilus Apii foliis sylvestris spinosa, sive Oxyacantha *C.B.* Apii foliis sylvestris spinosa *Jons. D.* Oxyacantha vulgaris sive spinus albus *J.B.* Saurach oder Hagedorn. In sepibus passim provenit. Majo floret. *Ussu.* Folia & fructus. *Vires.* Similem vim cum fructibus Mespili obtinent.

## VI. De Granata.

*Note sunt, foliis esse deciduis, fructu cortice crassiore, numerosis intus acinis, savorum modo dispositis referto. R. Meth. p. 31.*

1. Granata & Punica *Offic.* *Ger.* Malus Punica sativa *C.B. Park.* Punica *J.B.* Granatapfelbaum. In calidis regionibus sponte exit. Majo floret. *Ussu.* Cytini seu Flores, Poma seu Fructus, Malicorium seu Cortex Fructus, & Semen. Cortex coriarius est, duriusculus, rugosus, foris ex spadiceo luteo puniceus, intus pallidè flavescens, saporis astringentis austeri. *Vires.* Poma in genere censentur boni succi, ventriculo convenientia, sed pauci nutrimenti. *Acida* frigida sunt, ac astringentia, stomachica. Usus præcip. in Febribus biliosis, in Gonorrhœa, in Pica gravidarum compescenda,

da, Orisque putredine corrigenda, & sim. Flores, ejusdem sunt naturæ cum Balauſtiis. Cortex ejusdem cum floribus cenſetur naturæ, præcipuique uſus eſt in ſedando fluxu Hæmorrhoidum, narium, Uteri, &c. Semina refrigerant itidem, aſtringuntque imprimis quæ ex pomis acidis collecta. *Schrod.*

2. Balauſtia *Offic. Ger. Hispanica J. B. Balauſtium flore pleno major C. B. Malus punica ſylveſtris major, ſive Balauſtium majus Park. Wilder Granat-Baum.* Cum priore creſcit. *Uſu.* Flores. *Vires.* Tam Balauſtia quàm Cytini ſunt naturæ terreſtris, valdè aſtringentis, inſpiſſantis, refrigerantis, ſiccantis, unde creberri-mus eorum uſus eſſe ſolet in omnis generis fluxionibus, v. g. Diarrhœa, Dysenteria, Fluxu Uterino, & ſim. in Sanguine vulnerum cohibendo, &c. *Schrod.*

## *VII. De Arbore Febrifuga Peruviana.*

**N**Ota ſunt, Folia Prunorum rubrorum non diſſimilia, flores Malorum Punicorum, ſemina Cucurbitæ. Arbor febrifuga Peruviana, China Chinæ, & Quinquina, & Gannanaperide dicta *R. Hiſt.* p. 1796. Febrifuga Peruviana *Jonſ. D. An Holquahvilt, ſeu Arbor Chilli Hern?* In Regno Quitoenſi in Peruvia creſcit. *Uſu.* Cortex craſſitie mediocri, foras ſcaber, paululum caneſcens, aliquando muſco obductus, intus lævis, coloris ferruginei, ſaporis acris & intenſè amari. *Vires.* Pulvis debita doſi exhibitus adverſus Febres omnes intermittentes (præcipuè



Quartanas,) tutum, certum, & minimè fallax. est remedium. NB. Sunt qui tincturam seu infusum æquè efficacem esse ac corticem volunt: Experientia autem docet infusum nihil valere, nisi subtiliores pulveris partes adhuc in liquore maneant, corticis ergo pulverem in substantia exhibitum efficacissimum esse cum pluribus Medicis semper comperimus.

Cortex isthic Peruvianus Officinis dictus ejusnam arboris spoliū sit, non convenit inter medicos, aliis hoc, aliis aliud affirmantibus: D. Spon non trunci aut ramorum arboris corticem esse, sed radicem perperam affirmat, cui à Bollo contradicitur, qui observavit arbores febrifugas Peruvianas plerumque omni cortice sine noxa spoliatas cerni. Observavit autem eruditissimus ille vir D. *Tancredus Robinson* M. D. *Ponna & Tserou-ponna H. M.* in India *Kina* ab Indigenis appellatas & febrifugas esse. Sunt qui dicunt (inquit Doctissimus *Raius*) eandem semini arboris (quod Hispani Patrio sermone *Pipitas de Quina* vocant) fugandarum febrium vim inesse; est autem semen illud semini *Cucurbitæ* simile. D. *Jacobus Newton* Botanicæ apprime gnarus *Pepitas Peruvianas* J. B. Fructum esse illius arboris affirmat. Sunt autem qui duas corticis Species esse affirmant (*viz.*) veram, & spuriam seu falsam, utramque autem ex India Occidentali adferri, prima seu vera superius est descripta; altera seu falsa tenera esse dicitur, foras coloris cinerei & canescentis, intus ex fusco aut obscuro ferruginei, saporis  
acris

acris, amaricantis, subpinguis, odoris fragrantis. NB. Cortex Eleterii esse videtur, de qua suo in loco.

---

*De Arboribus & Fruticibus fructu umbilicato minore, seu de Bacciferis umbilicatis.*

*VIII. De Rosa.*

**F**olio pinnato, flore specioso, frutice infirmo, & plerumque spinis corticalibus obsito, à reliquis hujus generis differt. R. Synop. p. 220.

1. Rosa canina, Cynosbatos & Cynorrhodon Offic. sylvestris, inodora, seu canina Park. Canina inodora Ger. Sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato C. B. Jons. D. Sylvestris alba cum rubore, folio glabro J. B. Wilde Rose / Feld-Rose / Heck-Rose. In sepibus passim. Junio floret. Usu. Flores, Fructus & Spongiolæ, seu potius Nidi cujusdam Insecti. Vires. Flores conveniunt in qualitatibus cum Rosis sativis, sed majorem vim astringendi habent, proinde in profluvio Uteri rubro & albo summæ sunt æstimationis. Fructus vi Lithontriptica maximopere commendantur, in qua tamen excellunt exempti arilli. Spongiolæ Bedeguar Offic. Calculosos efficacissimè, juvare dicuntur, &c. Schrod. Vid. Hagendornii Cynosbatologiam.

2. Rosa Damascena & pallida Offic. Damascena Ger. Park. Purpurea C. B. Sativa purpu-

rea *Jonsf. D.* Rubello flore majore multiplicato  
sive pleno, incarnata vulgò *J. B.* Provinz-Rose.  
In hortis colitur. Julio floret. *Usu.* Flores.  
*Vires.* Vis temperata, alvum laxans, Bilem  
temperans, aquas evacuens.

3. Rosa alba *Offic. Ger.* Anglica alba *Park.*  
Alba vulgaris major *C. B.* Sativa alba *Jonsf. D.*  
Candida plena & semiplena *J. B.* Weiße Rose.  
In hortis quoque colitur, & Junio floret. *Usu.*  
Flores. *Vires.* Astringunt sed levius.

4. Rosa rubra *Offic. Ger. C. B.* Rubra Angli-  
ca *Park.* Rubra sativa *Jonsf. D.* Rubra flore val-  
de pleno, & semipleno, & simplici fere *J. B.*  
Roth-Rose. In hortis. Junio quoque floret.  
*Usu.* Flores & Anthera *Offic. i. e.* flosculi lutei  
capillamentis in medio florum adhærescentes,  
*Vires.* Flores astringunt fortius. *Uusus præcip.*  
in fluxionibus, febribus, siti, appetitu prostra-  
to, &c. Extrinsecus in Vomitu, Cephalalgia,  
Vigiliis, dolore aurium & gingivarum, sedis, in  
Ulceribus & inflammationibus oris, faucium &  
oculorum. Antheræ exiccatae immiscentur  
dentifriciis ad Gingivarum astrictionem, &c.  
*Schrod.*

## IX. De Grossularia.

**N**ote sunt, Frutex spinosus, foliis laciniatis, fructu  
esculento, polypyreno, flore herbaceo.

Grossularia ☿ Uva crispa *Offic. R. H. p. 1484.*  
Spinosa sativa *C. B.* Vulgaris *Park.* Uva crispa  
*Ger.* Klosterbeer/ Kraußbeer/ Etachdorn. In hor-  
tis colitur. Floret, Aprili. *Usu.* Fructus. *Vires.*  
Bac.



Baccæ frigidaë & adstringentes sunt. Valent contra gravidarum picam : appetentiam cibi excitant : omne ventris profluvium compefcunt, &c.

## *X. De Ribefio.*

*Nota sunt, folia angulosa, laciniata, fructus in racemulis ; virgæ & surculi non spinosi.* R. Synop. pag. 221.

Ribes Offic. vulgaris fructu rubro Ger. Fructu rubro Park. vulgaris acidus ruber J. B. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarum C. B. Nothe Johannes Trauben oder Beeren. In hortis colitur. Aprili floret. *Ufu.* Baccæ. *Vires.* Refrigerant, siccant, subastringunt, ventriculo conveniunt. Usus præcip. in profluviis alvi, Dysenteria ; Choleram sedant, in Febribus biliosis prosunt, putredini resistunt, sitim restinguunt. Schrod.

## *XI. De Periclymeno.*

*Caule volubili scandente, floribus tubulosis, oblongis, cornu Venatorii quodammodo figurâ, odoratis, aggregatis, à reliquis distinguitur.* R. Synop. p. 222.

Caprifolium, Periclymenum & Matrisylva Offic. Periclymenum Ger. Non perfoliatum Germanicum C. B. Non perfoliatum J. B. Sive Caprifolium vulgare Park. Spect. Lilien / Weißblat. In sepibus frequens. Junio floret. *Ufu.* Folia, Flores. *Vires.* Calefacit & siccant, diureticum validum ac spleneticum est. Usus præcip. in Asthmate & Tussi. Externè extergit Ulcera sordida, sanat Impetigines, aliasque cutis maculas abstergit. Schrod.

*XII. De*

## XII. De Myrto.

**F**olius perpetuis, suaveolentibus; baccis umbilicatis, cum pluribus intus seminibus albis incurvis, ab aliis distinguitur. R. H. p. 1502.

Myrtus Offic. Bætica sylvestris Ger. Park. Communis Italica C. B. Vulgaris nigra & alba, sativa, & sylvestris J. B. Myrten Baum. In hortis nonnullis colitur. Junio floret. Ufu. Folia & Baccæ (Myrtilli Offic.) nigricantes, oblongo rotundi, saporis abstringentis, odoris debilis. Vires. Utraque refrigerant & siccant, validè astringunt. Folia emendant fœtorem sub axillis ac inguinibus (pulvis aspersus:) sudorem corporis immodicum sistunt (frictione:) membris catarrhosis opitulantur, alvi fluxui succurrunt, defensivum exhibent in Herpetibus, putredinem oris sanant, Hæmorrhagiam narium sistunt, Polypo medentur. Baccæ mitigant Oculorum inflammationes, juvant luxatos articulos ac ossa fracta, subveniunt proci-dentiæ Uteri ac Ani, &c. Schrod.

## XIII. De Hedera.

**H**utex est parasiticus, cirris suis arboribus aut parietibus adharens & scandens, fructu in corymbos coactio. R. Synop. p. 222.

Hedera arborea Offic. C. B. Corymbosa Ger. Arborea sive scandens & corymbosa nigra Park. Communis major J. B. Epheu / Winters grün. Passim nascitur ad arbores, &c. Ufu. Folia, Baccæ, & Gummi seu Lachryma, substantia resinosa, arida, dura, & compacta, ex saturo

viro-

virore ferè nigricans, vitreo nitore, sed non pellucido, saporis subacris & subastringentis, odoris nullius. *Vires.* Herba calefacit, & siccatur, subastringit. Internus ejus usus, quia Capiti nervosoque generi adversatur, rarus est. Externus crebrior in achoribus exiccandis & sanandis, in Ozænis curandis. *Basca*, Purgant per superiora & inferiora, unde & contra Febres à vulgo exhiberi solent. *Gummi* seu Lachryma ex trunco vulnerato stillans, Causticum est insignis, Lentisque interimere dicitur. *Schrod.*

#### *XIV. De Caryophyllo aromatico.*

*Notæ sunt, Folia oblonga, lata, glabra, & splendentia, odore aromatico; Fructus dipyrenos in summis ramulis in corymbos coacti, odore & sapore aromatico.*

1. Caryophyllus Offic. aromaticus fructu oblongo C. B. Aromaticus vulgaris *Jons.* D. Aromaticus Indiæ Orientalis, fructu clavato, monopireno *P. P. Tab. 155.* Indicus *J. B.* Caryophylli *Park.* Veri *Clusii* Ger. Ts-hinka *Pis.* Mant. A. Gewürz, Nägeln. In Moluccis insulis sponte provenit. *Ussu.* Fructus. Duplicis sortis prostant in Officinis: Nimirum 1. Caryophylli dicti fructus sunt immaturi, oblongi, instar clavi, angulosi, depressi, rugosi, ex rubigine nigricantes, quatuor in summo stellatim decussatis apiculis notati, cum medio capitello convexo & concavo futuri floris rudimento, saporis acris amari-cantis & grati, odoris fragrantissimi. 2. *Antho-* *phylli*, iidem fructus sunt, jam maturi, oblongi clavi instar nigricantes, prioribus similes sed crassiores & tumidiore, sub cortice duri-



usculo granum oblongum fuscum includentes. *Ger. Mutter-Näglein.* Eligendi sunt Caryophylli suave-fragrantes, oleosam quandam humiditatem preinendo exhibentes. Antophylli rarò in Officinis nostris inveniuntur. *Vires.* Cardiacum, Cephalicum ac Stomachicum insigne exhibent, calefaciunt, siccant, & discutiant. Hinc profunt in Lipothymia, Odontalgia, cruditate Ventriculi, Vertigine; arcent quoque Morbos malignos, uterinos, &c. *Schrod.*

2. Cassia Caryophyllata *Offic.* Amomum quorundam, fortè Caryophyllon *Plinii Ger. emac.* Aliud quorundam & Cariophyllon *Plinii Clusio suspicatum Park.* Quorundam odore Caryophylli *J. B.* Caryophyllus aromaticus fructu rotundo, Caryophillon *Plinii C. B.* Folio & fructu rotundo *Breyn. 2. P.* Aromaticus *Indiæ Occidentalis* foliis & fructu rotundis, dipyrenis seminibus fere orbiculatis, planis *P. P. Tab. 155.* Xocoxochitl seu Piper Tavaſci *Herm. Caninga ejusdem.* Piper Chiapæ *Redi.* In Insula Cuba & alibi *Indiæ Occidentalis* copiosa nascitur. *Uſus.* Cortex tenuis, ex ruffo ferrugineus, pelliculis suis exterioribus derasis, & in modum tubuli convolutus, saporis est acris, pungentis, aromatici, odoris fragrantis ad Caryophyllos accedentis. Fructus hujus arboris prostant in Officinis pro Carpobalsamo, aliis Amomo, non sine errore, sunt autem baccæ rotundæ nigricantes, Pipere paulo majores, in summo umbilicatae, includentes sub tenui pellicula & substantia fungosa duo semina nigra, saporis & odoris  
ad

ad Caryophyllos accedentis. *Vires.* Cephalica, & Cardiaca est & cum Caryophyllis viribus convenit.

3. *Pimenta Offic.* Piper Jamaicense quibusdam odoratum Jamaicense nostratibus *R. H. p.* 1507. Myrtus arborea foliis Laurinis aromatica *Transf. Philosoph.* N. 192. Caryophyllus aromaticus Americanus, Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari *P. P. T.* 155. Cocculi Indi aromatici *Mus. Regiæ Societ.* In Insula Jamaicensi copiosè provenit. *Ufu.* Fructus immaturus, orbicularis, cortice fusco, rugoso, umbilicato, duos continens nucleos nigros, odore & sapore aromatico ad Caryophyllos accedente. *Vires.* Roborat cor, ventriculumque, utero confert, flatus dissipat, obstructions aperit, Urinam & Menses evocat, frigus pellit, Colicis & Iliacis opitulatur.

### *XV. De Periclymento odorato.*

**N**otæ sunt, Folia laurina, flos pentapetalus albus odoratus, in singulis pediculis bini, terni, quaterni vel plures; baccae subvirides, multis seminibus angulosis Ulvarum vinaceis similibus refertæ.

*Cortex Winteranus Offic. Park.* Winteranus acris sive Canella alba *J. B.* Laurifolia Magellanica cortice acri *C. B.* In Magellanica abundè oritur. *Ufu.* Cortex crassus, cannulatus, foris integumento cinereo, fungoso, inæquali, fisso & multis rimis hiantè, obductus, intus solidus, densus, pallidus, saporis acris, aromatici, odoris fragrantissimi. *Vires.* Calefacit, siccat, Specificum est in Scorbuto, vomitiones reprimi-

mit. Paralyſi quoque medetur. N.B. In Officiniſ  
noſtris rarò hic Cortex invenitur, in cuius loco Phar  
macopola noſtri Canelle alba corticem ſubſtituunt.

## SECTIO QUINTA.

### De Arboribus fructu calyculato.

**A**rbores & Frutices fructu calyculato voco, quorum  
fructus calyce inſidet, acetabuli inſtar concavo.

Arbores & Frutices fructu calyculato, ſunt vel eodem  
Monopyreno; nucleo

{ Integro, fructu per maturitatem

{ Humido, majore, foliis deciduis; *Sebeſtena*.

{ Sicco, folio

{ Integro, nuce fragili, tegumento exteriori la-  
nuginoso, teſtam undiq; obducente; *Styrax*.

{ Laciniato, ſeu anguloſo, ſoſculis parvis luteis,  
baccis parvis, nigricantibus, racematim  
congeſtis; *Saffaſras*.

{ Digitato, Cannabis æmulo, ſoſculis in ſpicas  
congeſtis, viminibus lentis; *Agnus caſtus*.

{ Biſido, tegumento exteriori tenuiore, foliis

{ Ex adverſo binis, ſoſculis monopetalis in ſex  
lacinias diviſis, ſummos caules occupantibus;  
*Cinnamomum*.

{ Alternatim poſitis, floribus è foliorum fede pro-  
venientibus; *Camphoriſera arbor*.

{ Tetrapyreno, floribus pentapetalis, foliis laurinis;  
*Canella alba*.

### I. De Sebeſtena.

**N**otæ ſunt, fructus carnoſus per maturitatem niger,  
Pruno domeſtico ſimilis, calyci acetabuli inſtar con-  
cavo inſidens, unum nucleum in uno oſſiculo compreſſo  
& aliquantulum ruгоſo, continens.

Sebe-



*Sebesten Offic.* Sebestena, Myxa, sive Myxara  
*Ger.* Domestica C. B. Myxos sive Sebesten *Park.*  
Myxa, sive Sebesten J. B. Vidimarum H. M.  
*Tom.* 4. Prunus Sebestena domestica *Jons. D.* Ma-  
barica fructu racemoso, calyce excepto R. H.  
1563. Schwarze Brustbeer. In Ægypto &  
Asia crescit. Vere floret. Autumno Fructus ma-  
turatur. *Ufu.* Fructus, domesticis Prunis similes,  
nigricantes, includentes, sub pulpa carnosamellea  
dulci, ossiculum. *Vires.* Sebesten inter  
caliditatem ac frigiditatem temperata sunt, hu-  
mectant, emolliunt, acrimoniam humorum ob-  
tundunt. *Ufus præcip.* in Catarrhis acribus,  
Urina acri, Febribus biliosis, alvi obstructione:  
Summatim ut figura ita & viribus Pruna Dama-  
scena æmulantur. *Schrod.*

## II. De Agno Casto.

*Folio digitato, Cannabis æmulo, seminibus rotundis,  
nudis, monococcis, viminibus lentis ab aliis distingui-  
tur.*

Agnus castus & Vitex *Offic.* Vitex sive A-  
gnus castus *Ger.* Sive Agnus castus folio angu-  
sto *Park.* foliis angustioribus, Cannabis modo  
dispositis C. B. Agnus folio non ferraro J. B.  
Reusch Baum/Schaffmulle. In Italia, Sicilia, &c.  
oritur. Augusto floret. *Ufu.* Flores, sed raro in-  
veniuntur, & Semen seu Grana rotunda Pipe-  
re minora, colore cinericeo nigricante, saporis  
acris subastringentis, exsiccantis. *Vires.* Cale-  
facit & siccatur insigniter, discutit, Menstrua ciet,  
appetitus venereos cohibet, semen imminuit.  
*Schrod.*

III. De *Styrace*.

**N**Ota sunt, nux minor, subrotunda, tegumento exteriori nuci arte adherente, lanuginoso, folio arboris simplicis *Cydonia*. R. Meth. p. 36.

*Styrax* Offic. arbor Ger. J. B. Arbor vulgaris Park. folio Mali cotonei C.B. *Storax* Baum. In Italia & alibi. *Ufu*. Resina duplicis generis in Officinis prostat, siccus & liquidus. *Siccus* Officinis *Storax Calamita*, est substantia resinosa, pinguis ex flavo rubescens, in micæ variæ magnitudinis concreta, saporis subacris, resinosi, odoris fragrantissimi, ex trunco arboris sponte effluens. N. B. 1. Pharmacopolæ nostrates magma impurissimum, variisq; heterogeneis, ut paleis, pilis, furfuribus, scobe, &c. mixtum (hinc fortè *Styrax rubra* nonnullis) pro *Styrace calamita* in Officinis vendunt. 2. Occurrunt descriptiones medicamentorum in quibus & *Storax calamita* & *rubra* distinctim præscribuntur. In his igitur quid per *Styracem calamitam* à *rubea* distinctam intellectam velit *Nicolaus* diversæ sunt opiniones: Sunt qui *Thymiana* per *Styracem rubram* innui volunt; Alii *Styracem optimam*, quæ in grana confluit: Alii *Styracem* vetustate rubefactam esse contendunt. *Hoffmanno* autem (cui & nos consentimus) idem sunt gummi sed puritate differens, *calamita* enim de aliquali rubedine etiam participat: Verum enim

nimvero cum in præscriptionibus Medicis Styra<sup>x</sup> calamita occurrit, Styra<sup>x</sup> vel in gratis, vel ex impuritatibus colata intelligenda est; cum autem Styra<sup>x</sup> rubra, magma illa styracis impurissimum, quod in Officinis nostris vulgò venditur. Præfertur pinguis, lentus, fragmentis albicantibus rufescens, odore perseveranti, qui dum mollitur mellem liquorem reddit. 3. *Storax liquida* Offic. Weicher oder fließender Storax. Est liquor pinguis, melleæ & tenacis substantiæ, coloris fusci, aut ex fusco rubentis, odoris gravis ex cortice arboris effluens. *Vires.* Calefacit, exiccatur, emollit, concoquit, Cephalicus imprimis est, & nervinus: medetur Tussi, Catarrhis, Raucedini, &c. *Schrod.*

De Styrace liquido, magna inter Authores dissensio est. Aliis videlicet nihil aliud est quam Sta<sup>cte</sup>, i.e. Myrrhæ colamen: Quod falsum esse inde constat, quòd Myrrhæ lacrymæ ob substantiæ similitudinem in quovis aquoso liquore dissolvantur. Styra<sup>x</sup> autem liquida minime, sed in oleoso & pingui, ut aliæ resinæ. Aliis factitium quid ex Styrace calamita in oleo ac vino soluta, admistaque Terebinthina Veneta excocta, quæ decoctio ubi refrixerit, Styra<sup>x</sup> liquida ad fundum secedere dicitur, ad superficiem mitens oleosam substantiam liquidiorē: Alii expressu idem moliuntur: Aliis est Oleum ex nucleis arboris Storacifluæ expressum: Aliis fit per decoctionem corticis vel Arboris Styracis, vel ut alii, Liquidambrae. *Hoffm.*



*nus* Styracem calamitam & Liquidam idem esse gummi affirmat, sed puritate tantum differre. Hinc Liquida est optima. Verum quod in Officinis nostris pro Styrace liquida venditur omnino factitia res est, ut certior factus sum à Pharmacopolis variis Londinensibus.

#### IV. De *Sassafras arbore.*

**N**Otae sunt, folia laciniata, flosculi lutei racemati-  
congesti, fructus monoppyrenos per maturitatem  
niger.

Sassafras Offic. Ger. Park. Hern. Sive lignum Pavanum J. B. Arbor Sassafras Monardi Breyn. 1. P. ex Florida Ficulneo folio C. B. Anhuiba sive Sassafras Pis. Sassafras oder Fenchel-Holzbaum. In diversis regionibus Americæ nascitur, *Ufu.* Radix, ejusque Cortex, & sic describitur sub cortice tenui, foras cinereo, intus ferrugineo, includens materiam ex ruffo albicantem, lignosam, levem, & raram, saporis acris subdulcis & aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Calefacit, ficit, attenuat, aperit, discutit, sudores movet. *Ufus* præcip. in omni morborum genere, præsertim obstructionibus tollendis, partibus internis roborandis, in sterilitate emendanda & Venerea lue curanda. Instar Panaceæ in Catarrhis habetur. *Schrod.*

#### V. De *Cinamomo.*

**D**E Cassia, Cinamomo, quod & Canella dicitur, & Folio Malabathro, controversæ occurrunt opiniones. Sunt enim qui inter se  
Caf-

*Cassiam* ligneam & *Cinamomum* confundunt, & pro uno & eodem utrumque habent cortice, solisque nominibus differre, non re ipsa statuunt: alii ex sola loci varietate ea distinguunt, non ex diversa specie arboris: alii ex una eademque arbore utrumque desumi volunt: Alii diversæ speciei arborum, quibus & nos consentimus, cortices faciunt, inter quos tamen maxima similitudo intercedat, atque idcirco primo loco veram & genuinam arborem *Canelliferam Zeilanicam* vobis exhibuimus, cujus cortex *Officinarum Cinamomum* est: secundo in loco *Malabaricam* & *Javanicam*, cujus cortex est illa *Cassiae lignae* species fistulosa, seu in fistulas convoluta, in *Officinis* frequentissima; cujus folia, ut & *Cinamomeae* arboris veræ pro *Malabathro* seu folio Indo vulgò venduntur. Tertia nostra *Cassiae lignae* etiam species est in *Officinis* non rarò venalis. Quarta, quam pro folii Indi legitimi planta habemus, *Potamogetonis* seu *Leutis palustris* species non est, ut *Dioscorides* tradit, sed hæc ipsa arbor: cujus folia, cum in *Officinis* nostris rarò inveniantur, *Cinamomi* & *Cassiae lignae* folia pro iis ( ut diximus ) plerumque venduntur, idque fortasse absque ullo saltem insigni errore, cum omnes ut diximus *Canelliferarum arborum* species sint.

*Note sunt, Glans nuciformis calyculata, nucleo bifido, calloso, duro ac pingui, cortice integro admodum fragili, calyce concavo.*

i. *Cinamomum Offic. Park.* sive *Canella Zeilanicæ C.B. Laurus Zeilanicus* baccis calyculatis

*Hermanni R. H. p. 1561. Cassia Cinamomea Herm. Cat. Canella Ger. Sive Cinamomum vulgare J. B. quæ Cuurdo Pis. Mant. A. Arbor canellifera Zeylanica, cortice acerrimo seu præstantissimo, qui Cinamomum Officinarum Breyn. 2. P. Zimmetrinden-Baum. Ussu. Cortex tenuis, cannulatus, ab exteriori pellicula purgatus, ex flavo rubescens, seu ferrugineus, saporis acris, pungentis, subdulcis & aromatici, odoris fragrantissimi. Probatur subrubrum, odoris fragrantissimi, saporis subastringentis & acris. Ex Insula Zeilanica Indiæ orientalis ad nos transportatur. Vires. Calefacit, siccatur, aperit, discutit, Menses & partum accelerat, omnia viscera spiritusque singulos recreat, concoctiones juvat. Hinc usus ejus frequentissimus est in virium imbecillitate, Lipothymia, capitis, ventriculi & uteri affectibus frigidioribus. Schrod.*

2. Cassia lignea Offic. *Hern. lignea Officinarum Park. Vulgaris Calihacha dicta Pis. Mant. A. Cinamomum sive Canolla Malabarica & Javanensis C. B. Arbor canellifera Malabarica, cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum Officinarum Breyn. 2. P. Carva H. M. T. 1. Mutterz Zimmet oder Cassienrinden-Baum. Ussu. Cortex, Cinamomi in modum cannulatus & contortus ab exteriori pellicula etiam purgatus, odore & sapore debiliore magisque glutinoso. Ex Insula Malabar, Java, &c. adfertur. Vires. Quales Cinamomi sed longè debiliores, nec adeo diu durantes,*



3. *Cassia lignea communis Pharmacopolis.*  
*lignea fusca aromatica C. B. Lignea fusca aromatici & glutinosi saporis J. B. Arbor canellifera Indica, cortice acerrimo viscido seu mucilaginoso, qui Cassia lignea Officinarum Breyn. 2.*  
*Ufu.* Cortex, est Cinamomo crassior, odore sapore debilior, colore rubicundior, substantia durior, & ex pellicula sua exteriori etiam drusus. Hic cortex ex India Orientali transportatur & in Officinis nostris frequens reperitur.

4. *Folium Indum seu Malabathrum Park.*  
*Malabathrum, & Folium Indum Officinarum J. B. Tamalapatra Ger. Tamalapatrum sive Folium C. B. Canella sylvestris Malabarica R. Hist. 17562. Katou Karva H. M. Tom. 5. Indianisch Lat. Ufu.* Folia oblonga, acuminata, densa & labra, à pediculo ad apicem tres nervi discurrentes, odore grato. Eligenda sunt recentia, viridiuscula. *Vires.* Iisdem facultatibus polent, quibus spicanardi, sed fortioribus, urinam potenter movent. *Schrod.*

## *XI. De Camphora.*

*Amphorifera arboris Nota sunt, Glans. Nuciformis calyculata, nucleo bifido, calloso, duro ac pingui, cortice & putamine integro, fragili, calyce concavo, flores ex foliorum sede provenientes: Folia alternatim pervirentia. Breyn. 2. P.*

1. *Arbor camphorifera Japonica Breyn. Cent. Prod. 1. Camphorifera Japonica, foliis laevibus, fructu parvo globoso, calyce brevissimo*

*Breyn. 2. P. Camphorifera arbor, ex qua Camphora Officinarum Herm. Cat. Camphora Officinarum C. B. Camphora Park. Camphora quæ Salicis folio dicitur J. B. Campfferbaum von Japan.*

2. Arbor camphorifera Sumatrana *Grimmi R. H. p. 1679. Camphora Grinmi Ephem. Germ. An. XI. Obs. 153. Camphorifera Sumatrana, foliis Caryophylli aromatici longius mucronatis, fructu majore oblongo, calyce amplissimo, Tulipæ figuram quodammodo repræsentante Breyn. 2. P. Camphora arbor Sumatrana, seu Rhync ejusd. P. 1. Campffer-Baum von Sumatra. Camphora Offic. Campffer. Est substantia candidissima, Salis vel nitri instar, Pinguis & oleosa, in panes fusiles ingentes coacta importatur, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis & gravis; non tantum ex arboribus supradictis colligitur, nam ex cortice radicis Cinamomi destillando elicitur. Vires. Resistit putredini ac venenis, unde frequens ejus usus est in Peste, malignisque morbis & Febribus putridis: inter fortissima enim Alexiteria non immeritò numeratur. Suffocationi uterinæ subvenit. Usus externus crebrior est in Epithematis. Calidane sit an frigida non convenit inter medicos. Vetustiores frigidam esse statuunt, eo argumento quod Venerem extinguat, & libidinem compescat: hinc versiculus*

*Camphora per nares castrat odore mares: quodque Ophthalmiis & Oculorum inflammationibus, tum etiam ambustis imposita, nivis frigiditatem refert,*

at, & tandem quòd somnum inducat. Sed hæc observationes omnes ex falsâ Hypothesi oriundæ videntur; nam Ruta & Vitex (idoneis autoribus attestantibus) Venerem etiam extinguunt, & tamen non sunt frigide complexionis: At nec Venerem arcere concesserit Jac. Greynius in Cent. p. 14. Siquidem observatum purissimos Camphoram quotidie purificantes, tamen fecundos & multâ atque copiosâ sobole felices existere. Recentiores, quibus, & nos consentimus, è contra calidam affirmant, quorum argumenta, Inflammabilitas eximia; odor aromaticus penetrantissimus, ac vapor acris & pungens, facilis evanescencia ob parvum tenuitatem.

## VII. De Canella alba.

Foliis laurinis, floribus pentapetalis coccineis vel purpureis, baccis calyculatis tetrapyrenis à reliquis differt.

Canella alba Park. Alba quorundam J. B. Cinnamomum sive Canella tubis minoribus alba C. B. Cassia lignea Jamaicensis, cortice acri candicante P. P. Tab. 81. Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato ramoso Philosoph. Trans. N. 192. Wilder Zimmet Baum. In Insula Jamaicensi & alibi. Ussu. Cortex in oblongos tubulos convolvitur, ab exteriori cortice purgatos tam extus quam intus exalbidus, Cinamomo crassior & lentior, sapore acri, aromatico, odore fragranti. In Officinis nostris pro Cortice Winterano non infrequens venditur, cui viribus respondet, & pro succedaneo ejus non immeritò usurpari potest.



## SECTIO SEXTA.

## De Arboribus Pruniferis.

**A**rbores Pruniferas voco, quæ fructus majores proferunt ossiculum intus unicum, pericarpio seu pulpâ etiam per maturitatem humidâ undique circum continentibus. R. H. p. 1512.

Arbores Pruniferae sunt vel fructibus

{ Solitariis, seu in singulis pediculis singulis, quæ vel sunt pediculis

{ Brevissimis, fructu vel

{ Compresso seu pulvinato, ossiculo

{ { Latius aut æquali, folio rotundiore; *Malus Armeniaca*.

{ { In æquali, sulcis aut scrobiculis exarato, folio

{ { Simplici,

{ { Longo, serrato, ossiculo

{ { { Rotundiore, rugis scabro, fructus pulpa copiosiore, molliore & esculento; *Malus Persica*.

{ { { Productiore, & scrobiculis exarato, pulpa per maturitatem siccior; *Amygdalus*,

{ { { Subrotundo, serrato; *Tacamahaca*.

{ { { Pinnato, fructuque oblongo, viridi; *Ebenus*.

{ { Rotundiore & minus compresso,

{ { { Glabro, nucleo aromatico, venis flavis, rubentibus vario, triplici putamini tecto; *Nux Moschata*

{ { { Piloso, foliis citrinis; *Arbor Benzoinifera*.

{ { Paulo productioribus, flore

{ { { albo speciosiore, ossiculo fructus compresso, crasso ac duro

{ { { Minus, pulpa molli; *Prunus*.

{ { { Magis, fructu etiam costis aliquot clatis anguloso; *Myrobalanus*.

{ { { Luteo aut herbido minus pulchro, ossiculo duriore, arbore ipsa,

**b** { Non Spinosa, fructu tereti, oblongo, valde acido, officulo etiam tereti, durissimo; *Cornus*.

{ Spinosa, foliis trinerviis, per ambitum serratis, officulo scabro; *Jujuba*.

{ Longissimis in hoc genere, fructu brevior & ad basin latiore, rotundiorque quam sunt Pruna, & officulo pariter brevior ac tumidiore; *Cerasus*.

{ Racemosis aut confertim nascentibus, officulis Monospermis, fructu nudo, officulo

{ Fragili; fructu ipso pruniformi, liquore pingui, Oleo dicto, scatente, foliis salignis subtus incanis, perpetuis, officulo fructus durissimo, scabro; *Olea*.

{ Lento & ligneo, fructu ipso seu

{ Cordiformi, foliis etiam geminatis, glabris, flosculis tetrapetalis; *Anacardium*.

{ Pyriformi, officulo etiam reniformi summo fructui innascente, foliis singularibus, flosculis pentapetalis; *Acajou*.

## *I. De Malo Armeniaca.*

**N**ote sunt, Folia lata, glabra, Populum nigram referentia: ossa plana & levia.

Armeniaca malus Offic. malus major Ger. Mala majora C. B. J. B. Appricosen Baum. In hortis & viridariis colitur. Usu. Fructus in culinis, in medicina enim raro occurrit.

## *II. De Malo Persica.*

**F**oliis longis angustis; fructus officulo rugis & sulcis profundioribus exarato à reliquis differt. R. H.

P. 1514.

Persica malus. Offic. Ger. Park. C. B. J. B. Persischen Baum. In hortis colitur. Martio floret. Septembri fructus perficitur. Usu. Folia, Flores & Fructus. Vires. Folia & Flores, calefaciunt, siccant,

siccant, abstergunt. Usus præcip. (florum) in Lumbricis Infantum, in alvi laxatione, Mesenterii obstructione, seri purgatione, & sim. *Fructus* refrigerat, & humectat, nutrimenti sunt pauci facileque putrescunt. *Schrod.*

### III. De Ebeno.

**F**oliis Juglandinis sed paulo minoribus, prasinum colorem referentibus, fructu oblongo, viridi, Persicæ fructus æmulo, ab aliis differt.

*Ebenus* Offic. C. B. J. B. *Ebben*; *Holz*. *Usu*. Medulla ligni durissima nigra. *Vires*. *Ebenus*, consentiente Veterum testimonio, oculis utilis est. Scobem ejus oculis unicè mederi dicunt, lignoque ad cotem trito cum passo caliginem discuti, *Plin.* In convulsione flatulenta valet, inquit *Zac.*

Quid sit *Ebenus* antiquorum hodie controversatur, alii enim *Palmæ*, alii *Guajaci*, alii *Cytisi* speciem esse autumant; duæ autem ligni species in Fabrorum lignariorum aliorumque Mechanicorum Officinis inveniuntur, viz. una ex India Orientali observante *Helbigio* allata & hoc in loco à nobis exhibita; altera *Americana Arbor*, filiquosa, ut nos monuit eruditissimus ille *Botanicus D. Hans Sloan*, M. D. quæ cum nullius in medicina usus sit, de ea plura dicere supersedeo.

### IV. De Tacamahaca.

**F**oliis crenatis *Populo* non dissimilibus, *Fructu* nucleo Persico simili, ab aliis differt.

*Tacamahaca* Offic. C. B. *Park.* *Populo* similis, fructu colore *Pæoniæ* simili J. B. Foliis crenatis,



**Sattel, Holz.** Lignum ad ephippia conficiendum aptum *P. B. P.* Tecomahaca *Hern. Ufu.* Gummi seu Resina, substantia est resinosa, arida, nunc ruffo, nunc flavo nigricans, in glebas compacta, saporis aromatici resinosi, odoris fragrantis. *Vires.* Calefacit, siccatur, validæ astringentis particeps, digerit, resolvit, maturat, tumores emollit, dolores ac flatus discutit: Uterina imprimis est, nervina ac cephalica. Uti præcipue externus est, &c. *Schrod.* Adeo celebris est apud Indos, ut ad qualemcunque dolorem adhibeatur; *Monardes.*

### V. De Amygdalo.

**A** Persica cui alias persimilis est, differt pulvinato, fructus callo minus spisso, & permaturitatem scioriore, officulo longiore, lævi, & scrobiculis insculpto. *R. H. p. 1519.*

Amygdalus Amara & Dulcis *Offic. J. B. Savona C. B.* Amygdalus *Ger. Park.* Mandelbaum. Regionibus calidis delectatur. *Ufu.* Nuclei, qui multum inter se differunt; alii enim sunt amari, alii dulces, apud nos maxime æstimantur Amygdala Jordanica, quæ majora sunt, & longiora, & angustiora. *Vires.* Dulces, nutritivæ sunt, temperatè calidæ & humidæ, humorum acrimoniam lenientes, & hinc dolorem & Vigiliis ab acrimonia oriundas, demulcentes. Amarae, sunt calidæ & siccae, attenuant, aperiunt, extergunt, diureticæ sunt, obstructioni Jecoris, Lienis, Mesenterii, Uterique conferunt. Extrinsecus Lentigines tollunt. *Schrod.*

## VI. De Nuce Moschata.

**A** Reliquis hujus generis distinguitur, triplici fructu integumento, nucleo ovato, exterius rugoso, pulpa interiore venis flave-rubentibus variâ, aromaticâ.  
R. A. p. 1522.

Nux moschata Offic. Ger. Park. C.B. Aromatica vulgò muschata J. B. Pala Pis. Mant. A. Muscatnuß, Baum. In Insula Banda crescit. Usu. Nucleus Macis, seu involucrum secundum, putamen durum quasi reticulo includens, & fructus integri, conditi. Eligendus Nucleus recens, gravis, pinguis, & qui acu punctus, succum oleosum emittit. Macis probatur odore suavi, saporis subacri, colore rubescente. Vires. Nucleus calefacit & siccât, subastringit, Stomachicus est, Cephalicus, Uterinus, discutit flatu, coctionem juvat, halitum foetidum oris emendat, foetum recreat, Lipothymia ac Palpitationi Cordis succurrit, Lienem minuit, alvi fluores compescit, vomitum sistit. Maci eadem vires adscribuntur, quia tamen partium tenuiorum existit, ideo & operando efficacior & magis penetrans habetur. Schrod. Præp. in Officinis Pharmacopolarum frequentes venduntur. 1. Condit. Nuces Moschatæ, Eingemachte Muscaten. Condiuntur virides, integræ ut Juglandes, conditæq; ad nos transportantur. 2. Ol. Nucis Moschatæ per expressionem. Macis vulgò, Muscaten Nuß, Dehl in Germania dictum, nihil aliud est quàm Oleum Nucis Myristicæ per expressionem elicatum. Optimum ex India Orientali mittitur in ollis Porcellensibus, consistentiæ crassæ,

crassæ, pinguis; coloris Macis, & odoris fragrantis. Hoc in Officiis Pharmacopolarum minùs frequens est quàm species quædam ex *Hollandia* advecta in massis seu laterculis quadratis, consistentia duriore, colore pallidiore & odore remissiore, priori bonitate multùm cedens.

Verum seu genuinum Macis oleum per expressionem in Indiis Orientalibus è Maci recenti fit; unde ad nos in vasis & ampullis vitreis adfertur, sed in Officinis nostris rarò invenitur. Est autem liquidum, colore rubente, odore Macis valido, sapore subacido, ima parte æquifundum tantillo crassiore quàm suprema.

Invenitur etiam apud Pharmacopolas nostras Olei Macis communistitulo (Unguenti Macis nonnullis dicti) Oleum vel potius Unguentum quoddam fascitium, ex Sebo ovino, Palmæ oleo, aliisque ejusdem farinæ simplicibus, Nucis Myristicæ oleo delibutum & coloratum, vilis pretii, & virib' præcedenti multò inferius.

## *VII. De Arbore Benzoinifera.*

**F**oliis Citrinis, fructuque compresso piloso à reliquis differt.

Benzoin *Offic. Park.* Belzonium *C. B.* Benjoinum cujus arbor folio Citri *J. B.* Arbor Benzoihi *Grimmi Ephem. Germ. A. XI.* Benzoinifera *Breyn. 2. P.* Benzoinbaum. In India Orientali oritur. *Usu.* Resina arida & indurata ex variis splendentibus micis, modò flavescentibus, modò albescentibus, seu ex variis frustulis diversorum



rum colorum in massam coacta, saporis resinosi ac pinguis, odoris fragrantis & suavis. Triplex in Officinis reperitur, 1. *Amygdaloides*, in Siam & ejus contermina Mirtaban proveniens. 2. *Nigrus* in Java & Sumatra inventum. 3. *Nigrum* in Sumatræ provincia profluens. *Grimmius* autem duplex semper gummi ex iisdem arboribus haberi asserit; Primum quod eleganter album & flavum est, secundum crassius, subfuscum, durum, quod recrementa habet admixta. Præferitur *Amygdaloides* quod maculas candidas *Amygdalarum* instar refert. Optimum censetur pellucidum, suavissimè spirans, nec heterogeneis inquinatum. *Vires*. Calefacit & siccatur, incidit, attenuat, Pulmonicum est. Usus præcip. intrinsecus in affectibus Pulmonum Catarrhosis, Tussi, Asthmate. Extrinsecus in cerebro, per sternutationem expurgando, in Odontalgia masticando, in tuberculis ac rubore faciei extergendo, &c. *Schrod.*

Veteribus Græcis & Arabibus ignotum fuisse ostendit *Garzins ab Horto*, & quod Imperatoriæ vel Angelicæ gummi non sit contra *Ruellium* disputat: At neque *Alam dulcem* (sub quo nomine in Officinis nonnullis recipitur) seu *Lasér* esse, hoc est, *Laserpitii* succus, ut multi opinati sunt, probat *Hoffmannus*, sed ex arboribus quibusdam coalita, ut testantur fragmenta ramulorum ligneorum, & corticem admista.

E quam arboris aut plantæ specie *Benzoinum* colligatur, non levis est controversia inter Botánicos. *Bontius* stirpem *Benzoinum* funden-

tem sarmentosam esse scriptum reliquit, Smilaci asperæ aut Sarzæparillæ similem, brachii crassitudine; Garzie ab Horto, & N. Grimmio qui in India Orientali diu vixit, contrariatur. Hi enim Arborem Benzoiniferam proceram, grandem, speciosam esse affirmant. Verum Grimmus Indiarum incolæ non permittere ait ut hæ arbores adoleſcant aut omnino crescant ultra sexennium, verum tunc temporis eas ut inutiles excindere; additque fructum pilosum esse, magnitudine Nucis Avellanæ, Moschatæ tamen similem; qua de causa eam hoc in loco disposui. Vide Arborem Benzoiniferam Virginianam in Plukenet. Phytograph. T. 139. Fig. 3. 4.

### VIII. De Pruno.

**F**olius deciduis, floribus albis speciosis, officulo fructus compresso, & minus crasso ac duro, pulpa molli a reliquis differt.

1. Prunus Damascena Offic. Pruna magna, dulcia, atrocoerulea C. B. Atrocoerulea, Theocrito Barbyla, aliis Damascena dicuntur Jons. D. Zwetschen Baum. In Syria crescit. Usu. Fructus seu Pruna magna, dulcia, atrocoerulea, nucleo longo & plano, quæ ex Syria ad Venetias sicca adferuntur. Palma datur Damascenis, sed in Officinis nostris raro inveniuntur, earum autem loco Gallica usurpantur. Vires. Pruna natura refrigerant, & humectant, laxant, acrimoniam humorum obtundunt, linguam humectant, sitim mitigant. Schrod.

2. Prunus Gallica Offic. Prunus C. B. Sativa J. B. Dome-

**Domestica Ger. Vulgaris Park. Pflaumen Baum.**  
 In hortis non infrequens colitur. Aprili floret.  
*Ufu.* Fructus seu Pruna, ex Gallia Narbonensi ad  
 nos transportantur sicca, & Gummi pelluci-  
 dum durum. *Vires.* Cum priore Viribus con-  
 venire creduntur.

3. **Prunus Brignolensis Offic. Pruna Briolensia**  
 aut **Brignolensia R. H. p. 15.26.** ex flavo rufe-  
 scentia, mixti saporis, gratissima *C. D.* Ex flavo  
 rufescentia, seu Pruna de Brignoles *Jons. D.*  
**Prunellen.** In Provincia succrescit, unde ad  
 nos transportatur. Fructus seu Pruna colore  
 ex flavo rufescentia enucleata & exsiccata, sa-  
 pore gratissima. *Vires.* Refrigerant, hume-  
 ctant, sed citra alvi commotionem, adeoque  
 esui aptiora censeantur, gratumque refrigerium  
 in Febribus exhibent. *Schrod.*

4. **Prunellus sylvestris Offic. Prunus sylve-**  
**stris Ger. Park. C. B. J. B. Acacia Germanica**  
*Schrod. Schlehen Dorn / Schleen.* In sepibus  
 passim. Aprili floret. *Ufu.* Cortex, Flores, Fru-  
 ctus, & Succus inspissatus, Acacia Germanica  
 vulgò dictus. *Vires.* Cortex, Fructus, & ejus  
 Succus inspissatus exiccant, astringunt, increas-  
 cant. Usus præcipuus est in profluviiis alvi, Ute-  
 ri, &c. Extrinsecus in Gargarismis & Balneis  
 uterinis. *Flores.* Resolvunt, Renum sabulum  
 educunt, &c. *Schrod. N. B. Acacia Germanica non*  
*infrequens in Officinis Pharmacopolarum pro Acacia*  
*vera venditur.*



## IX. De Myrobalanis.

**A** Reliquis Prunis differunt costis aliquot elatis secundum longitudinem ductis, & ossiculis majoribus rasseribusque nucleis minoribus. R. Hist. p. 1531.

In Officinis quinque habentur Myrobalanorum species, quæ hoc dislichio comprehenduntur.

*Myrobalanorum species sunt quinque bonorum, Citrinus, Chebulus, Bellericus, Emblicus, Indus.*

Ex sententia autem Arabum, quatuor duntaxat earundem genera sunt. Hujus sententiæ sunt qui Chebulas & Citrinas verissimè ex una & eadem arbore esse affirmant, Citrinas immaturas, Chebulas verò maturas. Cordus autem scribit, Arabibus recentioribus tres tantum species Myrobalanorum cognitæ fuisse, (viz.) 1. Indas, Chebulas & Citrinas, quæ ab una eademque arbore desumuntur. 2. Bellericas ex peculiari arbore esse: & 3. Emblicas peculiare genus dicit. Quibus se opponit Garcias ab Horto inquiring, Falluntur tam ii qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quàm qui Citrina & Chebula tantum. Nam quinque sunt (quibus & nos consentimus) diversa arborum genera, in regionibus 60 aut 100 leucis inter se distantibus nascentia.

1. Myrobalanus Indæ & nigra Offic. Indica Ger. Park. Myrobalani nigra octangulares C. B. Indæ, nigra, sine nucleis J. B. Myrobalanifera salicis folio Jons. D. Indianische oder schwarze Myrobalanen. Uss. Fructus oblongi reliquis Myrobalanis

balanis tenuiores superficie octangulâri, rugosi, solidi & duri, intus & extus coloris nigri, Bituminis instar Judaici, saporis subacidi, acerbi & adstringentis.

2. Myrobalanus Citrina *Offic.* citrina *Ger. Park.* Myrobalani teretes, citrini, bilem purgantes *C. B.* Citrinæ *J. B.* Myrobalanifera Sorbi foliis *Jons. D.* Gelbe Myrobalanen. *Ufu.* Fructus oblongi, rotundi, pentagoni, rugosi, Chebulis minores, coloris citrini, includentes sub putamine carnosâ officulum angulosum.

3. Myrobalanus Chebula *Offic.* Ger. *Park.* Myrobalani maximi, oblongi, angulosi, pituitam purgantes *C. B.* Chebulæ, citrinis similes, nigricantes *J. B.* Myrobalanifera Persicæ folio *Jons. D.* Grosse oder Schwarzkbraune Myrobalanen. *Ufu.* Fructus oblongi, in quinque costas elevati, rugosi, cæterarumque specierum omnium maximi, includentes sub putamine carnosâ, extus colore ad fuscum inclinante, officulum oblongum crassum, & cavernosum, saporis subacris.

4. Myrobalanus Bellerica *Offic.* Ger. *Park.* Lauri folio subcinericeo *Jons. D.* Myrobalani rotundæ Bellericæ *C. B.* Bellericæ rotundiores *J. B.* Bellerische Myrobalanen. *Ufu.* Fructus rotundi, nonnunquam angulosi, Gallæ majoris magnitudinis, includentes officulum durum sub putamine carnosâ, saporis subacris & adstringentis.

5. Myrobalanus Emblica *Offic.* Ger. *Park.* Myrobalanus *Bent.* Emblica, foliis Securidacæ

*Breyn. 2. P. Nilicamaram H. M. Canna-Indica*  
*arboorea Zanon. Myrobalanifera foliis minutim*  
*incisis Jonsf. D. Myrobalani Emblicæ C. B. Embli-*  
*cæ in segmentis nucleum habentes angulosæ*  
*J. B. Alschfarbe Myrobalanen. Usa. Fructus ro-*  
*tundi, nigri, sessiles, sexangulares, includentes*  
*sub pericarpio carnosio, in sex partes per maturi-*  
*tatem dehiscente, ossiculum turgidum hexago-*  
*num senis cellulis insignitum, saporis acerrimi.*  
*Eligendi sunt carnosiores, ponderosiores. Vires.*  
*Myrobalani Citrini Bili flavæ educendæ apti nati*  
*sunt, Indi Bili atræ, Chebuli, Bellerici & Emblici,*  
*pituittæ ac postea Bili. Schrod.*

## X. De Jujuba.

*Note sunt, folia trinervia, flores herbacei vel lu-*  
*teoli, Fructus Olivares, seu nonnihil turbinati.*  
*R. Hist. p. 1533.*

1. *Jujuba Offic. Jujube Arabum sive Zizyphus*  
*Dodonæi Ger. Jujubæ majores oblongæ C. B. Zi-*  
*zyphus sive Jujuba major Park. Rutila Jonsf. D.*  
*Zizypha sativa J. B. Rother Brustbeerbaum. In*  
*Hispaniæ, Italiæ, &c. hortis colitur. Usa. Fru-*  
*ctus magnitudine Olivari, rutili colore, sapore*  
*passulas majores æmulantes, unicum ossiculum*  
*oblongum, utrinque acuminatum, continen-*  
*tes. Vires. Moderatè calef. & humectant. Usus*  
*præcip. in Pulmonum asperitate, Tussi, Pleuriti-*  
*de, Urina acri, fervescentia sanguinis, erosione*  
*Renum ac Vesicæ. Schrod.*

2. *Jujuba Indica C. B. Malus Maluccensis*  
*nonnihil spinosa ejusd. Jujuba Indica rotundifolia*



lia spinosa, foliis majoribus, subtus lanuginosis & incanis *Breyn. 2. P. Ber Indica* fructu Jujubino *J. B. Malus Indica Lusitanis, Ber & Bor A-costa Park, Peria - Toddali H. M. Lacca; Baum.* Reperitur in Malabar &c. *Ufu.* Gummi Lacca in Officinis nostris dicta triplex est, vel in ramulis, vel in granis vel in massis. 1. *Lacca in ramulis*, est substantia resinosa, dura & friabilis, superficie inæquali, quasi granulata, colore ruffo, sapore resinoso, odore dum accenditur grato. 2. *Lacca in granis.* Sunt grana resinosa, dura, & friabilia, rubicunda, pellucida, odoris & saporis præcedentis. 3. *Lacca in massis*, E Lacca in granulis purissima, liquata & in massas fusa conficitur, colore est rubente & propemodum transparens. *Vires.* Calefacit, attenuat, aperit, sanguinem purificat, sudorem eiet, diuretica est. *Ufus præcip.* in obstructionibus Lienis, Vesicæ, Fellis, Epatis & Pulmonum, & hinc in Hydrope, Ictero, &c. *Schrod.*

De generatione hujus Gummi diversæ sunt opiniones; Nam *Garzias ab Horto* à magnis Formicis alatis eam elaborari tadit, ut Apes mel conficiunt, materiam ex ipsa arbore exsurgentibus, quod etiam confirmat *Bontius*. Alii sponte ex arbore vel ejus ramulis & surculis exudare volunt, & demum solis vi in eam quam vidimus formam concreescere, cujus sententiæ sunt *J. Baubinus* & eruditissimus ille Botanicus *D. J. Raius* vicinus & amicus noster, cui & nos consentimus. Fiunt ex eadem Bacilli, quibus utimur in obsignandis literis.

## XI. De Corno.

**N**Ota ejus sunt, flores luteoli; Fructus oblongus, teres, seu cylindricus, officulo intus tereti, durissimo, angusta cavitate, spinis carere. K. Hist. p. 1536.

Cornus Offic. mas Ger. Park. Hortenus mas C. B. Jons. D. Sativa sive domestica J. B. Cornel-Baum. In hortis curiosorum non infrequens colitur. Martio floret. *Uss.* Fructus, Vires. Refrigerat, exiccat, astringit, constipat. Hinc convenit præcipue in Diarrhœa & Dysenteria. Schrod. Ardorem Febrilem & Sitim grata sua aciditate lenit ac restringit. R. H.

## XII. De Ceraso.

**P**ediculis fructus longis, fructu ipso brevior, & ad basin latiore rotundiorque, officulo pariter brevior ac tumidiore à Pruno differt. R. Synops. p. 229.

1. Cerasus rubra Offic. vulgaris Ger. Anglica Park. Sativa Jons. D. Cerasa sativa rotunda, rubra & acida, quæ nostris Cerasa sativa C. B. Acida rubella J. B. Rother Kirsch-Baum. In hortis colitur. Aprili floret. *Uss.* Fructus, Nucleus, & Gummi. Vires. Refrigerant, siccant, astringunt, Cor & Stomachum roborant. Hinc utilia in febrili siti ac æstu mitigando, &c. Nucleus calculeum comminuunt, &c. Gummi celebratur vi lithontriptica, Schrod.

2. Cerasus nigra Offic. major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente C. B. Sylvestris fructu nigro J. B. Schwarzer Kirsch-Baum. In sepibus. Aprili floret. *Uss.* Fructus, Vires. Temperata sunt, Cephalica, unde

& in morbis capitis, Apoplexia, Epilepsia, Paralyssi, &c. peculiariter proficua censentur.

### XIII. De Olea.

*Folis perpetuis, fructu racemoso, pulpa liquore pingui scatente, ossiculo duro scabro, à reliquis differt.*

R. H. p. 1540.

1. Olea Offic. sativa Ger. Park. C. B. J. B. Jons. D. Oliven-Baum. In calidis regionibus succrescit. Junio floret. *Usu.* Folia, Fructus immaturi, muria conditi. Olivæ autem conditæ sunt vel maximæ Hispanicæ prunis mediocribus æquales, & figura similes, quæ etsi succulentæ sint & carne multa, amaritudinem tamen insignem habent; vel minores, Lucenses; hæ dulciores sunt. Et Oleum vel ex fructu immaturo expressum, & Omphacinum Officinis dictum, vel ex fructu maturo & Completum dictum. NB. Oleum simpliciter ita dictum exprimitur ex olivis maturis, diciturque Oleum commune & Oleum Olivarum. De modo exprimendi Olei, vide R. H. *Vires.* Folia refrigerant & exiccant, astringunt. *Usus præcip.* in fluxu Alvi, Mensium, in Herpetibus & sim. *Fructus conditi,* comesti initio pastûs excitant appetitum, movent alvum, humentem ventriculum exiccant ac confortant. *Oleum completum* calefacit & humestat, emollit, digerit, vulnerarium est, alvum laxat, ariditatem Pectoris corrigit, tormina Ventris mitigat, Urinarios meatus laxat, erosos abstergit & consolidat. *Oleum omphacinum,* refrigerat, siccant, astringit. Schrod.



2. Arbor Brasiliensis gummi Elemi simile fundens, foliis pinnatis, flosculis verticillatis, fructu Olivæ figurâ magnitudine *R. H. p. 1546*. Icariba Brasiliensibus *Margg. & illius Gummi Icarica sive Elemni Pis.* An Prunifera Fago similis arbor Gummi Elemi fundens, figurâ & magnitudine Olivæ ex Insula Barbadosi *P. P. Tab. 217*. Arbor ex Surinama, sive Americana, Myrti Laureæ foliis, Elemi resinam fundens *Breyn. 2. P.* Gummi Elemi Officinarum *C. B. Elemi Park.* Elemi resina *J. B.* In Nova Hispania & alibi in India Occidentali crescit. *Ufu.* Gummi seu potius Resina pellucida, pinguis, ex flavo albicans, cui inest aliquid viridiusculi, in massam redacta, suavem accensa halans suffitum. *Vires.* Calefacit, emollit, digerit, resolvit, maturat, dolorem sedat, capitis ac nervorum affectibus, eorundemque vulneribus, ac imprimis calvariæ vulneratæ specificè confert; contusionibus articulorum prodest, Menses ac Urinam ciet. *Schrod.*

Arborem Elemniferam alteram vide apud sagacissimum Botanicum Leonardum Plukenetium in *Phytograph. T. 173. F. 5.*

#### XIV. De Anacardio.

**N**ote sunt, Folia geminata, glabra, Flosculi exigui, tetrapetali, lutei, racematim dispositi, Fructus conoides.

Anacardium Offic. *Ger. Park. C. B. J. B.* Orientale *Jons. D.* Oepata *H. M. Tom. 4.* Arbor Indica fructu conoide, cortice pulvinato nu-

cleumunicum, nullo officulo tectum, claudente *R. H. p. 1566.* Anacardien oder Elephantens Laubbaum. In India Orientali crescit. *Ufu.* Fructus compressus aviculæ cordis figura, nigricans ac splendens, includens sub duplici involucro corticoso & duro nucleum albicantem saporis subdulcis & inter involucri duplicaturam mucaginem oleosam, nigram, saporis acris ac exurentis. *Vires.* Calefacit & siccatur, Cephalicus est, memoriam ac sensus acuens ac confortans. *Schrod.* De facultatibus Anacardii multum inter Authores controversatur, de quibus consule *R. H. p. 1813.* NB. Rarò in Officinis nostris invenitur hic Fructus, cujus in loco *Anacardium Occidentale* *Jonsonii* substituant, ut loco sequente ostendimus.

## XV. De Anacardio Occidentali.

*Note sunt, Folia oblonga, glabra, sine ordinæ ramis adherentia, flosculi pentapetali, racematim dispositi, fructus pyriformis, nuce reniformi summo innascente.*

Anacardium Occidentale *Jonsf. D.* Occidentale Cajous dictum officulo reni leporis figura *Herm. Cat.* Anacardii alii species *C. B.* Cajous *Ger. Park. J. B.* Arbor Acajou, vulgò Cajou *Pis. Mant. A.* Acaiaiba *Marceg. Pis. H.* Kapamara *H. M. Tom. 3.* Pomifera seu potius Prunifera Indica nuce reniformi summo pemo innascente, Cajous dicta *R. H. p. 1694.* In Malabar & Brasilia provenit. *Ufu.* Nuces reniformes, foris fusci & duri, nucleum album, Amygdalæ dulcis sapore, substantia molliore includentes. *Vires.* Ventrículum roborant, fermentationem  
juvant,

juvant, necnon vomitum & nauseam tollunt, Venerem stimulant, &c. R. H. p. 1649. N. B. 1. In Officinis nostris pro Anacardio vero venduntur. 2. Sunt qui terram Japonicam succum condensatum hujus plantæ esse affirmant, quorum errorem in capite de Palma refutavimus.

## SECTIO SEPTIMA.

### *De Arboribus Bacciferis.*

**B** Accan. voco, fructum minorem pericarpio seu pulpa humida donatum, cui semina seu nuclei includuntur vel solitaria, vel bina, terna, quaterna aut plura. R. H. p. 1568.

Arbores & Frutices bacciferæ sunt vel

Singulis acinis singulis floribus succedentibus, suntque vel fructu

Monopyreno, seu unicum intus nucleum claudente, exque vel

Erectæ, foliis

Perpetuis seu semper virentibus,

Compositis ex pluribus pinnarum conjugationibus;

Impari folio alam claudente, foliis majoribus, arboreque resinifera, flosculis stamineis

Summis ramulis insidentibus; *Balsamum.*

E tuberculis, è ramulorum lateribus exeuntibus; *Terebinthus.*

Nulla in extrema costa impari folio; *Lentiscus.*

Simplicibus

Parasitici nonnullis dicti, qui alienâ scilicet quadrâ vivunt, baccis magis sparsis, aliisque plantis innascuntur; *Viscus.*

Telluris solius alumni, foliis majoribus



Oblongis, flore & fructu ad foliorum  
 alas, baccis

Oblongis, foliis latis, glabris, facultate  
 Cathartica, violenta & maligna;  
*Laureola.*

Rotundis parvis; majores & elatio-  
 res; *Asa-fœtida.*

Cordiformibus, floribus monopetalis,  
 quinquepartitis, racematim confertis;  
*Cocculus Indus.*

Erectis, ensiformibus, Iridis in modum;  
*Draco Arbor.*

Deciduis

Simplicibus, longis, vi purgatrice violenta &  
 maligna, floribus & baccis in singulis pe-  
 diculis singulis; *Mezereon.*

Compositis seu pinnatis, floribus racematim  
 congestis, granis orbiculatis, Lenticulæ  
 modo compressis; *Rhus.*

Scandentes, baccis rotundis sapore aromatico;  
*Cubeba.*

Polypyreno suntque vel

Dipyreno, i. e. duos nucleos feminave continen-  
 te, vel

Non spinosæ, foliis

Pinnatis, impari numero, flore ex oblongo  
 tubo in quinque lacinias expanso, odora-  
 to; *Jasminum.*

Simplicibus, floribus & fructibus in

Racemos congestis, viminibus lentis, te-  
 nuibus; foliis angustis, longis, glabris,  
 obscure virentibus, floribus albis, bac-  
 cis nigris; *Ligustrum.*

Singulis pediculis singulis, raries disposi-  
 tis, foliis latis, subrotundis Alni, bac-  
 cis nigris vi cathartica; *Frangula.*

Spinosæ, foliis simplicibus integris, fructu ob-  
 longo, parvo, per maturitatem rubro, sapo-  
 re acido, racematim nascente; *Berberis.*

b Tripyreno, foliis pinnatis deciduis, floribus albis, quinquemfoliis, umbellatim ferè dispositis, odore gravi; *Sambucus*.

Tetrapyreno, i.e. singulis acinis quatuor feminas seu nucleos continentes, suntque vel

Scandentes, capreolis vel claviculis; fructu in racemis dulci, & succulento; *Vitis*.

Erectæ, foliis simplicibus

Perpetuis, seu semper virentibus, latis, aculeatis ad margines, baccis rubentibus, quatuor in singulis granis, duris, triangularis, striatis; *Agrifolium*.

Deciduis

Spinosæ, fructu rotundo, foliis brevioribus & latioribus Pruni, baccis per maturitatem nigris; *Spina Cervina*.

Non Spinosæ, ramulis

Rotundis, foliis angustis serratis, fructu tetracocco spadiceo; *Thea*.

Tetragonis, baccis per maturitatem rubris tetracoccis; *Euonymus*.

Nucleos incerto numero aut nobis saltem incognito continentes, sunt vel foliis

Alternatim positis, floribus tetrapetalis; *Caparis*.

Quaternis, baccis oblongis, arboreque resinifera; *Caranna*.

Pluribus acinis confertis ad singulos flores, foliis deciduis, floribus etiam pentapetalis, speciosis, spinosæ; *Rubus*.

His addi possunt *Santalum album* & *citrinum*, atque etiam *Myrrha*, quæ à multis in plantarum cognitione peritissimis, *Baccifera* esse affirmantur, quamvis nobis hæcenus incognitæ sint.

*Arbores*

## Arbores & Frutices Bacciferae, fructu monopyreno.

### I. De Balsamo.

**N**Otae sunt, *Folia alata impari numero, semper vi-  
rentia, flosculis staminibus, summis ramulis insiden-  
tibus.*

Balsamum Judaicum, Gileadenſe, è Mecha-  
verum & Opobalsamum seu Oleum Balsami ſive  
Balsamelæon Offic. Balsamum Alpini Ger. Genui-  
num Antiquorum Park. Syriacum Rutæ folio  
C. B. Verum J. B. Der rechte Balsam-Baum.  
In Syria & Arabia Fœlice ſuccreſcit. Uſu. Li-  
gnum, ſeu ramuſculi *Xylobalsamum* Offic. Sunt  
autem ramuli exoleti, contorti, nodosi, & bra-  
chiati, digitali craſſitie, duplici cortice intecti,  
exteriore tenuiore, rugoſo, cinereo, interiore  
craſſiore, fuſco, ſaporis & odoris nullius. Rarò  
in Officinis invenitur, cujus in loco Pharmacop-  
olis Londinenſibus *Lignum Lentiscinum* vendi-  
tur. *Fructus* ſeu *Carpobalsamum* Offic. Die Frucht  
vom Balsam-Baum. Sunt baccæ oblongæ, pe-  
diculo brevi donatæ, cortice rugoſo, fuſco, qua-  
tuor coſtis diſtincto, odore & ſapore grato. Ra-  
rò in Officinis noſtris invenitur, cujus in loco  
Pharmacopolis Londinenſibus *Fructus Caſſiæ  
Coryophyllatæ* vel *Pimentæ* venditur, *Reſina* ſeu  
*Opobalsamum* Offic. Subſtantia eſt liquida, oleo-  
ſa, limpida, albicans, ſaporis acris & aromatici,  
odoris fragrantis. *Vires.* Lignum & Fructus  
cerroborant Ventrículum. Balsamum inter  
olea



ca quævis & balsama omnium est laudatissimum, præstantissimum, ac toto orbe maximè celebratum, utpote quod vires habeat abigenis morbis tam internis quàm externis nulli medicamento secundas. Consert febricitantibus, asthmaticis, Jecoris obstructions solvit, Menfes movet, Stomachi dolores sedat, Phthicos juvat, appetitum excitat. *Schrod. N. 1.* Carpobalsamum atque Xylobalsamum, quia non nisi in compositionibus quibusdam veterum adhibentur, prostant rarò, atque non nisi vetustate obsoleta, unde loco Carpobalsami Cubebas vel Pimenta adhibere receptum est, loco Xylobalsami Lentiscum recentem. 2. Si guttula Opobalsami aquæ tepidæ immittatur, per totam superficiem sese extendit, ac rursum qua refrigerata sese contrahit, inquit *Schrodeus*. Qui plura de Balsamo velit, *Lobelium* consulat, qui integrum de eo libellum conscripsit & *Alpinum*, qui Dialogum de Balsamo reliquit; et *Veslingii* Opobalsami Vindicias. It. *Valckneri* Examen Opobalsami.

## II. De Terebintho.

**N**ota sunt, Folia pinnata impari numero, decidua, flosculi flaminei tuberculis ramulorum in longis racemis.

Terebinthus Offic. Ger. J. B. Vulgaris C. B. Angustiore folio vulgatio *Park.* Serpentina Baum. In Insula Chio, Cipro, & alibi oritur. Aprili floret. *Uzu.* Resina substantia est resinosa, fluida, Larica autem crassior, pellucida, colore candido subflavo, vitreo, odore grato & suavis sapore.

sapore acri amaricante. Ex Chio quæ præfer-  
 rur & Cypro ad nos transportatur. *Vires.* Con-  
 fert intrinsecus præcipuè in Tussialiisque Pul-  
 monum affectibus, in Urina ac alvo cienda,  
 convenit Epatis, Lienis, Renibus, Vesicæ, expe-  
 ctorationi purulentæ ac Pleurisi incipienti suc-  
 currit, calculum pellit, Arthriticos affectus ju-  
 vat. Uterum à saburra liberat. *Schrod.*

### III. De Lentisco.

*Foliis pinnatis, sempervirentibus, flosculis stamineis  
 ex foliorum alis egredientibus à reliquis differt.*

Lentiscus *Offic. Ger. Park. J. B. Vulgaris C. B.  
 Mastix-Baum.* In Insula Chio copiosè prove-  
 nit. Martio vel Aprili floret. *Ussu.* Lignum seu  
 ramuli nodosi & brachiati, digitali crassitie, in-  
 ternè albi, cortice cinereo tecti, saporis & odo-  
 ris resinosi. Resina *Mastiche Offic. Mastix.* Ari-  
 da est, pellucida, ex flavo pallescens, in guttas  
 concreta, saporis resinosi & adstringentis, odo-  
 ris fragrantis. Optima censetur odorata, can-  
 dida, splendens, adulta, retorrida, friabilis, syn-  
 cera, stridens. *Vires.* Lignum siccatur & adstrin-  
 git, valet ad sanguinis rejectiones, Uteri ac alvi  
 profluvia & Dysenteriam, in Uteri ac Ani pro-  
 cidencia: nomas arcat, urinas ciet, dentes mo-  
 biles firmat. *Dioscorid.* Gummi calefacit, siccatur,  
 substringit, emollit, ventriculum roborat;  
*Ussu* præcip. in Vomitu, nausea ac fluxu alvi  
 compescendo. Obtundit ac corrigit purgan-  
 tium acrimoniam, roborat caput, nervosumque  
 genus, exspuitioni sanguinis ac Tussi mede-  
 tur, &c. *Schrod.*

## IV. De Visco.

**P**lanta est parasitica, seu Frutex arboribus aut fruticibus aliis innascens, baccifera, monopyrenos, semper virens. R. Synop. p. 224.

Viscum Offic. Ger. Vulgare Park. Baccis al-  
 is C. B. Viscus Quercus & aliarum arborum  
 B. Missei. Multis arboribus adnascitur. Præ-  
 sertim Quernus. Veris initio floret. Usu. Li-  
 num. Vires. Ligni usus præcip. ac specificè in  
 epilepsia, Apoplexia & Vertigine. Arcanum  
 tiam est contra Pleuritidem R. Hist. p. 1584.  
 Viscum ad aucupia ex hujus fruticis baccis ali-  
 quibus in locis parabatur, hoc modo. Baccas  
 in aqua decoquunt donec disrumpantur, postea  
 contundunt in mortario, & tamdiu in aqua fons-  
 tana lavant quousque fursuracea excrementa  
 eximant. Quod apud nos in usu est Viscum  
 aucuparium è cortice Agrifolii fit, ut suo in lo-  
 co ostendimus.

## V. De Asa Foetida.

**P**lanta est sarmentosa, ferè ut Salix aquatica, Bon-  
 tio. Foliis parvis Orgza similibus Mandelslo.  
 Philyrrea Species est nonnullis.

Asa Foetida Offic. C. B. Park. Nostras Offici-  
 narum J. B. Altith Bont. Teuffeis Drect. Usu.  
 Gummi est substantiæ resinosaë, aridioris, cera  
 instar lentum ac sequax, ex variis splendenti-  
 bus granis, externè incarnati coloris, internè  
 albicans, in massam coactum, saporis acris &  
 nauseosi, odoris gravis, Allium redolentis. Duæ  
 hujus prostant species, una impura & turbida,  
 altera



altera pura & translucens, hæc à lacte sponte effluente, illa torculari expressa. Ex India Orientali & aliunde ad nos transportatur. *Vires*. Calefacit, incidit, &c. Usus internus præcipuus in suffocatione Uteri, Peripneumonia ac Vulneribus, aliàs raro adhibetur. Extrinsecus in tumido Lieni, Uteri suffocatione, &c. *S. brodiae*. Cujusnam plantæ succus sit Asa Foetida, inter eruditos & rei Botanicæ peritissimos diu multumque disceptatum est. Nonnulli Benzoinum & Alam unum idemque gummi genus esse volunt, quod è caulibus aut radicibus Lasericis vulneratis effluit, differentiam omnem loco natali deberi. Alii Asam Foetidam à quadam Ferulæ specie produci contendunt. *Bontius* notis in *Garciam ab Horto* p. 41. Duas dari plantarum species Asam Foetidam suppeditantes affirmat. Prima (inquit) sarmentosa est, ferè ut *Salix aquatica*, ex cujus stolonibus incisis Asa Foetida per torcular exprimitur, quæ ut reliqui succi, sole indurata, in consistentiam evadit. Secunda species longè foecundior existit, estque succus expressus ex plantæ cujusdam radicibus crassissimos Raphanos referentibus, quæ folia *Tithymali* habet. *D. Mandelslo* qui in Persia peregrinatus est, duo etiam Asæ Foetidæ succo prægnantium plantarum genera agnoscit, verum ea paulò aliter describit. Alterum fruticosum seu sarmentosum foliis parvis *Oryzæ* similibus. Alterum Rapi folio, colore viridi, folio *Ficum* referente. Hinc nonnulli, posteriorem *Bontii* descriptionem sequuti, Plantam Asæ Foetidæ pro-

rodutricem, Tithymali quandam speciem  
se statuunt, Alii, iique, totius materiæ me-  
icæ appriinè gnari, quique in Orientalibus  
regionibus diu commorati sunt, Phillyreæ spe-  
iem esse volunt; in quorum sententiam nos  
uoque propendemus, atque idcirco hunc ei  
cum assignavimus.

## *VI. De Laureola.*

*Nota sunt, Flores monopetali in quatuor laciniis  
acuminatas expansi, bacca monoppyrena, viz acris  
& cathartica. R. H. p. 1587.*

1. Laureola *Offic. Ger. Park.* Semper virens,  
ore viridi, quibusdam Laureolamas C. B. Sem-  
er virens, flore luteolo J. B. In sylvis & se-  
ibus. Februario floret. *Ussu.* Cortex, Folia,  
bacca oblonga, nigra. *Vires.* Laureolæ vis est  
gnea, acerrima, exulcerans, mordens, febres  
ccendens, cordis principumque partium vi-  
es exolyens, validissime bilem, biliosasque se-  
ositates purgans. Corrigitur macerando in  
acidis. *Schrod.*

2. Mezereon & Chamælæa *Offic. Chamæ-  
æa Germanica sive Mezereon Ger. Germanica,  
sive Mesereon vulgò Park.* Laureola folio deci-  
duo, flore purpureo, Officinis Laureola scæmi-  
na C. B. Folio deciduo, sive Mezereon Germa-  
nicum J. B. Kellers Hals / Seidelbast. In hortis  
colitur. Vere floret *Ussu.* Cortex, Folia & Bac-  
cæ rubentes. *Vires.* Cum Laureola viribus con-  
venit.

3. Thymelæa *Offic. Ger. Park.* Foliis Lini C. B.  
Monspeliaca J. B. In hortis Botanicorum co-  
litur.

litur. *Ufu*. Baccæ, Grana Gnidia dictæ. *Vires*. Ardens & fauces adurens vis inest. N. B. Hujus fructum Coccum seu Granum Gnidium Antiquorum Botanici peritiores & etiam Officinæ nostræ Anglicanæ existimant; quamvis *Cordo* & *Schrodero* baccæ Mezerei Grana Gnidia Officinarum esse affirmantur.

## VII. De Rhoe.

*Foliis pinnatis, floribus racematim congestis, granis orbiculatis, Lenticula modo compressis à reliquis differt. R. Meth. p. 50.*

1. *Rhus obsoniorum* & *Sumach Offic. coriaria* Ger. Folio Ulmi C. B. Sive *Sumach* J. B. *Sumach* sive *Rhus obsoniorum* & *coriariorum* Park. *Gerber Baum*. In hortis curiosorum colitur. *Ufu*, Baccæ seu Grana orbiculata, villosa, parva, rubentia, seu coccinea, includentia nucleum seu semen orbiculatum spadiceum, saporis astringentis & terrestris. *Vires*. Refrigerat, siccatur, astringit. *Ufus præcip.* in fluxu alvi, Uteri seu mensium, Hæmorrhoides compescit, bilem obtundit. Extrinsecus resistit putrefactioni ac Gangrænæ. *Schrod.* NB. *Rhus Obsoniorum*, *Coriariorum*, & *Rubeum* apud Galenum non sunt arbores specie diversæ, sed *Rhus Obsoniorum* nihil aliud est quàm fructus; *Coriariorum* quàm folia & fruticis ramusculi; *Rubeum* quàm ejus semen immaturum, ut nos monuit eruditissimus ille Botanicus D. J. Raius, quibus & nos consentimus,

2. *Resina Copal Offic. Schrod. Copal C. B. J. B. Gummi Copal Park.* Copalli quahvit patlahoca sive Arbor Copallifera latifolia sive

II. Hern.



*H. Hern.* An Rhus Virginianum Lentisci foliis  
*R. H. p.* 1799. Rhoë Obfioniorum fimilis Ameri-  
 cana, Gummi candidum fundens, non ferrata,  
 foliorum rachi medio alata *P. P. Tab.* 56. Re-  
 fina eft duriufcula, admodum candida, vel ex  
 albo flavefcens, pellucida, bene odorata, in  
 maffam redacta. Ex vuinerata arbore gutta-  
 tim ftillat. Afportatur ex Nova Hispania &  
 aliunde Indiæ Occidentalis. *Vires.* Calefacit,  
 humectat, emollit, refolvit. *Ufus præcipuè in*  
*affectibus cephalicis. Schrod.*

Quamvis, referentè *Pifone*, refinæ omnes  
 odoratæ & gummi Indis Copal nomine deno-  
 tentur; *Hernandez* etiam octo Copalliferarum  
 arborum fpecies describat, proculdubio ta-  
 men Gummi illud quod in Officinis noftris Co-  
 pal nomine venit, Copalliferæ fecundæ five  
 Copalli quahvitl patlahoca *Hern.* emanatio eft;  
 quæ fortè eadem eft arbor cum Rhoë Virgini-  
 na Lentisci foliis *R. H. p.* 1799. Nec fpecie fed  
 accidentaliter tantum ab ea differt, ut in aliis  
 plantarum fpeciebus, loci refpectu, insignis  
 varietas perfæpe occurrit; fiquidem eruditif-  
 fimus, idemque ingeniofiffimus vir *D. Leonardus*  
*Pluckenetius*, M. D. affirmat fe ex hoc frutice  
 gummi album Copal noftro non abfimile col-  
 legiffe.

*Monardes* fub titulo Copal opinione noftre  
 Gummi Animæ describit; Animæ autem Oc-  
 cidentalis appellatione Copal.

At neque *Copaiba Pifonis* arbor illa eft quæ  
 Gummi Copal producit, ut *Paulus Ammannus* in

Manuductione sua ad Materiam Medicam p. 138. affirmat. Resina enim quam arbor illa suppe-  
ditat, *Balsamum Copaivi* Officinarum nostrarum  
est, ut suo in loco ostendam: Forte *Resina Car-*  
*thaginensis Monardi* p. 330. fuerit: de quo tamen  
*Paulus Aeginetus* prædictus dubitat.

### VIII. *Draco arbor.*

*Foliis Iridis semper virentibus, fructu flavescente, à  
reliquis differt.*

*Draco arbor* Ger. *Park. C. B. J. B. Ezquahvilt*  
*Hern.* *Palma prunifera foliis Juccæ*, è quâ san-  
guis *Draconis* officinar. *Commelin. Hort. Amstelo-*  
*dam.* *Drachen-Baum.* In *Insula Portus Sancti*  
quæ è *Canariis* una est & *Madera* oritur, *Uss.*  
*Gummi Sanguis Draconis Offic. Drachen-Blut.*  
*Resina* est obscura, rubra, igni admota facile  
liquefscens, inque eum coniecta flammam  
concipiens, attritu colorem rubrum sangui-  
neum reddens, saporis resinosi & adstringen-  
tis. Duplex in Officinis invenitur quæ puri-  
tate & impuritate tantum differunt; Opti-  
mum censetur quod in guttulis foliis involutis  
adfertur. *Vires.* Exiccac strenuè, astringit,  
repellit. *Ussus* ejus est præcipuus extrinsecus  
in exiccandis Catarrhis, in Hæmorrhagia  
stenda, vulneribus glutinandis, dentibus laxis  
stabiliendis. *Schrod. N. B.* Sanguinem *Draconis*  
*Recentiorum* *Cinnabarin Dioscoridis* esse do-  
cti plerique existimant. *Cinnabaris recentio-*  
*rum Antiquorum* est *Minium R. H. p. 1598.*

## IX. De Cocculo Indo.

**N**Otæ sunt, folia cordiformia; Flores monopetalî quinquepartiti, candidi, fructus racematim confertus.

Cocculus Indus Offic. Park. Cocculæ Officinæ C. B. Cocci Orientales Ger. J. B. Natsta-tam H. M. Tom. 7. Arbor Indica Cocculos Offi-cinarum ferens Breyn. 2. P. Indianische Nüsselein. In Malabar crescit. Usu. Fructus renis fere figura, baccarum Lauri magnitudine sed rotun-diore, fusco & rugoso cortice exteriori tectus, saporis amaricantis. Vires. Perniciosa & dele-teria qualitate prædita sunt. His utuntur Pi-scatores, ad capiendos pisces, de quibus Codron-chius peculiarem scripsit Libellum. Contra pe-diculos etiam commendantur.

## X. De Cubebis.

**C**Ubebæ Offic. Ger. Park. J. B. Vulgaris, nec Arabum Cubebæ, nec Galeni Carpesium C. B. An Pindaiba, nonnullis Ibira Pi. ? Arbor baccifera Brasiliensis fructu Piper resipiente. R. H. p. 1593 ? Arbor Bisnagarica Myrti amplioribus foliis, per siccitatem nigris, Cubebæ sapore P. P. Tab. 140. Cubeben. Usu. Baccæ quæ Piperi simi-les, interdum paulò majores sunt pediculo lon-go donatæ, cortice fusco, rugoso, nucleo subje-cto exiguo, rotundo, foris nigricante, intus al-bo, sapore & odore suavi, aromatico, acri. Ad-vehuntur ex Java Indiæ Orientalis Insula, ubi decoquuntur, inquit Schroderus, antequam ven-dantur ne apud exteros plantentur. Præstant



maiores, recentes, ponderosæ. *Vires.* Calefaciunt & exiccant, attenuant, discutiunt, viscera omnia roborant, Lienem juvant, flatus discutiunt, cerebrum roborant, & frigidis Uteri affectibus auxiliantur.

Quid sint Cubebæ, adhuc ambigitur: alii ex genere Piperis, & nigro Piperi congeneres esse, *Theophrastoque* Piper rotundum dici volunt: alii Viticis Fructus existimant: *Sylvaticus*, Rusci seu Oxymyrines fructum facit: alii Carpesium *Galen*i statuunt: *Cesalpinus* Amomi legitimi fructum pronunciat: Cubebæ autem neque Piperis genus sunt, neque Viticis, neque Oxymyrines, neque Carpesii, neque Amomi legitimi semen, aut fructus, ut facile esset ostendere. Est autem inquit *Schroderus* (quibus & nos consentimus, donec certiores facti fuerimus) fructus racemosus, arboris cujusdam Malo vulgari similis, foliis verò Piperis, sed angustioribus.

## *Arbores & Frutices fructu dipyreno.*

### XI. De Jasmino.

**F**lore ex oblongo tubo in quinque laciniis expanso totidem folia æmulantes, perquam odorato, foliis pinnatis, bacca dicocca ab aliis differt.  
R. H. p. 1599.

Jasminum *Offic.* Ger. Park. P. Vulgatius flore albo C. B. Sive Gelseminum flore albo J. B. Weisse Jasminen. In hortis colitur, Estate flores.

ret. *Ufu.* Flores. *Vires.* Digerit, calefacit, emol-  
lit, aperit. *Ufus* præcipuus internus ad Uterum  
calefaciendum & laxandum, ejus Scirrhum sa-  
nandum, & partum facilitandum, ad tussim an-  
helitusque difficultatem, ad Pleuritidem, dolo-  
res Stomachi, intestinorum, Uteri, &c. *Schrod.*

## XII. De Ligustro.

*FLoribus racemosis albis, baccis nigris dipyrenis, vi-  
minibus lentis ab aliis fruticibus distinguitur. R.*  
*Synop. p. 226.*

1. Ligustrum *Offic. Ger. J. B. Vulgare Park.*  
*Germanicum C. B. Hartriegel / Beinholtz / Hecks-  
Holtz.* In sylvis & sepibus. Floret tota ferè  
æstate. *Ufu.* Folia, Flores. *Vires.* Refrigerant  
& siccant, astringunt, incidunt, proin condu-  
cunt ad inflammationes, putredines, exulcera-  
tiones oris, & faucium, ad procidentiam & tu-  
morem uvæ, laxitatem gingivarum, &c. *Schrod.*

2. Alcanna *Offic. Ligustrum Orientale, sive  
Cyprus Dioscoridis & Plinii Park. Ægyptiacum  
latifolium & angustifolium C. B. Ægyptium  
Cyprus Græcorum, Elhanne Arabum J. B. Li-  
gustri-species I. & II. Alcanna dicta Bont. Elsen.*  
In India Orientali, Ægypto & Syria crescit. *Ufu.*  
Folia & Flores; sed in Officinis nostris nun-  
quam inveniuntur, quia diu non durant, ergo  
eorum loco radicem Anchusæ sumunt. *Vires.*  
multæ attribuuntur à *Dioscoride* & aliis huic  
plantæ, sed cum nullius in Officinis nostris  
usus sit, de ea plura dicere supersedeo.

## XIII. De Frangula.

**F**oliis latis subrotundis, baccis nigris, vi cathartica, ab aliis fruticibus discretu facilis est. R. H. p. 1604.

Frangula & Alnus nigra Offic. sive Alnus nigra baccifera Park. Alnus nigra sive Frangula Ger. Nigra baccifera C. B. J. B. Faul: Baum / Laub: Baum. In sylvosis udis. Majo floret. *Ufu*, Cortex. *Vires*, Purgat humores noxios omnes, maximè serum, tam per vomitum quàm per secessum, idque sat violenter. Schrod. Tritus cum aceto, & icubiei illitus, intra paucos dies illam sanat & exsiccat. R. H.

## XIV. De Berberi.

**S**pinis acutis, fructu parvo, oblongo, rubro, sapore acido racematim nascente, cortice candicante, à reliquis facile distinguitur. R. Synop. p. 226.

Berberis & Oxyacantha Galeni Offic. Berbaris Park. Dumetorum C. B. Vulgò, quæ & Oxyacantha putata J. B. Spina acida sive Oxyacantha Ger. Erbsel / Gaus: Dorn. In collibus cretaceis, & in sepibus. Majo floret. *Ufu*. Cortex, Fructus, & Semina. *Vires*, Cortex aperit, incidit, hinc in Ictero convenit. *Fructus*, Refrigerant & humectant, partium sunt tenuium, astringunt, appetitum excitant, roborant ventriculum ac Epar. Proin usus sunt frequentissimi in morbis, ubi refrigeratione & astringione opus. Schrod. In febribus sitim extinguunt,



*Arbores & Frutices bacciferae fructu  
tripyreno.*

*XV. De Sambuco.*

**F**lore & fructu in umbellas aut racemos compo-  
sito, foliis alatis, ramis medulla plurima fardis,  
paucò ligno, ab aliis facile distinguitur. R. H.  
pag. 1609.

1. Sambucus Offic. Ger. vulgaris Park. J. B.  
Fructu in umbella nigro C. B. Hollunder. In  
sepibus. Majo floret *Usu*. Cortex, Folia, Gem-  
mæ, Flores, & Baccæ. *Vires*. Sambucus inte-  
gra calefacit & siccatur, resolvit, Hydropicos ju-  
vat. Cortex educit serosos humores. Folia &  
gemma alvum movent. Flores discutunt, emol-  
liunt, resolvunt, sudoriferi ac anodynii sunt.  
Baccæ sudoriferæ itidem sunt ac alexipharma-  
cæ. Schrod. De viribus & usu Sambuci integrum  
librum conscripsit Martinus Blockwitzius cui titu-  
lus *Anatomia Sambuci*.

2. Ebulus & Chamææte Offic. sive Sambu-  
cus humilis. Ger. Park. Sive Sambucus herbacea  
J. B. Sambucus humilis sive Ebulus C. B. Ad  
vias publicas. Junio floret. *Usu*. Cortex, Fo-  
lia, Baccæ. *Vires*. Cortex aquosos & serosos  
humores totius corporis per alvum educit.  
Folia & Baccæ vi pollent ad Podagricos dolores  
sopiendos, tumoresque aquosos discutendos:  
Easdemque vires obtinent quas Sambucus. Vim  
habent educendi aquam, conferunt igitur in  
Hydrope, Arthritide, ceterisque morbis à sero  
natis. Schrod.

## Arbores & Frutices Bacciferae fructu tetrapyrreno.

### XVI. De Vite vinifera.

**F**rutex est sarmentosus, scandens, & capreolata, foliis angulosis, incis, fructu racemoso tetrapyrreno.

1. Vitis & Pampinium Offic. Weinstock. In hortis colitur. Usu. Folia cum capreolis, Succus seu Lacryma, Vinum, h. e. succus uvarum maturarum fermentatus, cujus variae in Officinis habentur species, quae quamvis sententia nostrâ ex una & eadem uvæ specie fiunt, respectu tamen tum loci natalis, tum parandi modorum plurimum differunt, Sunt autem vel Hispanica multorum generum, v. g. 1. Canariense, Canariseck. 2. Malacense, Mallagasseeck. 3. Xeranthum. 4. Alonense, Alicanten-Wein / vulgò, Rint-Wein dictum. 5. Portuense, Port à Port-Wein. Idque vel album vel rubrum. Vel secundò Gallica, Bransch Wein / album, weisser Wein / rubrum Claretum dictum Claret. Tertio, Germanica seu Rhenana, Rheinisch Wein. Quarto denique Cratica seu Moschellina rubra Rother Muscat-Wein / quæ pro Alonensi vulgò vaneunt. NB. Quod ad Vinum album efficiendum mustum è facibus, hoc est, caulibus & siliquis seu vinaceis cum gigarti exprimitur illico: ad rubrum verò, succum unâ cum facibus in dolio aliquamdiu restare sinunt, donec colo-

colorem & saporem acquisiverit. Acetum  
 Efig / fit ex vino vel in loco minus calido de-  
 tento, vel diutius reservato, vel Soli exposito.  
 NB. Acetum non tantum è vino sed etiam è  
 Cerevisia insolatione, &c. fit. Tartarus, Wein-  
 stein / Salis species est, substantia sabulosa, indur-  
 ata, quæ fundo & lateribus vasorum vinario-  
 rum accrescit, multis intermixtis rubicundis  
 micis, saporis subacris acidi: estque vel albus  
 qui magis æstimatur, ut purior & minus terra-  
 stris, vel ruber; optimus è Germania adfertur.  
 Uvæ immaturæ seu Agrestæ, & Acini uvarum.  
 Vires. Folia capreolique refrigerant, astringunt  
 validè. Usus præcip. in Dysenteria, Vomitu,  
 Pica, expuitione Sanguinis, aliisque Hæmorrha-  
 giis sistendis. Succus ex amputatis palmitibus  
 exstillans intrinsecus vim habere creditur atte-  
 rendi & expellendi calculum: Extrinsecus O-  
 culorum caligini medetur ac rubedini, Impeti-  
 gines sanat. Uvæ immaturæ refrigerant & sic-  
 cant, astringunt. Proin poterit esse usus earum  
 in Febribus ardentibus, excitant scil. appetitum,  
 fluxum ventris sedant. Acini vim habent astri-  
 ctoriam, conveniuntque in Vomitu, Alvique  
 fluxu. Schrod. Vinum, nunc dierum vina auste-  
 riora quamvis palato minus arrideant. ventri-  
 culo tamen commodiora & cibo concoquendo  
 magis idonea censentur, quàm alba, quæ lenia  
 & dulcia: Canarinum autem omnium lauda-  
 tissimum, generosum & lene, naturæ amicum  
 R. H. p. 1617. Qui plura de Vino velit, legat An-  
 drea Baccii eruditissimum opus de Vini gene-  
 ribus



ribus Anno 1596. *Romæ* impressum. it. *Sachsium*  
*de Vite Vinifera*. Acetum partium tenuium est,  
 attenuat, penetrat, astringit, putredini resistit,  
 sudorem ciet, appetentiam cibi excitat, & con-  
 coctionem promovet, æstum febrilem compe-  
 scit, putredinem arcet, &c. Extrinsicus Scabi-  
 em, Pruritus, Herpetem, &c. sanat. *Tartarus*  
*Vini* attenuat, incidit, aperit. Qui plura de  
 Tartaro velit Chymicos scriptores consulat;  
 plenam enim ejus historiam scribere mihi nec  
 animus nec opportunitas est.

2. Uva passa major *Offic.* passa major, *Σέπων*  
*Græcis* fortè *C. B. Grosse Rosinen*. Ex Hispania  
 ad nos transportantur, eas autem hoc modo  
 exsiccant, Botrorum seu racemorum quos ad  
 hunc usum destinant, pediculos ad mediam par-  
 tem transversim incidunt, adeòque succi nutri-  
 tii magnam partem intercipientes impediunt,  
 ne ad uvas copiosè affluat, sed parcè admodum  
 derivetur. Racemos semisectos in vite penden-  
 tes relinquunt, donec paulatim calore solis &  
 alimenti inopiâ exsiccentur: cum sufficienter  
 exsiccatos senserint demetunt & in vase recon-  
 dunt. *Vires*. Calidæ sunt seu temperatæ, le-  
 niunt, alvum laxant, acrimoniam hebetant, ven-  
 triculo, Pulmonibus ac Epatis gratæ sunt. Tus-  
 sim mitigant. *Schrod.* Pro modo præparandi  
 Uvas passas *V. Rati Itinerarium*.

3. Uvæ passæ minores & Passulæ *Offic.* passæ  
 minores, vel Passulæ Corinthiæ *C. B. Corin-  
 thiæ Park.* Vitis Corinthiaca sive apyrina  
*J. B. Corinthen*. In Zacyntho, &c. colitur. *Usu.*  
 Fru-

Fructus maturus exsiccatus. *Vires.* Tempera-  
æ sunt, æstum febrilem mitigant, sitim sedant,  
stercus laxant,

### *XVIII. De Thea.*

**F**oliis angustis, serratis, floribus pentapetalis, majo-  
ribus, rotundis, fructu tetracocco, rugoso, ex spa-  
diceo fusco à reliquis differt.

Thea Offic. The Sinensium sive Tsia Japonen-  
sibus Breyn. Cent. 1. cap. 52. Sinensium sive  
Tsia Japonensibus Breynii R. H. p. 1619. Thee  
Frutex Bont. Euonymo adfinis Arbor Orienta-  
lis nucifera flore roseo Plukenet. Phytogr. Tab.  
88. Chynensium, sive Tschia Japanensium Hort.  
Amst. Chaa C. B. Herba Japoniæ J. B. Styraci  
& Euonymo mediæ affinis. The Sinensium,  
sive Tsia Japonensibus flore simplici & niveo  
pleno Breyn. 2. P. In regno Japonico, & Chi-  
nensi colitur. *Ussu.* Folia convoluta, saporis sub-  
amaricantis, aromatici, leviter adstringentis,  
odoris grati, fœnum recens æmulantis. *Vires.*  
Siccatur & leviter astringit, acida dissolvit, & per  
Urinam educit, hinc prodest in Hypochon-  
driaco affectu, Podagra, Arthritide, & Nephri-  
tide, Cephalalgiam arcet, Memoriam confor-  
tat, Sanguinem purificat, &c.

Catalogum Authorum qui de hoc frutice  
scripserunt, vide apud Jacobum Breynium Exot.  
Cent. 1. cap. 52. p. 114. quibus adde D. Pechlin.  
Belgæ Tractatum de Thea anno 1684. editum.  
M. Du Four Historiam Theæ Lugduni impres-  
sam

sam anno 1685. & Tractatum quendam Anglicum  
conscripsum Londini 1682.

### XVIII. De Euonymo.

**N**Ote sunt, Folia oblonga, crenata, flores tetrapetali, fructus tetracoccus quadrangulus rubens.

Euonymus Offic. Theophrasti Ger. Vulgaris Park. Vulgaris, granis rubentibus C. B. Multis aliis Tetragonia J. B. Spindel-Baum. In sepibus frequens. Majo floret. *Ufu.* Fructus Vires. Vomitus cient, ventriculum obtundunt, & per secessum purgant. Noxia est planta, & non sine periculo sumenda. Extrinsecus emolliunt & resolvunt, pediculos interimunt & Furfures capitis detergent.

### XIX. De Agrifolio.

**N**Ote sunt, Folia in ambitu longis, acutis, rigidis spinis armata, semper-virentia; bacce parvae, rotundae, rubrae, quaterna semina triquetra striata continentes. R. Synop. p. 227.

Agrifolium Offic. Ger. sive Aquifolium Park. Aquifolium sive Agrifolium vulgò J. B. Ilex aculeata baccifera folio sinuato C. B. Stech-Baum/ Stech-Äpfel. In sepibus frequens. *Ufu.* Viscum aucuparium Vogel-Weim. / hoc modo præparatur. Delibratis Junio aut Julio mensibus, quotquot videntur aut opus fuerit hoc genere arborum, cortices detracti in aqua fontana per septem aut octo horas continuas decoquantur, donec tenerrimi evadant. Coctos in acervum humi cum Filice S. S. S. compones, aquâ prius curiosè separata, & per duas tresve septi-



*Fortimanas fermentari & computrescere sinas, donec in mucilaginem abeant: Exemptos deinde in mortario tamdiu tundas donec fingi forrarique possunt instar Massæ farinacæ. Massam in aquam profluentem submersam manibus trases, & diligenter subigas. Aqua brevi sordes omnes eluet, visco residuo puro & defæcato; in fictili aliquo vase per quatuor adhuc aut quinque dies despumando, donec se purgaverit & perfecerit: deinde in novum vas translatum conservetur ad usum. NB. Non ex corticibus hujus arboris tantum Viscum aucupiarium paratur, sed etiam è fructu Visci, Castanæ, & Seesteni. *Vires.* Vim habet emolliendi & discutendi tumores, Parotides, &c. *Dioscorid.**

## XX. De Rhamno.

*Folia hujus fruticis ad Pruni accedunt; bacca per maturitatem nigra, succo virente insectorio plena.*  
L. Synop. p. 227.

Rhamnus ☿ Spina cervina Offic. Catharticus C. B. J. B. Solutivus Ger. Solutivus, sive Spina infectoria vulgaris Park. Wegdom-Beer/ Treugbeer. In sepibus & sylvis. Floret Majo, fructum fert Septembri. Purgat bilem, pituitam ac maximè serosos humores, unde usus præcip. in Cachexia, Hydropè, Arthritide. Schrod. Baccæ hujus fruticis tria colorum genera præbent. 1. Messis tempore lectæ, arefactæ & tussæ, inque aqua & Alumine maceratæ luteum seu croceum potius reddunt colorem. 2. Autumno cum maturitate, affectæ nigra

græ evaserint collectæ, tusæ, & in vase vitreo asservatæ pulchrè viridem exhibent colorem, quem *Saffgrün* vocant. 3. Circa festum Sancti Martini in arboribus adhuc hærentes si legantur, teste *Trago*, puniceum colorem reddunt. *R. H. p. 1625.*

*Arbores & Frutices bacciferæ granorum  
in acinis numero nobis incognito.*

## XXI. De Cappare.

**N**otæ sunt, folia subrotunda, alternatim posita, flores tetrapetali, pediculis longis è sinu foliorum exeuntibus insidentes; fructu oblongo.

Capparis Offic. rotundioræ folio Ger. Spinosa folio rotundo Park. Spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. Spinosa J. B. Cappern. Locis arenosis & ruderatis gaudet. *Ussu.* Cortex radicis, tubulosus & rugosus, crassus, cinereus, saporis acris & amaricantis, & Gemmæ florum muria conditæ, hoc modo. Gemmas florum adultas, antequam tamen explicentur, colligunt, & per trium quatuorve horarum spatium in umbra sparsas relinquunt, donec flaccescere incipiant, ad impediendum ne se aperiant. Tum vasi immittunt, & acetum super affundunt asserculo imposito vas contegentes, adeoque contactas octiduum restare sinunt. Deinde exemptas leniter premunt, & recenti aceto infundunt per alterum octiduum. Tandem

operationem iterum repetunt, expressis geminis & novo aceto tertium affuso. Quo peracto eas in dolia cum aceto recondunt, *Vires.* Cortex calefacit & siccatur, Splenicus est, acris, amarus, austeriusculus, ideoque incidens, appetens, extergens, subastringens. Prodest in affectibus Arthriticis, Hypochondriacis, & similibus. *Schrod.* Gemmæ conditæ, appetitum augent, & concoctionem promovent, Hepati & Lienî conferunt, obstructions eorum reserando. *R. H.* p. 1629.

## *XXII. De Caranna.*

**F**oliis oleagineis, in crucis formam compositis, baccis oblongis, ab aliis distinguitur.

Caranna *Offic.* C. B. J. B. Park. Tlahueliloca Quahuatl i. e. Arbor insanix, Caragna nuncupata *Hern.* In Nova Hispania crescit *Usu.* Resina substantia concreta, laxa, dum recens, tenax, picis instar ductilis, inveterata, dura, friabilis, foris ex cinereo nigricans, intus piceæ coloris, saporis resinosi, viscosi, amaricantis, odoris dum accenditur fragrantis. *Vires.* Calefacit & siccatur, viribusque pollet iisdem, quibus Tacamahaca, quæ tamen operando citior & efficacior est, præcipuè in tumoribus, omnisque generis doloribus; maximè juncturarum tumores inveteratos dissolvit, defluxiones frigidas aut mixtas in oculos & alias partes sistit & reprimat, nervorum ac cerebri dolores sedat, vulnera recentia præsertim nervorum & juncturarum sola sanat. *Schrod.*

## *XXIII. De*



## XXIII. De Rubo.

**F**ructus è pluribus acinis arcte stipatis composito, uni-  
 & simplici flore succedente, foliis in plura segmen-  
 ta partitis, nec non parvitate & imbecillitate sua, in-  
 signibus notis à reliquis bacciferis fruticibus differt.  
 R. Synop. p. 228.

1. Rubus vulgaris *Offic.* Rubus *Ger.* Vulga-  
 ris major *Park.* Vulgaris, sive Rubus fructu  
 nigro *C. B.* Major fructu nigro *J. B.* Brom-  
 beer *Strauch.* In sepibus & dumetis. Majo  
 floret, fructum Augusto maturat. *Usu.* Folia,  
 Cymæ & Fructus. *Vires.* Folia & Cymæ re-  
 frigerant, siccant, astringunt potenter. Fru-  
 ctus maturus caliditate est temperatus ac sub-  
 astringens. *Uusus præcip.* in quibuscunque pro-  
 fluviis, Vomitu, fluxu alvi, Uteri, & narium.  
 Extrinsecus in Aphthis, aliisque oris affectibus  
 abstergendis, in vulneribus astringendis, capil-  
 los nigrat, scabiem curat. *Schrod.*

2. Rubus Idæus *Offic.* *Ger.* *Park.* Idæus spi-  
 nosus *C. B.* Idæus spinosus fructu rubro *J. B.*  
 Himbeeren *Strauch.* In uliginosis locis & syl-  
 vis. Majo floret, Julio fructum maturat. *Usu.*  
 Folia, Fructus. *Vires.* Easdem vires obtinent,  
 quas præcedentia, cordialia tamen præ his pe-  
 culiariter censentur. *Schrod.*

*Arbores quædam baccifera, nobis  
autem incognita.*

**XXIV. De Santalo albo & citrino.**

*Frutices baccifera fructu polypyreno.*

**N**otæ sunt, Folia pinnata, flores ex cæruleo nigricantes, fructus cerasi magnitudine, per maturitatem nigri.

Santalum album & citrinum Offic. ex una & eadem arbore producitur, cujus pars corticalis Santalum album dicitur; medullaris, Citrinum ut à multis affirmatur. Scribit verò *Garcias*, inter utriusque Santali arbores tantam esse affinitatem, ut album à citrino discerni non possit, ni fortè ab ipsis incolis, qui eas mercatoribus vendunt.

1. Santalum citrinum Offic. Park. J. B. pallidum C. B. Ger. Gelber Sandel. Usus. Cor seu medulla solida, colore citrino, saporis subamari, aromatici, odoris fragrantis & grati.

2. Santalum album Offic. Ger. Park. C. B. J. B. Weisser Sandel. Usus. Lignum, quod durum, solidum, ponderosum, pallidum, odoris & saporis præcedentis.

Utraque ex India Orientali ad nos transportantur. Vires. Refrigerant, siccant, aperiunt, Epatica sunt ac cardiaca. Usus præcip. in Lipothymia, Palpitatione cordis, obstructione Epatis, &c. Extrinsecus in Catarrhis, Cephalalgia, Vomitu, &c. Schrod.

## XXV. De Myrrha.

**A**rbor, ex qua Myrrha elicetur baccifera est, ex quorundam sententia, ergo hoc in loco eam disposuimus.

1. Myrrha Offic. C. B. J. P. B. Park. Myrrhen. Substantia est resinosa, arida, dura, ex flavo ferruginea, nitens & in glebas compacta, unguibus subinde pallidis permixta, saporis subacris, amari, & aromatici, odoris fragrantis. Laudatur friabilis, levis, undiquaque concolor, amara, acris & odorata. Vires. Calefacit & siccatur, aperit, subastringit, attenuat, maturat, discutit, putredini resistit. Usus præcip. in Uteri obstructione, foetu expellendo, in pulmonum & intestinorum mucilagine, ac inde nata Raucedine, Tussi & Angina, Pleuritide, Colica, Lumbricis, &c. Extrinsecus prodest in Gangræna, tumoribus, vulneribus &c. Schrod.

2. Staete Offic. nihil aliud esse quam Myrrham liquidam testatur Dioscorides. Duplex autem ejus colligendi modus apud veteres occurrit. 1. Sponte ex arbore non vulnerata exsudat, ut vult Plinius. 2. Exprimitur ex Myrrha cum modica aqua contusa, ut docet Dioscorides, quod confirmat Cordus. In Officinis nostris nunquam reperitur, quocirca de ea plura dicere supersedeo.

Myrrham Officinarum legitimam non esse suspicatur Fuchsius, quod notæ Myrrhæ apud Dioscoridem illi non convenient. Brassavolus aliique Myrrham Officinarum pro Bdellio habuerunt, & revera tanta intercedit inter Bdel-

lium



lium & Myrrham similitudo, ut facile ab incautis, & minus expertis unum pro altero accipi possit. *Langius* & alii Benzoinum dictum omnes Myrrhæ electæ proprietates habere scribit. Plerique Myrrham Officinarum improbant & pro genuina & optimæ notæ Myrrha non habendam statuunt. Verum *J. Baubinus*, *Parkinsonus* alique in simplicibus medicamentis examinandis versati veram Myrrham ad nos adferri statuunt, quam his sæpius adulteratam cum Gummi, & argumentis in contrarium allatis respondent, quos consule.

Duas arbores lachrymiferas aculeatas depingit & describit eximius ille Botanicus *D. Leonardus Plukenetius* in *Phytograph.* Tab. 145. Fig. 2. & 3. quas consulat lector. Vid. insuper *Polistæ Myrrhologiam Curiosam*.

## SECTIO OCTAVA.

### *De Arboribus Pomiferis.*

**P**omiferas Arbores voco, quæ fructum proferunt majorem, pericarpio donatum, polypyrenum. R.H. p. 1643.

Arbores Pomiferæ sunt fructu cortice crassiore testeo, coque vel

Molliore, fructu

- [ Rotundiore per maturitatem aureo, foliis
- { Simplicibus, floribus pentapetalis, albis, odoratis; *Aurantia*.
- { Binis conjugatim, floribus tetrapetalis, incarnatis; *Cambogium*.
- [ Ovali & oblongo, per maturitatem pallidiore, succo acidior, Ec 2 Major,

- { Major, cortice crassiore; *Citrus*  
 { Minor, cortice tenuiore seu minus spisso, pulpâ  
 { copiosiore; *Limonium*.  
 { Duriore, foliis singulis pediculis insidentibus  
 { Binis, flosculis in umbellas dispositis, semine orbi-  
 { culari compresso; *Lignum Colubrinum*.  
 { Singulis, floribus speciosis, pentapetalis, flavis,  
 { nucleis oblongis; *Cacao*.
- 

## Arbores Pomiferae fructu corticoso molliore.

**F**RUCTUM corticosum vocamus, qui non membrana tantum tenui pulpam ambiente, sed cortice crassiore, eo tamen molliore cingitur. R.H. p.1654.

### I. De Malo Citria, sive Medica, Limonia, & Aurantia.

**N**Ota sunt, Arbor fruticosa, foliis glabris, acuminatis, odoratis, semper virentibus; floribus calathoidibus, fructu corticoso; semina utrinque acuminata, in carne humida continente.

1. *Malus Citria* Offic. *Citria* fructu mediocri  
*J. B. Medica* Ger. *C. B. Medica* sive *Citria* Park.  
*Malum citreum* vulgare *Fer. H. Citrus* vulgò  
*Herm. Cat. Citrus* Schrod. *Citronenbaum*. In Ita-  
 lia & Hispania colitur. *Usu.* Fructus, Cortex &  
 Semen. *Vires.* *Citrium malum* (cum cortice  
 ac carne) alexipharma putatur cujuslibet  
 veneni, resistit putredini, morbisque malignis,  
 Lumbricos fugat, diaphoreticum est. Cortex  
 calefacit & siccatur. Caro seu pulpa refrigerat &  
 humectat & hinc *Saccharum* expressus. Semen cale-  
 facit

facit & siccatur, attenuatur, digeritur, abstergit, Lumbricos fugat. *Schrod.*

2. *Malus Limonia Offic. Ger. Park. R. H. p. 1656. J. B. Limonia acida C. B. Limon vulgaris Fer. H. Simonien: Baum. In Italia & Hispania crescit. Ufu. Fructus seu Mala, Cortices malorum, Semen. Vires. Citrii mali virtutes æmulantur, nisi quoddam magis acidiuscula sint, ita & magis refrigerantia ac siccantia. Usus præcip. in febribus aliisque morbis calidis, in calculo & simil. Schrod.*

3. *Malus Aurantia Offic. Ger. R. H. p. 1658. Arantia vulgaris Park. Arantia major C. B. Arantia malus J. B. Aurantium vulgare Fer. H. Pomeranzen-Baum. In Hispania, Lusitania, &c. succrescit. Ufu. Folia, Flores, Fructus seu Mala, Cortices malorum, & Semen. Vires. Aq. destillata ex floribus quam Napham vocant, non tantum ad delicias, sed contra Pestem & morbos contagiosos utilem & Cordi amicam, quæ & sudores movet. R. H. p. 1659. Folia cum Floribus viribus conveniunt. Fructus easdem virtutes habere putantur, quas Citria mala, imbecilliores tamen: Cortices calidiores sunt, ususque vulgaris in torminibus ventris, Colicisque à flatu subortis, inque dysuria corrigenda. Schrod. Scorbuto sanando, efficacissima esse perhibentur. R. H.*

## II. De Cambogio,

*Nota sunt, Folia conjugatim bina, flores tetrapetali in summis furculis, fructus malo aureo æmulus.*



*Cambogium Offic. Carcapuli Park. C.B. J. B.*  
*Fructu malo aureo æmulo R. H. p. 1661. Cod-*  
*dampulli H. M. Tom. 1. In Malabar crescit. Usu.*  
*Gummi Gutta Gamba, Gutta Germandra & Gutta*  
*Jemou dicta. Substantia est gummosa & resino-*  
*sa, indurata, flava, aut aurei coloris, saporis a-*  
*cris, nauseosi. Vires. Expurgat per superiora*  
*& inferiora, præcipue humores serosos & aquo-*  
*sos, tum quoque omnem saburram vitiosorum*  
*humorum ex toto corpore educit. Hinc usus*  
*ejus creber est in Hydrope, Scabie, Pruritu &*  
*simil. Schrod.*

De generatione hujus gummi multæ sunt  
 opinioniones. Alii enim naturalem esse ajunt;  
 alii verò factitium; quidam ad *Esulam* refe-  
 runt; *Bontius* ad *Esulæ* affinem plantam Indi-  
 cam, alii ad Flores *Ricini Indici*, colorem ve-  
 rò ex *Curcuma* advenire; alii autem à *Tithy-*  
*malo & Scammonio* derivare conantur; nobis  
 verò *Succus* est concretus ex hac arbore (pon-  
 te effluens. Confundi autem non debet (in-  
 quit *De Syen* in Annotationibus suis ad *Hortum*  
*Malabaricum* Tom. 1.) gummi *Gotta* hic descri-  
 ptum cum vulgari, quod ab *Esulæ Indicæ* affini  
 planta colligi testatur *Jacobus Bontius* in *Historia*  
*sua Naturali & Medica Indiæ Orientalis lib. 6.*  
*cap. 57. & ab Indis vocari Lonam Cambodia, quod*  
*in Cambodia, vicina regno Indiæ provincia fre-*  
*quenter proveniat.*

## III. De Ligno Colubrino &amp; Nuce vomica.

**F**oliis binis ex nodis oriundis, floribus parvis in umbellam dispositis, fructu corticoso, semine plano compresso à reliquis differt.

I. Nux Vomica Offic. Ger. Park. Vomica in Officinis C. B. Vomica vulgò Officinarum, compressa, hirsuta J. B. Vomica major & Officinarum P. B. P. Caniram H. M. Malus Malabarica fructu corticoso, amaricante, semine plano compresso D. Syen. R. H. p. 1661. Solanum arbo-  
reum Indicum maximum, foliis Oenoplæ, sive Napecæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, semine orbiculari compresso maximo; Nuces vomicas & Lignum colubrinum Officinarum ferens Breyn. 2. P. Colubrini ligni tertium genus in Malabar vastæ arboris magnitudine Acoſtæ C. B. Colubrinum lignum Cluſo Pao de Cobra dictum, forte tres Acoſtæ J. B. Lignum Colubrinum tertium Acoſtæ Park. Krahni Aug. gen. In Malabar oritur. Uſu. Semina orbiculata, compressa, cornea duritie, colore cinereo, foris parum lanuginoso, saporis amari. Vires. Narcotica est, virulenta, & Opio deterior, Canes, Feles, Corvos, &c. cum cibo exhibita interimit, Vomitusque ciet.

Ex observatis (inquit De Heide in Centuria Observationum Medicarum Obs. 50. p. 116) patere putem hanc nucem virulentam potissimum inficere fluidum Cerebrum nervosque irrigans: hinc enim inquietudo, rigor, convulsiones, horror, tremor, & respiratio inordinata facile derivantur.

2. *Lignum Colubrinum Offic.* *Nux Vomica minor Moluccana*, *Lignum Colubrinum Officinatum P. B. P.* *Solanum arborescens Indicum*, foliis *Napeca minoribus*, fructu rotundo, duro, & semine orbiculari compresso, minoribus *Breya. 2. P.* *Scheru Katu-Valli-Caniram H. M.* *Tom. 7.* *An Clematitis Indica foliis Persicae, fructu Periclymeni C. B.?* *Lignum Colubrinum primum Gar. iæ Park. J. B.?* In Insula Zeilanica & Timorensi succrescit. *Ussu.* Radix lignosa, brachii crassitie, sub cortice ferrugineo, maculis cinereis notato, includens materiam solidam, ponderosam, saporis acris & amarissimi, odoris nullius. Eligendum amarum, non cariosum, grave. *Vires.* Calidum est & siccum, abstergit, moribus serpentum aliisque venenis medetur. Bilem ac mucilaginem per alvum, nonnunquam etiam per vomitum educit, unde usus præcip. est in Febris intermittentibus tertiana ac quartana: Lumbricos necat ac fugat. Extrinsecus maculas cutis abstergit. *Schrod.*

Ex Observationibus autem *Antonii de Heide*, *Obs. 53. p. 121.* Vi virulenta, soporosa ac maligna hoc Lignum præditum est, hinc non tutum esse affirmo internè exhiberi. Ad Febrem quotidianam sedandam (inquit) ligni Colubrini pulverem assumit Tornator quidam circa vesperam, subsequente nocte satis bene habuit, sed mane surgere vel corpus movere satagens, sentiebat tremorem in membris. Ejusdem ligni semidrachma assumpta à muliere cachectica præter tremorem excitavit & stuporem, ita ut agra nullius



nullius rei curam haberet, nesciens, ut mihi retulit, se esse in mundo vel vivere. Retulit mihi illustris domina famulum suum ab assumpto hoc ligno per aliquot dies instar fatui extitisse.

#### IV. De Cacao.

**A**rbor est procera, cortice glabro, foliis longis, glabris, & acuminatis, floribus magnis, pentapetalis, flavis, fructu magno.

Cacao Offic. Ger. sive Cacavate Park. Americæ sive Avellana Mexicana J. B. Amygdalis similis Guatimalensis C. B. Chocolata Pis. Mant. A. Cacaqua Quahvitl sive Arbor Cacari Cacavifera Hern. In Insula Cuba, Jamaica, &c. colitur. Ufu. Nuclei Amygdalis similes & magnitudine & forma & consistentia, sed paulò tumidiore, saporis subpinguis, oleosi & subamari, colore obscurius rubente, odoris nullius. Electione tamen utendum, nec esitandas mucidas, cariosas, aut ullo modo corruptas seu vitiosas, verum integras, pingues, bene asservatas & sapidas. Vires. Amygdalarum & Pistaceorum virtutes æmulantur: vim autem habent nutriendi adeò potentem, ut multis carnibus aliisque alimentis anteferantur. Ex Nucleis vel per se, vel cum Saccharo solo, vel cum aliis fructibus aut aromatis mixtis, conficitur illa Massa ceu Confecta Chocolata dicta. Simplicia alimentaria & aromatica quæ Chocolatæ compositionem ingrediuntur hæc recensent Hernandez, Piso & Hughesius, à nobis in hoc opere descripta, 1. Atollia i.e. Mayzii seu Frumenti Indici farina. 2. Achiot

Hern. *Urucu* Pis. 3. *Chilli* i.e. *Caplicum*. 4. *Mexicaxochitl* Hern. 5. *Tlixochitl* Hern. i.e. *Vainilla*. 6. *Xochinacatlis* seu *Flos auriculæ* Hern. *Oregivell*. Clus. *Orejuekas* Hughes. 7. *Xocomochitl* seu *Pipe Tavaſci* Hern. Vid. D. *Stubbes Tractatum Angli-*  
*cum de potu Chocolate dicto*. Item D. du Fours *Li-*  
*brum Gallicum de Chocolate* & *Tractatum An-*  
*glicè conſcriptum*.

## SECTIO NONA.

### De Arboribus fructu per maturi- tatem ſecco.

Arbores & Frutices fructu per maturitatem ſecco ſunt  
 vel

[Nuciferæ, foliis pinnatis, nuce majore, oblonga, du-  
 ra, tegumento exteriori ſcabro, teſtam undique  
 obducente; *Piſtacia*.

Bacciferæ,

[Ereſtæ, foliis

[Perpetuis ſeu ſempervirentibus,

[Majoribus & latioribus ſuaveolentibus, in igne  
 crepitantibus, baccis nigris nucleum intus  
 geminum planum claudentibus; *Laurus*.

[Minoribus, baccis etiam nigris; nucleum intus  
 geminum ſulcatum, ſaporis amaricantis, clau-  
 dentibus; *Coffee*, *Frutex*.

[Deciduis, latis, mucronibus acutis, floribus pen-  
 tapetalis, ſuaveolentibus, ligulis foliaceis, ob-  
 longis, communi pediculo adnaſcentibus; fru-  
 ctu rotundo, parvo, monococco; *Tilia*.

[Scandentes, foliis nervoſis, ſubrotundis, acuminatis,  
 ſtoſculis monopetalis, tripartitis, racematim di-  
 geſtis, fructu rotundo, monopireno, aromatico;  
*Piper rotundum*.

Polycoc-

*Polycocceæ*; hæc sunt vel foliis

*Simplicibus*, graveolentibus, sempervirentibus, fructu tricuspide & tricapsulari, singulis cellulis binis seminibus nigris, splendentibus, repletis; *Buxus*.

*Pinnatis* pari numero, ligno solido & denso, resinoso, fructu etiam

*Dicocco*, flore tetrapetalo; *Guajacum*.

*Tetracocco*, flore pentapetalo, cæruleo; *Lignum Sanctum*.

*Vasculis membranulis alatis*; seu folliculis singulis singula semina claudentibus,

*Subrotundis*, primo vere ante folia erumpentibus, & semine perfecto brevi decidentibus, arbore grandi & procera, folio simplici, lato, non laciniato; *Ulmus*.

*Oblongis*, semine extremum inferius seu quod ad pediculum est occupante, non ante autumnum maturo, foliis arboris pinnatis; *Fraxinus*.

*Langigeræ*, seminibus, vasculis inclusis, multis simul confertis racematim in summis ramis, foliis Cupressi; *Tamarix*.

*Polyspermæ*, seu vasculo subrotundo, semina multa parva continente, in imo flore occultato, foliis parvis & angustis sempervirentibus; *Erica*.

## I. De Pistacia.

**N**otæ sunt, *Nux major oblonga*, tegumento exteriori, saltem cum exaruerit, scabro, foliis pinnatis.

R. Meth. p. 36.

*Nux Pistacia* Offic. Park. *Pistacia* Ger. J. B. *Pistacia peregrina* fructu racemoso, sive *Terebinthus Indica* Theophrasti C. B. *Vimpernußbaum*. In regionibus calidis provenit. Usus. Fructus seu *Nuces oblongæ*, angulosæ, *Avellanæ* magnitudinis, altera parte elatiores, altera depressiores, & costa notati; includentes sub

puta.



putamine tenui, corticoso, rugoso, ex viri ferrugineo, sub membranula tenui, ruffa, nucleum in albo virescentem, saporis oleosi, su-  
dulcis. Eligendi nuclei recentes, ponderosi non rancidi. *Vires.* Calefaciunt, humectant, attenuant, aperiunt. Usus præcip. in mucilagine Pulmonum, obstructione Epatis, roborat Stomachum, coercent nauseam ac vomitum, excitant appetitum, bonum suppeditant nutrimentum. *Schrod.*

## II. De Lauro.

**N**ota, Arbor est baccifera, foliis sempervirentibus majoribus & latioribus, in igne crepitantibus, bacis nigris, nucleum intus geminum cludentibus. *R. Meth.* p. 34.

*Laurus* *Offic.* Ger. J. B. Vulgaris C. B. Major sive latifolia *Park.* *Sorbeer.* Baum. In hortis colitur. Martio & Aprili floret. *Ufu.* Folia, & Baccæ oblongæ, rotundæ, nigricantes, sub pellicula tenui includentes nucleum geminum nigricantem, saporis acris, amari, aromatici oleosi, odoris non ingrati. *Vires.* Calefaciunt & siccant, emolliunt, resolvunt. Usus præcip. baccarum in Mensibus & Urinis ciendis, in affectibus Nervorum, Paralyfi, in Colica, in dolore post partum, in cruditatibus ventriculi. Extrinsecus conferunt folia ad ictus vesparum, molliunt tumores, promovent menses, leniunt dolores, odontalgiamque mitigant. *Schrod.*

## III. De Coffee Arbore.

Arbores sunt praegrandes, instar Tiliae, flosculos habent pentapetalos, fructus baccis Lauri similes. Coffee Offic. Euonymo similis Aegyptiaca fructu baccis Lauri simili C. B. Bon arbor cum fructu suo Buna Park. Bon vel Ban arbor, Buna annu & Bunchos Arabum J. B. Buna Ger. Coffee Baum. In Persia & Arabia Foelice succescit. Usu. Baccæ in binos lobos distinctæ, fere paulò minores, altera parte convexa, altera concava, insigni sulco notata, colore ex fusco nigrescentes, saporis farinacei, odoris fabarum totum instar. Vires. Potu Coffee utuntur ad corroborandum ventriculum frigidiorum, ad juvandamque concoctionem, celebraturque maxime vi antihypnotica, &c. Vide Alpinum, Willm., Du Fours, & Tractatum Anglicum de Coffee, &c.

## IV. De Tilia.

Ignis foliaceis oblongis communi flosculorum pediculo adnascantibus; floribus pentapetalis, fructu rotundo, parvo, monococco; cortice lento & ad funes tendendos habili, ab aliis arboribus haud difficulter distinguitur. R. Synop. p. 233.

Tilia Offic. foemina Ger. Foemina major Park. foemina folio majore C. B. Vulgaris platyphyllos J. B. Linden Baum. In areis & comitatibus, Junio floret. Usu. Folia & Flores. Vires. Folia siccant & repellunt, Urinam ac Menses auferunt. Flores calefaciunt & siccant, partium tenuium, discutunt, cephalici sunt. Usus præcip. in Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, &c. V. De

## V. De Pipere rotundo.

**N**Ota, Planta est sarmentosa, volubilis, foliis subrotundis, acuminatis, nervosis, flosculis monoptalis tripartitis, fructu rotundo, racemoso.

1. Piper nigrum Offic. Ger. Park. J. B. rotundum nigrum C. B. Rotundum Hern. Lada, alii Molanga sive Piper aromaticum Pis. Mant. A. Molago Codd. H. M. Tom. 7. Schwarzer Pfeffer. In Java, Malabar, &c. colitur. Ufu. Fructus seu grana rotunda Vicie magnitudine, globosa, nigricantia & rugosa, saporis acris & fervidi aromatici, odoris fragrantis. Vires. Cum Piper albo viribus convenit. NB. Javenses & Amstelodamenses immittunt Piper nigrum in Aquam, ut decorticetur, & tum involvunt in Creta; ut fiat Piper album falsitium.

2. Piper album Offic. Ger. Park. J. B. Rotundum album C. B. Weisser Pfeffer. Cum priore convenit. Ufu. Fructus seu grana, albida, Piperi nigro similia, minusque rugosa. Vires. Calfacit & siccat, incidit, attenuat, aperit, resolvit. Usus præcip. in frigiditate ac cruditate ventriculi, Colicis doloribus, in visus imbecillitate. Extrinsecus in apophlegmatismis, gargarismis, sternutatoriis usurpatur; sedat odontalgiam, nervorum affectus frigidos juvat. Sebrod.

## VI. De Buxo.

**N**Ota sunt, Folia parva, perpetua; materies solida, ponderosa, flavicans; odor gravis, fructus trispis & tricapsularis cum sex intus seminibus lucidis spadicis. R. Synop. p. 229.



*Buxus* Offic. Ger. J. B. *arborescens* C. B. *Ar-*  
*bor vulgaris* Park. *Buxbaum.* Amat frigida,  
frigida, montes. Martio floret. *Ufu.* Lignum,  
Bilia, sed rarò. *Vires.* Decocto ligni lues Galli-  
æ æquè curatur ac Guaiaco Cat. *Angl.* p. 48.  
Sani usus est in Medicina: sunt tamen qui o-  
leum ex ligno destillant, summè narcoticum,  
aque non solum summopere commendant in  
epilepsia, Odontalgia, dentibusque corrosis,  
sed & verminatione, &c. *Schrod.*

## VII. De Guajaco.

*Nota* sunt, Lignum solidum, densum, ponderosum, &  
resinosum, folia pinnata, pari numero.

1. *Guajacum* Offic. Ger. sive Lignum sanctum  
Park. Officinarum P. B. P. Americanum pri-  
mum, fructu *Acëris*, sive legitimum Breyn. 2. P.  
jamaicè *Lentisci* subrotundis foliis latè vi-  
rentibus, flore albo P. P. *Tab.* 35. Magna matrice  
C. B. *Guayacan* Hern. Fructus Guajaci putatus  
& folia J. B. Lignum Vitæ vulgò *Frankosen*  
*Holz.* In Hispaniola, Jamaica & alibi crescit.  
*Ufu.* Cortex lignosus, tenuis, nonnihil resino-  
sus, & quasi ex plurimis lamellis tenuissimis  
conflatus; extus ex cinereo nigricans, intus  
pallidus, saporis acris, amaricantis, odoris aro-  
matici. Lignum solidum, densum, resinosum,  
nigricans, saporis acuti, amaricantis & aroma-  
tici, odoris fragrantis. Gummi seu Resina ari-  
da, friabilis, pellucida, ex nigricante, sapore  
acri, odore grato. *Vires.* Lignum calefacit &  
siccat, sudorem ac urinam largiter promovet  
adec

adeoque sanguinem mundificat, putredini resistit. Uſus præcipui in Arthritide, Hydrope, Catarrhis, aliisque morbis à Phlegmate, tartareavemucilagine, ut flatibus oriundis: peculiariter ac specificè curat Luem Veneream. *Schrod.* Gummi calidius est quàm Lignum, & in omnibus ejus vires obtinet, Luem veneream curat. Cortex minus calidus est quàm lignum, ejusque viribus pollet.

2. Lignum Sanctum *Offic. Terrent.* Guajacum propemodum sine matrice C. B. Americanum alterum, fructu *Euonymi Breyn. 1. P.* foliis *Lentisci Breyn. 2. P. C. B.* Guajaci altera species *Monardi Ger. Emac.* Palum Sanctum Indiæ Occiduae *Park.* Hoaxacan sive Lignum Sanctum *Hern.* Jasminum vulgò Americanum, at rectius *Euonymo* affinis *Occidentalis* alatis *Rusci* foliis nucifera, cortice ad genicula fungoso *P. P. Tab. 94.* In America etiam oritur. *Uſu.* Lignum solidum, densum, odoratum, Guajaci ligno albidius, saporis & odoris ejusdem. *Vires.* Ut in externa facie ita & viribus cum præcedente convenit.

### VIII. De Fraxino.

**N**Ota sunt, cortex cinereus, folia pinnata bina ad-versa; folliculi membranacei oblongi, semine extremum inferius seu quod ad pediculum est occupante, non ante Autumnum maturo: flores staminei congesti, ante folia erumpentes & brevi evanescentes. *R. Synop. p. 229.*

*Fraxinus Offic. Ger. Vulgaris Park. Ex-celsior C. B. Vulgatio J. B. Esch-Baum.* In sylvis

*vis & sepibus. Usu.* Cortex, Folia, Semen *Lingua*  
*avis* dicta, & Succus sole condensatus, *Manna*  
*Calabrina* dictus, est substantia gummosa, albi-  
cans, sacchari instar, saporis subdulcis, pinguis.  
Eligenda est Manna candida, recens, anno non  
vetustior: ruffa enim & fusca inveterata est.  
Adulteratur cum Sacharo herbarum foliis cir-  
cumvoluto. *Vires.* Cortex siccatur, attenuatur,  
Splenis duritiem specificè emollit, diuretica est  
ac lithontriptica, eaque non è postremis. Folia  
siccant validè, curantque ictus Serpentum.  
Semen calefacit, siccatur validè, conducit Epaticis,  
Pleuriticis, Calculosis. *Manna* temperata est  
ad caliditatem reclinans, Guttur, asperam Ar-  
teriam, Thoracemque leniens, alvum blandè  
movens, bilem, serososque humores educens.  
*Schrod.* Tutò exhibetur senibus, pueris, fœmi-  
nis etiam prægnantibus & delicatis.

Manna multis Rei naturalis & medicæ Auto-  
ribus pro Rore melleo habetur, qui noctu in  
arborum folia decidens, calore solis induratur:  
quibuscum consentire nequeo ob varias ratio-  
nes. 1. Quia Rores mellei calore solis liquantur  
& evaporant, cum Manna eodem concreseat  
potius, ac durior & candidior reddatur. 2. Ro-  
res mellei in supina duntaxat foliorum parte  
concreti inveniuntur, cum Manna parte etiam  
prona trunci præcipuè & ramorum observe-  
tur. 3. Rores mellei denique in arbores dunta-  
xat nudas in aprico sitas & aëri expositas deflu-  
unt, cum Manna, ut Calabri nonnulli eruditissi-  
mo illo viro *D. Joanni Raio* cum in Italia pere-



grinaretur affirmarunt, in arboribus de industria tectis, ut rori aditus non daretur, inventum fuerit; quod experimento proprio eidem confirmavit eruditissimus vir *D. Thomas Cornelius*, M. D. Neapolitanus Consentinus, Manna in ramis linteo circumvolutis à seipso sæpius collecta. Idem jamdudum ab *Altomaro* demonstratum est; efficacissimè autem à *Pena & Lc-belio*, qui ramos magnos Fraxini præcisos cum in cellam vinariam recondi curassent, Mannam postero die in ipsis concretam invenerunt.

Mannam autem in Calabria singulis annis circa vel paulò ante caniculares dies & Sextiles pluvias colligunt; cum autem pluit, cessat fluere. Jam si quæratur, inquit doctissimus *Raius*, cur Fraxinus in Calabria Mannam fundat, in aliis regionibus non item. Respondeo id evenire vel ratione temperiei cœli, vel conditionis soli vel utriusque, vel fortè etiam peculiaris naturæ & constitutionis ipsarum arborum.

Observavit eruditissimus *D. Tancredus Robinson*, M. D. in Regno Neapolitano itinerans multas cicadas sugere & depascere Fraxinum humiliorem, unde suspicatur Mannam faciliùs exstillare per aperta vulnera seu foramina ab hisce animalibus facta, sicut in India Orientali Lacca ex arboribus à formicis perforatis.

## IX. De Ulmo.

**U**lmo arbori procera folliculi seminales compressi, Atriplicis hortensis folliculorum æmuli, antequam folia erumpunt præcoci maturitate decidentes & singula singuli semina continentes, pro characteristica sufficiunt. R. Synop. p. 229.

Ulmus Offic. J. B. Vulgaris Park. Campestris C. B. Vulgatissimus folio lato, scabro Ger. emac. Rüst-Baum. In sepibus. Usu. Cortex, Folia sed rarò. Vires. Cortex glutinandi vim habet, dolores Podagricos mulcet, Ischiadem mitigat, alvum purgat, pituitasque & aquas privatim trahit. Folia astringendi vim habent. Dioscorid.

## X. De Tamarice.

**N**otæ ejus sunt, folia Cupressi seu Ericæ vulgaris, flores spicati, multa semina lanugine involuta, simul conferta racematim in summis ramis. R. H. P. 1704.

Tamariscus Offic. Narbonensis Ger. Folio tenuiore Park. Tamarix altera folio tenuiore, sive Gallica C. B. Major sive arborea Narbonensis J. B. Tamarisfen. In hortis colitur. Major & Junio floret. Usu. Cortex, Lignum, Summitates, Flores Vires. Calefacit, & siccatur, attenuat, aperit, abstergit, subastringit, diureticus est ac splenicus. Usus præcip. in obstructione ac tumore Lienis, in morbis ab atra bile ac sero oriundis, ut Scabie, Pruritu, in Ictero nigro, Profluvio albo mulierum &c. Extrinsecus imprimis in Tinea capitis, &c. Schrod.

## XI. De Erica.

**N**Ote sunt, statura humilis, folium perpetuum, flos nudus, vasculum seminale in imo flore seu calyce clausum; in frigido, sterili, squalido, palustri & spongioso solo vigere, quod paucissimis plantis conceditur. R. Synop. p. 230.

Erica Offic. vulgaris Park. Vulgaris sive pumila Ger. Vulgaris glabra C. B. Vulgaris humilis, semper virens, flore purpureo & albo J. B. Gemeine Heide. In Ericetis frequens, Junio floret. Usu. Flores. Vires. Aqua florum destillata ruborem oculorum tollit, & dolorem mitigat: quin & colicis laborantibus utiliter exhibetur. Trag. Fomenta & balnea sudatoria è floribus confecta podagricis & paralyticis membris conducere creduntur. Matth.

## SECTIO DECIMA.

De Arboribus & Fruticibus  
Siliquosis.

**S**iliquas appellamus, Folliculos seu seminum conceptacula in longitudinem producta, sive ea membranacea sint aut coriacea, sive crustacea aut ignea.

Notandum autem non omnes in universum fructus quos siliquosis accensemus in longitudinem productos esse, sed nonnullos breviores & tumidiore, quos tamen quia reliquis notis cum siliquosis conveniunt ab iis nullo modo



modo separandos duximus. Sic quæcunque plantæ folliculos habent bivalves cum seminibus ad rachin annexis uno ordine sitis, cujuscunque tandem figuræ, sive longæ sive brevioris & subrotundæ folliculi sint, siliquosæ nobis censentur. R. H. p. 1717.

Arbores & Frutices siliquosæ sunt vel flore

{ Uniformi

{ Pentapetalo, foliis

{ Compositis ex pluribus pinnarum conjugationibus

{ Impari folio alam claudente, siliquis teretibus longis, per maturitatem nigris, multis membranis aut diaphragmatis interceptis, quibus pulpa mellea adhæret; *Cassia fistularis*.

{ Nullo in extrema costa impari folio, siliquis

{ Bivalvibus, compressis, latissimis, semina etiam compressa gigartidis similia claudentibus, flore luteo, staminibus falcatis è flore exsertis; *Senna*.

{ Trivalvibus, quibus semina triangularia; *Balanus Myrepfica*.

{ Binis in eodem pediculo, lobo magno crassissimo eduli, semine osseo magno; *Animifera arbor*.

{ Simplicibus, siliquis brevibus; in singulis semine contento

{ Monopyreno; *Copaiba*.

{ Polypyreno, siliquis etiam hispidis; *Achiott*.

{ Hexapetalo, odorato, auricularum penè forma; folia ei longa & angusta, siliquæ etiam longæ seminibus angulosis repletæ; *Xochinacaztlis*.

{ Octopetalo, foliis perpetuis compositis, nullo in extremo nervo impari folio, siliquis crassis incurvis unâ cum seminibus pulpam nigram acidam continentibus; *Tamarindus*.

{ Difformi

Scandentes, foliis plantaginis, singulis alternatim  
positis, siliquis longis, angustis, odoratis; *Vay-*  
*nillus.*

Erectæ

Trifoliæ, viminibus seu ramulis angulosis, te-  
nuibus, densis, virentibus; *Genista.*

Polyphillæ, seu foliis pinnatis

Spinosæ, nullo in extrema costa impari folio,  
siliqua

Sinuosa, compressa, isthmo intercepta; *A-*  
*eacia.*

Plana, compressa, aculeata; *Brasilia arbor.*

Non spinosæ, foliis deciduis, siliquis compressis,  
dulcibus, carnosis, esculentis; *Caroba.*

His addi possunt *Sarcocollifera arbor* quæ à nonnullis  
siliquosa flore papilionaceo esse affirmatur, quamvis  
nobis hætenus incognita sit.

## Arbores & Frutices siliquosæ flore uniformi.

### I. De Senna.

**N**ote sunt, Siliqua bivalvis, membranacea, latissi-  
ma, compressa, Semina etiam compressa gigartis  
similia, flores pentapetali lutei, stamina falcata e flore  
exserta.

Senna Alexandrina Offic. Alexandrina sive  
foliis acutis C. B. Sena Ger. J. B. Alexandrina  
Park. Alexandrinische Senesblätter. In Syria,  
Persia, Arabia & in Ægypto colitur. *Ulu.* Folia  
sunt acuta, saporis subacris, amaricantis, nau-  
seosi; optima censetur quæ ex Alexandria  
transportatur, recens, & à stipitibus liberata.

*Vires.*

*Vires.* Senna inter purgantia usitatissima est, adustos ac serofos humores & hinc flavam bilem, pituitamque ex Capite, Epate, Liene sat benignè educens. Quia calida & sicca est, corrigitur floribus Violarum, Boraginis & fructu Prunorum; & quia flatulenta, quò minùs Ventriculo obesse possit, Cinnamomo, Galanga, Zinzibere, &c. *Schrod.*

## II. De Glande Unguentaria.

*Notæ sunt, Siliqua trivalvis, carne albâ, semina secundum longitudinem siliquæ occultante, plena: Semina triangularia putamine integro, nuce de more tecta, fragili, nucleum pinguem crassiusculâ fungosâ pelliculâ obductum continente: Flos pentapetalus, &c. Breyn. 2. P.*

Balanus myrepica ☿ Glans unguentaria *Offic.* myrepica *Ger.* Glans unguentaria *C. B.* Nux unguentaria *J. B.* Nux Ben sive Glans unguentaria *Park.* Ben-Nuß. Crescit in Arabia. *Ussu.* Fructus Avellanæ minoris magnitudine, triquetri, includentes sub putamine corticoso & pellicula candida fungosa, nucleum triquetrum, pinguem, albidum, saporis subacris, amari, nauseosi & oleosi. *Vires.* Nucleus calefacit & siccat, deterget, purgat supra ac infra, educitque bilem ac pituitam. Curat scabiem, Impetiginesque sanat. *Schrod.* NB. Oleum ex nucleis exprimitur, & sub titulo Olei de Ben ex Italia ad nos transfertur.



## III. De Copaiba.

**N**Ote sunt, Folia obrotunda seu ovalia, flos pentapetalus, siliqua monospermos.

1. Capius Offic. Copaiba Pis. Marg. Arbor Balsamifera Brasiliensis fructu Monospermo *R. H. p. 1759.* Balsamum Americanum C. B. Album *Park.* certarum quarundam plantarum quas Copaibas vocant *J. B. Weisser Americanischer Balsam-Baum.* In Brasilia succrescit. *Usu.* Balsamum est substantia resinosa, liquida, ex albo flavescens, saporis acris, amari, aromatici, odoris fragrantis, ex arbore vulnerata sponte effluens. *Vires.* Consolidat & mundificat, vulnera imprimis nervorum sanat, morsusque serpentum curat. Intrinsecus commendatur in Dysenteria, Diarrhœa, aliisque fluxibus alvi, in fluore albo & in Gonorrhœa.

2. Balsamum Peruvianum Offic. Peruvianum nigrum *Park.* ex Peru *J. B. Hoitziloxitl* seu Arbor Balsami Indici, sive Balsamifera 1. *Hern. Cabureiba* sive Balsamum Peruvianum *Pis. Cabui-Iba Marg. Peruanischer Balsam.* In Nova Hispania, & alibi Americanæ provinciæ crescit. *Usu.* Balsamum substantia est resinosa, densa, ponderosa, melleæ consistentiæ: color ex rufso ad nigrum vergens: sapor subacris & mordicans, odor fragrantissimus. *Vires.* Calidum est & siccum, dissolvit, digerit, confortat; interius exhibitum Asthmati prodest, intemperiem quoque ventriculi, viscerum languores inveteratos corrigit, obstructions tollit, cerebrum

ac nervosum genus corroborat. Ad internos & externos affectus non inferiori gaudet qualitate quàm præcedens, inquit *Pison*.

#### *IV. De Achiotl.*

**N**Otae sunt, folia lata, subrotunda, flores pentapetalii, grandes, incarnati coloris, siliquæ breves, pyramidales, hispida, polypyrena.

*Achiotl. Offic.* seu Medicina tingendo apta *Hern.* *Daburi Ger.* *Urucù Pis. Marg.* è qua fit tinctura *Orellana* dicta *R. H. p. 1771.* Arbor *Mexiocana* fructu *Castaneæ*, coccifera *C. B.* *Orleana* seu *Orellana* folliculis lappaceis *Herm. Cat.* seu *Orellana* sive *Urucu. P. B. P. Bixa Oviedi J. B.* Arbor finium regundorum *Scalig.* In *Nova Hispania* & *Brasilia* colitur, *Uyu.* Tinctura è fructu facta in compositione illa famosa *Chocolata* dicta, hoc modo præparata. Sumunt grana benè matura, eaquæ infundunt aquæ calidæ, & ex subsidentia vel tabellas conficiunt vel lanastingunt. *Vires.* Tinctura cum aliqua aqua ejusdem temperaturæ hausta, aut foris adhibita, mitigat æstus febriles, sistit sanguinolentas dejectiones, discutit tumores, &c. *Pis.* Extrinsecus Tincturæ ad lanas colorandas usus est, & ad fucum foeminarum; à nostratibus autem *Spanische Wolle* dicta est.

#### *V. De Cassia Fistula.*

**N**Otae sunt, *Siliqua integra, dura, lignosa, propendens, cum orbiculis intergerinis duris, lignosis; in cellulis, pulpâ glutinosâ, vel carnosâ quadam substantiâ, semen occultante, Breyn. 2. P.*

*Cassia fistula* *Offic. Ger.* *Fistula Alexandrina* C. B. *Fistula vulgaris flore luteo* Breyn. 2. P. *Solutiva vulgaris* Park. *Purgatrix* J. B. *Arbor Cassiam solutivam ferens* Bont. *Conna* H. M. *Tom.* 1. *Quauhayohuatli* II. sive *Cassia fistula* *Hern.* *Cassien-Röhren-Baum.* In Ægypto, Nova Hispania, & in India Orientali oritur. *Uss.* Fructus seu siliqua oblonga, rotunda, cylindracea, nigricans, includens sub putamine corticoso, duriusculo, in ordine dispositis loculamentis, semina depressa, nitida, fulva, pulpa nigra, mellea, occultata, saporis subacris & subdulcis. Eligendæ sunt ponderosæ, recentes, plenæ, in pulpa pingues. *Vires.* Medulla seu Pulpa alvum lenit, clementerque sine torminibus fæces educit. *Schrod.* Bilem serolosque humores purgat, & convenit in ardoribus tum externis, tum internis, sanguinem contemperans & puriorem reddens *R. H. p.* 1747. de quo plura videas.

## VI. De Animifera Arbore.

**F**olius magnis acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno, crassissimo, eduli, semine osseo à reliquis differt.

*Gummi Animæ* *Offic.* seu *Resina Animæ* *Schrod.*

*Animæ* *R. H. p.* 1846. *Arbor Brasiliensis siliquosa*

& *gummifera*, *Gummi Animæ simili ejusd.* *p.* 1460

*siliquosa ex Virginia lobo fusco, scabro* C. B. *Siliquosa ex qua gummi Animæ elicitur ejusd.* *Ani-*

*mifera arbor Brasiliana* P. B. P. *Acaciæ quodam-*

*modo accedens, Arbor Animæ gummi fundens,*

*Americana, foliis magnis acuminatis in pedicu-*



binis, Lobo magno crassissimo eduli Breyn.  
P. Ceratia diphyllos Antegoana, Ricini ma-  
ris fructu ossea siliqua grandi incluso P. P. Tab.  
2. Jetoiba Pis. Marg. Lobus ex Wingande-  
aouw J. B. Mizquixochicopalli sive Copalli fe-  
a IX. Hern. Locus vulgò. In Nova Hispania &  
brasilia oritur. *Usu.* Gummi seu Resina arida,  
magnitudinis variæ, foris albida, intus ex can-  
ido flavescent, aliquatenus transparent, fria-  
bilis, saporis resinosi, odoris dum accenditur  
fragrantis. *Vires.* Calefacit, humectat, atte-  
nuat, resolvit, &c. cephalica est. Usus præci-  
uus est externus in capitis ac nervorum affe-  
ctibus frigidis, dolorificis, catarrhosis, flatu-  
entis, in affectibus articulorum, Paralyti, &c.  
Schrod.

## VII. De Flore Auriculæ.

*Notæ sunt, folia longa & angusta, flores hexapeta-  
li, auricularum pene forma, odorati, siliqua longa,  
seminibus angulosis sanguinei coloris repleta.*

Xochinacaztlis seu Flos Auriculæ Hern. Fru-  
ctus oblongus, cineraceus, acidulus C. B. Ore-  
juelas seu Orichelas Hughes. In Nova Hispania  
crescit. *Usu.* Flos in compositionem Chocolatæ  
admittitur ad odorem & saporem suavem ei  
addendum. *Vires.* Calida & sicca est, flatus  
discutit, pituitam extenuat, ventriculum debi-  
lem & frigidum coroborat & calefacit.

## VIII. De Tamarindo.

*Siliquis crassis, incurvis, unâ cum seminibus pulpam acidam continentibus, nullo in extremo nervo impari folio. R. Meth. p. 41.*

Tamarindus Offic. Ger. Park. J. B. Bont. Hern. Siliqua Arabica quæ Tamarindus C. B. Jutay sive Tamarindus Pis. Balam-pulli sive Maderam-pulli H. M. Tom. 1. Saur. Datteln-Baum. Non solum hæc arbor in Arabia crescit, sed etiam in utraque India. *Ussu.* Fructus seu pulpa membranacea ex siliquis exempta, colore ex fusco nigricante, saporis subacris & acidi. Eligendi recentes, nigro-rufescentes, teneri, multis villis intertexti, pingues, acidi. *Vires.* Refrigerat & ficit, humorum acrimoniam & fervorem reprimat, bilem ac adustos humores blandè educit, siti succurrit. *Schrod.*

---

*Arbores & Frutices siliquosæ floribus difformibus seu Papilionaceis.*

## IX. De Araco Aromatico.

**N**ote, Volubilis est planta, foliis Plantagineis, singulis ex utraque parte caulis alternatim positus, floribus nigricantibus, siliquis longis, angustis, odoratis.

Vaynillus Offic. seu Banillus R. H. p. 1672. Volubilis siliquosa Mexicana, foliis Plantaginis ejusd. p. 1330. Tlilxochitl Mexicanis Pis. Mant. A. Aracus Aromaticus, Tlilxochitl, seu Flos niger  
Hern.

*Hern.* Tlilxochitl Convolvuli Indici species  
*Amman.* Vainiglia quibusdam. In Nova Hispania & aliis calidis regionibus provenit. *Ufu.* Fructus compressus, formâ Vaginam referens exterius nigricans, quasi coriaceus, interius pulpa concolori cum minutissimis acinis, instar ficûs refertus, saporis subacris, pinguis & aromatici, odoris fragrantis, Moschum redolentis. Ingreditur Chocolatam. *Vires.* Urinam ciet, menstrua evocat, partum accelerat, ac secundinas mortuûmque foetum expellit; ventriculum calefacit & roborat, flatus discutit, humores crudos concoquit, cerebrum confortat. *Hern.*

## X. De Genista.

**F**oliis in eodem pediculo ternis, viminibus tenuibus, angulosis, confertis, ab aliis siliquosis flore papilionaceo donatis fruticibus distinguitur. R. Synop. p. 232.

Genista Offic. Ger. Vulgaris & Scoparia Park. Angulosa & Scoparia C. B. Angulosa trifolia J. B. Psrimmen oder Genster. In pascuis arenosis & glareosis abundè oritur. Majo floret. *Ufu.* Tota planta, Flores, Semen. *Vires.* Splenetica & nephritica censetur, hinc & epatica, calefacit & siccant, aperit, attenuat, abstergit, calculum pellit, aquosos humores educit, tam per vomitum quàm per alvum & urinas. Hinc usus ejus insignis in obstructione Epatis & Lienis, Mesenterii, adeoque in Hydrope, catarrhis, arthriticis affectibus. *Schrod.*



XI. De *Acacia*.

**N**Otæ, quibus à *Mimosa* discernitur, sunt: Siliques bivalvis, crassæ, duræ, & validæ; Semina substantiâ quadam carnosâ vestita, vel ei interposita Breyn. 2. P.

*Acacia* Offic. *Vesling*. Vera 'Schrod. J. B. Vera sive Spina *Ægyptiaca* Park. Vera *Ægyptiaca* siliquis sinuosis, sive Lupini Breyn 2. P. *Ægyptiaca* Col. in Rech. *Ægyptiaca* foliis Scorpioidis leguminosæ, siliquis albis compressis, isthmum interceptis, floribus luteis *Herm. Cat. Dioscoridis* Ger. Foliis Scorpioides leguminosæ C. B. *Ægyptia*, siliquis Lupini, floribus luteis P. B. P. Mixquitl seu *Acacia* *Hern. Egyptischer Schoendorn*. In *Ægypto*, *Arabia* &c. succrescit. *Usu*. Succus inspissatus è fructu immaturo expressus, colore intus rufescens seu subfulvus, extus verò nigricans, saporis acerbi, & austeri, cum adstringentia. Et hic est vera veterum *Acacia*, inquit *Schroderus*, quæ Theriacam ingreditur, recipiendaque est, ubi *Acaciæ* simpliciter mentio fit. Et *Gummi Arabicum* dictum, substantia est gummosa ex albo flavescens, pallida & pellucida, saporis aquei viscosi, incisione sponte exsudans. Eligendum vitri modo pellucidum, syncerum, in vermiculorum speciem contractum, candidum vel ad flavedinem inclinans. *Vires*. Succus refrigerat, siccatur, crassarum partium est, increpatur, astringit. *Gummi* calescit & humectat, inspissat, poros cutis obstruit, acrimoniam medicamentorum obtundit, asperitati asperæ arteriæ ac tussi confert, ocula-

ibus medicamentis & arteriacis commodissime adhibetur. *Schrod.*

2. Gummi Senica *Offic.* Gummi Arabico simile est, sed glebis majoribus, exterius scabrum, intus clarum & transparens, colore aliàs albicante, aliàs rubente, sapore aqueo seu fatuo, & glutinoso, odoris nullius. Ex Guinea Africana ad nos adfertur, nomenque, (ut nonnulli affirmant) à Senega fluvio mutuatur. Verum enim verò è quam Arbre seu emanet seu eliciatur, me latet, ni fortè Acaciæ quædam species sit: ut ob similitudinem suam cum Gummi Arabico cui respondet conjicere licet. *Vires.* Ut figura & specie externa sic etiam viribus cum gummi Arabico convenit.

Pharmacopolæ nostrates Londinenses candidissimas & maximè pellucas hujus partes diffractas pro gummi Arabico divendunt.

## XII. De Caroba.

*F*oliis pinnatis, latis, deciduis, Spinis carentibus, siliquis compressis, carnosiss, dulcibus, esculentis, à reliquis differt. R. Meth. p. 40.

Caroba *Offic.* Ceratia siliqua sive Ceratonia Ger. Ceratonia Herm. Cat. Siliqua *Schrod.* Dulcis C.B. Dulcis sive vulgatiore Park. Arbor sive Ceratia J. B. St. Johannis Brod. In Sicilia, Apulia & regno Neapolitano oritur. *Usu.* Fructus sed rarò. *Vires.* Siccatur & astringit. *Uusus* præcip. in ardore Stomachi, tussi, &c. Alias concoctu est difficilis. *Schrod.*

## XIII. De Brasilio.

**N**Ote sunt siliqua bivalvis, crassa, in extremo lata, semina longiora quàm lata, folia pinnata.

1. Brasilia *Offic.* arbor *Park.* Brasiliun lignum

*J. B.* Pseudosantalum rubrum sive Arbor Brasilia *C. B.* Ibirapitanga sive lignum rubrum *Pis.* Brasiliensibus *Margg.* Crista pavonis Coronillæ folio tertia, sive tinctoria maxima Brasiliana, flore variegato parvo odoratissimo, siliquâ aculeatâ, lignum Brasiliun dictum ferens *Breyn.*

2. *P.* Erythroxylum Brasilianum spinosum foliis Acaciæ *P. B. P.* Brasilien-Holz. In Brasilia crescit. Decembri floret. *Uss.* Lignum seu potius matrix ad tingendum utilis. *Vires.* Frigidum est & siccum, mitigat febres, restringit ac corroborat instar Santali, &c. *R. H.* p. 1737.

2. Lignum Sapan *Offic.* Ligno Brasiliano simile *C. B.* Lignum Brasilio simile cœruleo tingens *J. B.* Crista pavonis Coronillæ folio secunda, sive tinctoria Indica flore luteo racemoso minore, siliqua latissima glabra, lignum rubrum Sappan dictum ferens *Breyn.* 2. *P.* Erythroxylum sive lignum rubrum Indicum spinosissimum *Colutæ* foliis, floribus luteis, siliquis maximis *P. B. P.* Tiam pangam *H. M. Tom.* 6. Lignum Sapan vulgo. An Jacaranda *II. Pis.*? In India Orientali atque etiam Occidentali oritur. *Uss.* Lignum ad tingendum utile, in medicina rarò.

3. Lignum rubrum *Offic.* Santalum Octavum sive Ligno Brasiliano simile *C. B.* Brasilio simile

Li-



**Lignum Phernambuci** Germanis dictum *J. B.* In Brasilia succrescit. *Usu.* Lignum ad tingendum utile.

4. **Santalum rubrum** *Offic. Ger. Park. C. B. J. B.* *Rohrer Sandel.* In India Orientali intra Gangem fluvium crescit. *Usu.* Lignum seu potius cor vel Matrix ab integumentis exterioribus, cortice & ligno separata, solida, densa, ponderosa, coloris rubicundi. *Vires.* Hoc genus Santali refrigerat & astringit: unde quicquid virium Arabes aliique adversus ardores aliosque morbos calidos Santalis attribuant, huic potissimum conveniunt. *R. Hist.*

5. **Lignum Nephriticum** *Offic. Park.* *Nephriticum* coeruleo & flavo tingens *J. B.* *Peregrinum* aquam coeruleam reddens *C. B.* *Coalti* sive *Aqueus serpens* *Hern. Größ-Holz.* In Mexicana oritur. *Usu.* Lignum ruscum, solidum, durum, grave, saporis subacris amaricantis. *Vires.* Calefacit & siccatur. *Uusus* ejus receptus est ad Renum Vitia, Urinaeque difficultates & incommodo. Hinc in Epate & Lienis obstructionibus convenit. *Schrod.*

#### *XIV. De Sarcocollifera.*

**Sunt** qui arborem siliquosam, flore papilionaceo faciunt, qua de causa eam hoc in loco disposui. Aliqui Tithymalum Persicum spinosum esse affirmant.

**Sarcocolla** *Offic. C. B. Park. Officinarum J. B.* *Fleischbein.* *Lachryma gummea* est in granulis,  
*G g* *Man-*

*Mannæ seu pollini Thuris similis, spongiosa, colore subruffa, saporis amaricantis & lenti, obscura quadam dulcedine. Ex Persia ad nos transfertur. Eligenda recens, coloris ad pallorem vergentis (vetusta enim rubescit) saporis amari, substantiæ porosæ, glutinosæ &c. Vires. Calefacit & siccatur, astringit, consolidat, glutinat, coquit, maturat. Usus præcipuè in vulneribus extergendis, consolidandis, cicatrice obducendis, unde & nonem adepta est, &c. Mirificè prodest in Oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis, (maceratur in lacte Asinino vel humano dies quinque, postea cum aqua Rosarum mixta, ciliis imponitur, addito si libet tantillo Sacchari) In hæmorrhagiis narium anacollematis admiscetur. Schrod.*

---

## SECTIO UNDECIMA.

### *De Partibus Stirpium minus cognitarum.*

**A**Tque hic *Phytologiæ meæ colophonem addidissim, ni supersuissent adhuc paucula quadam simplicia Officinalia quæ Plantarum partes sunt, quorum tamen originis, aut plantarum productricium, nulla neque apud Veteres neque apud Recentiores certa extant vestigia; quocirca, quò ea referrem incertus, locis suis in præcedenti opere disponere non potui, verum satius duxi seorsim exhibere, & sectionem propriam iis assignare; & licet non adeo numerosæ sint, secundum methodum tamen in Catalogis simplicium*

*Phar.*

*Pharmacopœis omnibus præfixis observatum, in quatuor partes seu genera, viz. Radices, Cortices, Ligna & Gummi, distribui.*

---

## *I. De Radicibus minus cognitis.*

### *De Rhodio.*

**L**ignum Aspalathi, & Rhodium Offic. Rhodium lignum Schrod. Rhodieser Holz. *Vi- res.* Dioscoridi & Galeno calefacit, siccatur & astringit, unde commendatum ad ulcera oris, ad nomas genitalium & sordida ulcera, ad alvi fluxus. Verum enim verò an hæc nostrati convenient cuivis licet experiri. Vix enim modernis practicis in usu est, nisi quòd interdum ad Renum Calculos decoctis incoquatur. Schrod. Officinis nostris cephalica esse existimatur, & inter odoramenta enumeratur. Duplex in Officinis nostris invenitur ex insulis Canariensibus & aliunde ad nos allata.

1. Aspalathus colore Buxi C. B. Radix est lignosa, dura & contorta, torulis pinguibus & resinosis subinde interstincta, à cortice derafo, colore Buxi, odoris rosei fragrantis, ac resinosis, saporis subamari & pinguis.

2. Aspalathus albicans torulo citrio C. B. *Ger. emac.* Lignum Rosæ odore, aliis Aspalathus J. B. Radix est lignosa, dura ac solida, bicolor, in media fulva, in ambitu alba, cortice satis crasso, scabro, coloris ex fusco cinerei tecta, odore & sapore præcedentis. De ligno Rhodio quid



fit magna inter Autores dissensio & lis est. *Ruellius*, *Casparus Baubinus*, atque etiam Officinæ nostræ *Rhodium* & *Aspalathum* idem esse statuunt; quæ sententia à *Cordo* oppugnatur affirmante *Aspalathum Agallochi* speciem esse, & pro *Agallocho* in Officinis venire. Verùm *Aspalathus Veterum* quid sit in Officinis nostris hodie ignorari à *Matthiolo* aliisque affirmatur. (Quid sit *Aspalathum Pharmacopolis* dictum in capite de *Agallocho* ostendimus,) *Anguillarius* & *Matthiolus* *Rhodium Oleastri* speciem esse volunt in insula *Rhodo* nascentis, (unde & nomen hausisse sunt qui imaginantur) quibus ab *Honorio Belli* contradicatur, qui *Rhodium Cytisi veri Maranthæ* i. e. *Cytisi incani* siliquâ falcata *C. B.* lignum esse affirmat, cui etiam *Parkinsonus* suffragatur. Quod tamen vero vix simile videtur, (inquit doctissimus *Paulus Ammannus*) quoniam *Cytisus* non fundit Resinam ut *Rhodium*, nec alium præter herbaceum obtinet odorem.

In Catalogis simplicium Pharmacopœiæ Londinensis, aliisque præfixis, lignis perperam intermiscetur, cum quotquot ego unquam viderim hujus nominis frustra seu bacilli stirpium quarundam radices, earumve partes lignosæ fuerint, vel fortè Sarmenta vitiginea *Viornæ* cujusdam, vel *Clematitidis Canariensis*. Vide *Ligni Rhodii* speciem apud *Cl. Plukenet. in P. T. 201. F. 3.*

## II, De Corticibus, minus cognitis.

### De Cortice Thuris.

**C**ortex Thuris Offic. R. H. p. 1841. Elaterii Pharmacopol. Thymiana Schrod. Storax rubra Officinarum C. B. Thus Judæorum Park. Weirauch, Schalen. Ex India Orientali ad nos transportatur. Cortex est cannulatus, in tubulos seu calamos convolutus, fragmentis parvis, Cinnamomi crassitie, colore ferrugineo, sapore acri aromatico & amaro, odore, præsertim cum adoletur, suavi & jucundo, exteriori cuticula quæ aspera est & cinerea, plerumque exutus. Præfertur crassus, pinguis, odoratus, recens, lævis, minimè scaber. *Vires.* Contractionibus vulvæ ex suffitu prodest, odoris jucundi gratiâ & suffimentis immiscetur. *Schrod.*

Cortex isthic Thuris Officinis dictus, cujusnam arboris spolum sit, non convenit inter Rei naturalis authores, aliis hoc, aliis aliud affirmantibus. Nonnulli Νάοναφθον sive Νάγναφθον, *Dioscoridis*, lib. I. cap. 22. quod ex India defertur corticosum Mori libro simile, quod jucundi odoris gratiâ suffitur, eum esse volunt. *Cæsalpinus* pro extrema cortice Nucis Myristicæ arboris habet; *Amatus* pro specie illa Calambac, à Lusitanis Lignum Aquilæ dicta: *Parkinsonus* ipsius Thuriferæ arboris corticem esse existimat; verum cujusnam, an nullius harum sit, non ausim determinare. At neque *Casparo*

*Bauhino* aut *Bellonio* assentire possum, *Corticem* hunc *Styracem rubram Officinarum* esse, de qua in capite de *Styrace* egi, quò *Lectorem* remitto, ne eadem repetere cogar.

---

### III. De Lignis minus cognitis.

#### De Agallocho seu Ligno Aloes.

1. **A** Gallochum, Xyloaloes, & Lignum Aloes *Offic.* Lignum Aloes *Park. L.* Aloes vulgare *Ger. emac.* Agallochum *Officinarum C. B.* Lignum Aloes *Officinarum & Agallochum* plerisque putatum *J. B. Musserlesen Paradies; Holz.* Fragmenta lignosa sunt interioris medullæ arboris *Chinensis Calambac dictæ*, magnitudine varia, solida, densa, resinosa, & ponderosa, colore spadicea, striis nigricantibus & resinosis conspicua, saporis subacris, amari, aromatici & pinguis, odoris dum accenditur fragrantis. Ex *China* ad nos in frustra parva aut fragmenta divisum transmittitur, quæ optima censentur nigro purpurea, amara, ponderosa, &c. *Vires.* Calefacit, siccatur, confortativum est omnium viscerum ac præcipuè *Cerebri, Cordis ac Uteri; Spiritus vitales ac animales recreat: hinc medetur Lipothymia, amaritudine sua Lumbricos necat.* Externè creber usus est in cucuphis & Epithematibus cordialibus. *Sebrod.*

2. Lignum Aspalathum *Pharmacopolis.* Rhododies



dieser, Dorn. Frustra sunt lignosa & bituminosa, Ligno Aloes laxiora & crassiora, colore pallidiora, saporis amaricantis, pinguis & resinosi, odoris debilioris; ex India Orientali ad nos transportatur. *Vires.* Similes habet virtutes cum præcedente (pro quo frequens venditur) sed debiliores.

Agallochum Antiquorum plerique Botanici idem esse putant cum Ligno Aloes Officinarum, alique Aspalathum veterum idem esse affirmant. Alii, præsertim Arabes in multa distinguunt, *Garcias* autem unicum genus Indicum novit: Officinæ, ex observatione *Clusii*, duo genera Ligni Aloes demonstrant. *Casparus Bauhinus* triplex genus distinguit. Primum vocat Agallochum præstantissimum. quod solum inter Reges Indiæ distribuitur. Secundum Agallochum Officinarum est, de quo agimus. Tertium est Agallochum sylvestre. In Officinis autem nostris duo tantum venduntur, ut superius ostendimus & certum est, nos habere verum Agallochum seu Lignum Aloes à China allatum nomine *Calambac*, est autem arbor procera, à nullo authore, quod sciam descripta, nam de qua *Garcias ab Horto* scribit, non eadem est, ut Botanici periti qui in India Orientali peregrinati affirmant, sed Aspalathi nobis secundo in loco descripta.

Cur Agallochum Lignum Aloes vocetur inquit *Paulus Ammannus*, multi sunt adhuc incerti. *Hofmannus*, lib. 2. cap. 25. addit: Forſan Ἰνδικό Idiomate denotat odoramentum, *Bontius*

ad cap. 16. *Garc. ab Horto. p. 43.* Derivat denominationem à sapore, his verbis: Lignum hoc Aloes gustu planè aromaticum & subamarum est, unde forsàn Aloes nomen mutuatum fuit. Nemo enim velim credat, Aloem, succum Officinarum concretum esse hujus arboris, ut eum facit *Wormius p. 272.* Est enim arbor hæc peculiaris, & procera, ut superius diximus; Aloe autem succus est plantæ ejusdem nominis, ut in capite suo ostendimus. Qui plura de ligno Aloes velit, consulat Historiam Plantarum excellentissimi illius viri *D. Joannis Raii* vicini & amici nostri.

---

#### IV. De Plantarum quarundam succis in Medicina usitatis minus cognitis.

##### I. De Olibano seu Thure masculino.

**O** Libanum & Thus maris Offic. sive Thus *Park. Thus J. B. Schred.* Arbor thurifera *Ger. C. B.* Thus masculinum quibusdam. *Beirauch.* Substantia est resinosa, ex flavo pallescens, duriuscula & pellucida, in guttas parvas Mastichi similes concreta & indurata, saporis amaricantis & resinosi, odoris fragrantis. Stillat sponte sua ex arbore. Ex Turcia & India Orientali ad nos transportatur. Præfertur quod in guttulis est. *Vires.* Calefacit & siccatur, subastringit. Usus præcipui intrinsecus ad varios capitis & pectoris affectus.

Stus, ut & ad alvi uterique profluvia, ad tussim, vomitum, sanguinis exscreationem, diarrhœam, dysenteriam mitigandam. Extrinsecus intervrit suffitibus pro capite roborando, catarrhos discutit, cava ulcera carne replet & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera cephalica imprimis glutinat, perniones sanat, ulcera cacoëthea, tum sedis, tum reliquarum partium demulcet, oculorum rubedini ac lipitudini medetur, verrucas incipientes & impetigines abigit. *Schrod.*

Manna Thuris *Offic.* sunt micæ, fragmenta, (pollen ac farina) Thuris, quæ ex collisione, dum in saccis vehitur, colliguntur. Alii autem per Mannam Thuris grana ejusdem intelligunt.

De Arbore Thurifera nihil certi traditur. *Theophrastus* Arborem non magnam esse tradit, quinque fere cubitis attolli, ramosam esse, folia habere Pyro similia, corticem lævem ut *Laurus*: alii tamen (inquit) similem *Lentisco* esse aiunt, & ejusdem fructus subrutilo folio: alii & cortice & folio etiam *Lauri*. *Diodorus Siculus* *Acaciæ* *Ægyptiacæ* formam Arbori thuriferæ attribuit, *Salicis* foliis, *Garcias* quoque Thuris arborem humilem esse & folia habere *Lentisco* similia scribit. At *Thevetus* Arborem thuriferam *Pinus resiniferas* referri tradit. De vera ergo forma hujus arboris (inquit doctissimus *D. Joannes Raius*) etiamnum incerti manemus. Pro Thure Vulgari *Officina*rum V. Cap. de *Pinu*sylv.



**B**dellium Offic. Park. C. B. J. B. omnium Autorum R. H. p. 1844. Duplex in Officinis nostris reperitur. 1. Est substantia gummosa & resinosa pinguis, ceræ instar, tenax, glutinosa, coloris ex ferrugineo nigricantis ad myrrham accedentis, cujus saporem & odorem æmulatur. Ex Arabia Media & India, ad nos transportatur. 2. Est substantia resinosa, duriuscula, nigricans, friabilis, in guttas concreta & indurata, sapore & odore præcedentis. Ex Guinea ad nos adfertur. Probatur gustu amarum, translucentum cum frangitur, pingue cum fricatur, odoratum, syncerum. Prius præfertur. *Vires.* Calefacit & siccatur, digerit, discutit, sudorem movet. *Uusus præcip.* internus in Tussi, ac Pulmonum apostematis, calculo atterendo, Urinacienda, mensibus immodicè fluentibus, ut & in flore uterino sistendo, foetu expellendo. Extrinsecus discutit Hernias, mollit durities ac nervorum nodos, adeoque creberrimi usus est in Emplastris stipticis. *Schrod.*

De Bdellio tamen, inquit doctissimus *Paulus Ammannus*, hæc controversia decidenda venit, quid sibi voluerit *Discorides* his verbis. *Βδέλλιον ἐστὶν ἐν ὁσίοις ἐν τῇ Ἰνδία, καὶ εἰς τὸν ὄνυχον.* hoc est, Bdellium est odoratum in suffitu. Et simile ungui. Ratione prioris nimirum fragrantiae, res facilis est: ast quâ ratione ungui sit simile, altercantur Auctores adeò, ut quidam ex illis intelligant ungues humanos, quos ratione macularum, quæ

uæ interdum unguibus humanis insunt, re-  
ræsentrare credunt. Verum enimverò qui  
orunt *Blattam Byzantinam* unguem vocatam  
uisse, facilè has lites componere possunt, di-  
cendo, *Bdellium* in suffitu ungui simile esse, sc.  
*ingui odorato*, id est, *Blattæ Byzantine*. Plura  
vide apud *Matthiolum* in l. i. *Dioscorid.* cap. 70.  
68. 70.

De *Bdellifera* etiam arbore nihil certi tradi-  
tur. Describente *Plinio* nigra est, magnitudine  
*Oleæ*, folio *Roboris*, fructu *Caprifici* natura-  
que. Alii *Arbori Myrrhiferæ* eam valdè simi-  
lem faciunt. Et *Thevetus* affirmat se bis mille  
*Myrrhæ* & *Bdellii* feraces arbores in eadem syl-  
va simul crescentes vidisse. *Lobelius* & *Pena* inter  
alias merces se multos hujus ligni surculos ex-  
piscatos tradunt solida substantia, cortice du-  
ro nigricante, spinis multis rigidis & crassiu-  
culis horrentes. An *Arbor lactescens*, aculeata,  
foliis *Quernis Americana*, *Bdellifera* fortè,  
ive *Arbor Bdellium* ferens in *America P. P.*  
*Tab. 145*? *Arbuscula Portoricensis lactescens*  
foliis *Quercinis* spinis geminis ad singulorum  
foliorum ortum exasperata *Hort. Beaumont*?  
*Quercinis* foliis *Arbuscula spinosa lactescens*  
*Portoricensis P. B. P.*?

### III. De *Cancamo*.

**C***Ancamum Offic. C. B. J. B. A Dioscoride, lib. i.*  
*cap. 23.* Est lacryma *Arabicæ arboris*, *Myr-*  
*ram* quadantenus referens, virosi gustus,  
quâ tanquam suffimento utuntur. Sed quid sit  
hodie ignoratur. Alii enim *Laccam* esse con-  
tendunt,

tendunt. *Matthiolus*, *Cancamum Græcorum* & *Laccam Arabum* unum & idem esse demonstrat, sed perperam inquit eruditissimus *Raius* cum vires non convenient: Alii *Benjoinum* esse volunt; *Garcias* autem & *Amatus* Gummi Animæ esse affirmant, ergo, ut videtur, nondum constat quid propriè sit.

—§§§— §§§— §§§— §§§— §§§— §§§— §§§— §§§—

# PHARMACOLOGIA

## SEU

## MANUDUCTIONIS

### AD

## Materiam Medicam

# LIBER TERTIUS

---

### De Zoologia.

**Z**oologia est pars Pharmacopœiæ, quæ Medicamenta ex Animalibus desumpta recenset.

Animal est corpus animatum sensu & motu spontaneo præditum, vel potius sentiendi & se movendi facultate, licet non mutet locum. *R. Synop. Animal. p. 1.* Ita disertè *Aristoteles, lib. 2. de Anima. cap. 2. tex. 16.* Animal per sensum & propter sensum primariò est Animal. Etenim quæ non moventur neque mutant locum, habent



ent autem sensum, Animalia ea dicimus. Omnibus ergo Animalibus (inquit doctissimus *Plinius* loco citato) unus saltem inest sensus, s. g. Tactus, quod *Aristoteles* sæpius inculcat. Inter sensus autem primò inest Animalibus omnibus Tactus & sicut facultas vegetativa seu nutritiva separari potest à tactu & ab omni alio sensu, ut in plantis videmus; ita tactus separari potest & seorsim existere ab omni alio sensu. Animalia autem omnia videntur tangendi sensum habere.

De Animalibus autem tam vivis, quàm morte interemptis, commonere hic expedit, eligenda esse, quæ extra dispositionem morbosam, & hinc detrimentosam, constituta sunt. Itaque si ex vivis expetis, provideas sana ea sint: sin ex interemptis, interempta illa adhibeas morte violenta extrinsecus accedente. Etenim expetitur medicamentalis cujusque rei substantia, eaque ad medicationem apta, adeoque facultatibus morbois destituta, salubribus è contra delibuta. Hæc imprimis pars rei spiritiosa est, in naturali scilicet dispositione constituta, facultatibusque peregrinis orba: Nimirum hæc, ut morte naturali paulatim senescens consumitur, curriculoque suo destinato perfuncta, in principia sua resolvitur; ita eadem ipsa, si flamma vitalis violenter extinguatur, superstes aliquandiu manet, nec à corpore separatur, donec hujus dissolutione & ipsa dissolvatur; & quidem talis ferè illa superstes  
sup-

suppetit, qualis erat, dum flamma illa extinguebatur. Et quæso quid causæ subesset, quod solum animalia mactata culinæ expetantur, posthabitis quæ secus obierunt, nisi sit, quod illa balsamica seu spiritali prædita sint substantia, ad nutritionem requisita, hæc vel eadem destituta sint, vel inquinatam & insalubrem possideant. Schrod.

## *Animalium Tabula generalis.*

Animalia sunt vel

    Sanguinea, eaque vel

        Pulmone respirantia, corde ventriculis prædita,

        Duobus

            Vivipara,

            { Aquatica; *Cetaceum genus.*

            { Terrestria, pilosa; *Quadrupedia.*

            Ovipara; *Aves.*

        Unico, *Quadrupedia* ovipara non pilosa.

    Branchiis respirantia; *Pisces.*

Exanguia

    Majora, quæ vel

*Mollia.*

*Crustacea.*

*Testacea.*

    Minora; *Insecta.*

# CLASSIS PRIMA, DE Animalibus Exanguibus.

## SECTIO PRIMA.

### *De Animalibus exanguibus minoribus seu de Insectis.*

**E**Xanguia minora, Insecta appellantur, quòd ut nomen indicat, incisuras habeant, aut in partibus supinis, aut pronis, aut in utrisque. Synops. Animal. p. 54.

Insecta sunt vel

- Apoda,
- { Aquatica; *Hirudo.*
- { Terrestria; *Lumbricus.*
- Pedata,
- { Alis destituta,
- { Hexapoda, caudâ
  - { Oblonga & acutiore, minor; *Pediculus.*
  - { Obtusa
    - { Subrotunda, major; *Ricinus.*
    - { Rhomboide, minor; *Cimex.*
- { Octapoda,
- { Caudata; *Scorpio.*
- { Non caudata; *Aranæus.*
- { Polypoda; *Millepedes.*
- Alata,

*Anclytra,*



- [ Anelytra, seu pennis nudis & detectis,
  - [ Glabris;
    - [ Quadripennia, aculeis
      - [ Armata, corpore
        - [ Gracili; *Formica*.
        - [ Habitiori; *Apet*.
      - [ Carentia, pedibus posterioribus
        - [ Prælongis & ad saltum compositis
          - [ Domestica, trogloditæ; *Gryllus*,
          - [ Campestria; *Locusta*.
        - [ Brevioribus nec saltui idoneis; *Cicada*.
      - [ Bipennia; *Musca*.
    - [ Farinaceis, antennis
      - [ Clavatis, diurna; *Papilio*.
      - [ Tentibus, nocturna; *Bombyx*.
  - [ Coleoptera seu Vagini-pennia, humore præditi;
    - [ Non oleoso; *Scarabæus*, corporeque vel
      - [ Productiore & majore
        - [ Cornuta; *Cervus Volans*.
        - [ Cornibus destituta, colore
          - [ Ferrugineo; *Teredo*.
          - [ Viridi; *Cantharides*.
      - [ Breuiore & minore
        - [ Ad pannos coccineo colore tingendos utili; *Cochinella*.
        - [ Humore in cauda noctu lucente donata; *Cicindela*.
    - [ Oleoso; *Proscarabæus*.

NB. In genere *Formica* & *Cicindela* mares sunt alati, feminae autem alis earent.

## Insecta Apoda.

### I. De Hirudine.

**H**irudo & Sanguisuga Offic. Ein Igel / Blutsauger. Animalcula sunt apoda, nigra, lineis & punctis varia, in aquosis degentia, ore trifulco. Majoribus præferuntur minores, utpote quæ minus nocivæ & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. *Ufus*. Sanguinis exsuctioni inserviunt, applicanturque vel Ano, vel Pedibus, Brachiis, Temporibus, aliisque partibus.

### II. De Lumbrico.

**L**umbricus terrestris & Vermis terrestris Offic. Lumbricus terrestris Jons. Terrenus Schrod. Erdwurm / Regenwurm. Animalcula sunt hermaphroditica, apoda, longa, crassitie pennæ anserinæ, mollia, carnosæ & annulata, dilute sanguinei coloris, rubicundo collo, in terra degentia, saporis terrei, odoris nullius. *Vires*. Insigniter diuretici sunt, diaphoretici, anodynî; discutiunt, emolliunt, obstructions reserant, lac augent, vulnera nervosque præcisos glutinant. *Ufus præcipui* sunt in Apoplexia, Spasmo, aliisque affectibus nervorum, ac musculorum. In Ictero, Hydrope, dolore Colico. Imprimis autem specificè profunt in Arthritide Scorbutica. Podagricos dolores leniunt; Odontalgia convenire dicitur Cinis. Schrod.

## *Insecta pedata non Alata.*

### *III. De Pediculo.*

**P**ediculus Offic. Schrod. Aldrov. Jons. Ein Laus. Varii sunt, è quibus hujus loci humanus ille vulgaris Pediculus est. *Vires.* Devorantur à rusticis contra Icterum, simili modo adhibiti ad Atrophiam nonnullis probantur. Urinam cient foramini penis impositi, quippe proritant expultricem ad mingendum. Schrod.

### *IV. De Ricino.*

**R**icinus Offic. Schrod. Aldrov. Jons. Hottbock / Hundsfloh / Hundwurm. Animalculum est lividum, hexapus, & foedum, cauda obtusa & subrotunda, sanguine repleta, Bobus, Suibus, Capris, Ovibus, atque Canibus infestissimum. *Vires.* Ricini canini sanguis. Plinio teste, Psilothrum est, & ignes sacros restinguit: admirandus quoque est, inquit *Amatus*, ad Impetigines contumaces & feras, ac curatu difficiles, illitus.

### *V. De Cimice.*

**C**imex Offic. Schrod. Lectularius quibusdam Wandlaus. Reperitur in lectis. Animalculum est corpore rhomboide, colore nigro, parum rubente, hexapus, cute apprimè tenera, ut vel levissimo contactu media crepet foetoremque abominandum expiret. *Vires.* Utuntur Recentiores quidam ad ciendam urinam



nam vivis in Penis Organum immittis; ad fœtum & secundinam expellendam tritos cum successu exhibent. *Dioscorid.*

## VI. De Araneo.

**A**raneus *Offic. Schrod.* subflavus hirsutus, prælongis pedibus, domesticus *List.* Teliarius quibusdam. *Cine Spinne.* In ædificiis nimium frequens est. *Ufu.* Aranei & Tela. *Vires.* Araneus febriles proxysmos arcere dicitur, pulsibus metacarpii, temporibusve impositus, peculiariter tamen ad quartanam commendatur, putamine avellanæ inclusus, colloque suspensus vel lacerto appensus. Tela constringit, conglutinat, ideoque vulneraria est, sanguinem cohibens, inflammationem præcavens. *Schrod.*

## VII. De Scorpione.

**S**corpio *Offic. Schrod. Jons. Ein Scorpion.* Animalculum est octapes, forma caneros æmulans, iis tamen minus colore subatro & veluti fuligineo. *Vires.* Urinam cient calculo renum aut vesicæ impeditam, vivi incinerati & exhibiti. Ictibus propriis subveniunt, triti & impositi, *Schrod.*

## VIII. De Asellis.

**A**Selli, Millepedes, & Onisci *Offic. Aselli.* *Schrod. Jons. Eselchen / Schäffelein / Kellers Esel.* Insecta sunt parva, polypoda, digitum transversum vix longa, semidigitum ferè lata, colore livido nigricante. Inveniuntur in locis humi-

humidis sub tegulis, lapidibus, &c. ad tactum se contrahunt ac rotundant. *Vires.* Tenuium partium sunt, digerunt, extenuant, absterunt, aperiunt. Hinc utilitatis peculiaris sunt in mucilagine tartarea resolvenda, calcu- loque ad mucilaginem reducendo, in obstru- ctionibus viscerum aperiendis, adeoque in morbo regio, in dolore nephritico, difficul- tate urinæ, in Colica, in Asthmate, &c. Ex- trinsecus commendatur pulvis ad affectus ocu- lorum, ad aurium dolores & anginam cum melle illitus. Vivus impositus Phagedænam perimit. *Schrod.*

---

*Insecta Anelytra seu pennis nudis  
& detectis.*

*IX. De Muscis.*

**M**usca *Offic. Schrod.* Eine Fliege. Mu- scarum genera varia quidem sunt, usuale tamen solum vulgare est. *Vires.* Alopeciiis subveniunt. *Schrod.*

*X. De Apibus.*

**A**Pes *Offic. Schrod.* Bienen. Insecta sunt quadripennia, aculeis armata, mellifican- tia. *Ufu.* Apes, Mel, Cera, & Propolis. *Mel* est substantia liquida, crassiuscula, ex al- bo flavescent, sapore dulcis, estque vel com- mune, vel Virgineum, i. e. quod novellæ apes conficiunt, colore ex flavo albicans. Eligen-

Eligendum est flavum, pellucidum, odore & sapore jucundum, consistentiâ neque crassum, ac concretum, neque dilutum nimis : omnibus præfertur Virgineum. *Gera Wachs.* Eaque vel Flava seu citrina *Offic. Gelb Wachs.* Vel alba *Offic. Weiß Wachs.* Flava est substantia pinguis, oleosa, condensata, flavescens, ex favis apum ignis calore extracta, saporis lenti & oleosi, odoris debilis ad Mel accedentis. Alba nihil aliud est quam flava multiplici insolatione albescent. *Propolis Offic. Berstoss / Stopf Wachs / Bienharz.* Rudis est & cerosa, crassaque materia seu gluten in alveorum foribus reperiunt. *Vires.* Apes siccae & contritae inunctis Alopecii capillum restituunt. (Intrinscus urinam ciet.) *Mel calidum ac siccum flatuit, nutrit, abstergit, aperit, pulmonibus convenit, urinam ciet, tussi medetur, putredini resistit. Extrinsecus oculorum caliginem discutit, aliisque eorum affectibus succurrit. Cera flava & alba, digerit, maturat, &c. Propolis calefacit leviter, abstergit, attrahit, dura concoquit, dolores demulcet, ulcera desperata cicatrice obducit, &c. Schrod.*

Quid Mel sit inter eruditos non convenit, alii dulcem tantum seu nectareum humorem è floribus exsudentem esse affirmant ; quam opinionem tuetur *Cordus*. Constare omnibus, inquit, qui usque ad extremam senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis, apes ipsas mellificaturas tantum è floribus collectum liquorem in favis reponere, rorem vero melle-



um cum decidit haudquaquam ad favos convehere, quod ipsi quoque verum esse deprehendimus. Hinc quamvis mellito rore delapso ad eam frequentes convolent apes, minimè tamen ut eum in alvearia convehant, sed tanquam ad cibum & pastum, quo adeò se replent, ut prorsus inertes & ignavæ reddantur, multæque moriantur. Itaque rustici dicere solent, mellitos rores bonum quidem pastum apibus præbere, sed ad mellificandum minimè conducere. Nobis tamen (inquit doctissimus & clarissimus *Rains*) planè contrarium videtur, iisque qui apum naturam, actiones, totamque œconomiam diligenter & curiosè observârunt, ingeniosis & eruditis, quibus plus fidendum quàm rusticorum vulgò, qui receptas opiniones & majorum traditiones sine examine sequi & amplecti, iisque mordicus adhærescere solent. Observavimus enim (inquit ille doctissimus vir, cui & nos consentimus.) rorem melleo delapso integra fere apum examina, paucissimis domi relictis, evolare, mira que industria & maximâ festinatione sese melle onerare, & ad alvearia convehere, multoties eundo redeundoque donec calor solaris, rorem dissipaverit. *Plinius* etiam, *lib. 16. cap. 8.* Constat, inquit, rores melleos è cœlo cadentes non aliis magis infidere frondibus, quàm *Quercus*. *D. Butler, M. D. Tract. de Apibus, Cap. 6. N. 20.* Foliis Roboris, inquit præ reliquis omnibus conservatum debemus Melleum liquorem roremve ex aëre descen-

scendentem, ex quo apes mella conficiunt. Et *Theophrast. lib. de Melle* ex rore melleo, apes mella conficere, affirmat.

## XI. De Formica.

**F**ormica Offic. Schrod. Jons. Ein Ameiß. Insectum est parvum, oblongum, vel rubens vel nigricans, aculeo armatum, in acervis degens; mas est alata, foemina alis destituta. *Usu.* Animal, & Ova. *Vires.* Formicæ calefaciunt & siccant, Venerem proritant. Odor acidus mirè spiritus vitales reficit; psoram, lepram & lentiginem sanare dicuntur. Ova ad aurium gravitatem faciunt, malas hirsutas pueris infricata corrigunt. Schrod.

## XII. De Cicada.

**C**icada Offic. Schrod. Jons. Heuschrecke. In Italia vulgaris notitiæ est, in Anglia autem incognita. Insectum est alatum, Gryllis aliquantulum simile, valde stridulum, rore vivens. In Regno Neapolitano Cicada innumera quotidie exungunt & depascunt Ornum seu Fraxinum humiliorem rutundiore folio, ex quorum Vulneribus exudat Manna; Sicut in India Orientali Lacca emanat ex Zizyphi specie, formicis arborem terebrantibus. Ex observatione, D. Tancredi Robinson, M. D. *Vires.* Utimur inquit Schroderus cicadis siccis ad colicos affectus cum paribus numero Piperis granis. Alii assas edendas iis offerunt quibus affecta vesica est. Cinis insigniter calculum conterit.

## XIII. De Gryllo.

**G**Ryllus Offic. Jonsf. domesticus Schrod. Heime / Heimlinge. Insectum est alatum, colore ferrugineo, focorum incola, stridulo suo cantu sedulum. *Vires.* Commendatur ad Diuresin (cinis exhibitus) ad visus imbecillitatem (succus expressus instillatus) tonsillas lenit affricatus. Schrod.

## XIV. De Locusta.

**L**ocusta Offic. Jonsf. Schrod. Heuschrecke. Insectum alatum, colore viridi, in campetribus degens. *Vires.* Odoris suffitus urinæ difficultates juvat, præsertim quæ foeminas malè habent. *Dioscorid.* Sunt qui appensas collo quartanam sanare ajunt. Schrod.

## XV. De Bombyce.

**B**ombyx Offic. Schrod. Jonsf. Aldrov. Vermis lanificus Albert. M. Seiden, Burm. Miram subit Metamorphosin. Ex ovis pusillis calore solis verno tempore producitur Animalculum seu Eruca, Bombyx in Officinis dicta; Eruca hæc Mororum foliis vescitur, donec ad maturitatem pervenit: hinc indita Thecæ chartacæ, textura se cingit folliculo sericeo, ex filo sericeo continuato sæpe replicato, ex ore emisso, colore nunc pallescente, nunc flavesciente, magnitudine & figura ovi Columbini, eaque seipsum recondit, usque dum in Chrysalide seu Aurelia transmutatur, & mortua esse videtur. Ex qua erumpens, Papilionis forma quadripennis prodit, coituque interveniente tri-



triduo, à quo masculus statim moritur, ova  
parit foemina quamplurima, ac deficit. *Ufu.*  
Eruca integra, Sericum, i. e. textura bombyci-  
na, & Folliculi sericei. *Vires.* Bombyces exic-  
cati & pulverisati insperguntur vertici capitis,  
ad arcendam vertiginem & convulsionem. *Se-  
ricum & Folliculi* sunt caliditate & frigiditate tem-  
perata, corroborant, Spiritus vitales, naturales  
& animales reficiunt. *Schrod.* NB. Caveatur à  
folliculis alvi spurcitie foedatis, vel in quibus ad-  
huc Aurelia aut vermis latitat mortuus.

## *XVI. De Eruca.*

**E**ruca *Offic. Schrod.* Raupe. Foetus est cu-  
jusdam Papilionis, similemque Metamor-  
phosin subit quam Bombyx, tandemque  
in Papilionem abit. Multae sunt species,  
quod autem in Officinis nostris usurpari debet  
insectum est vulgaris notitiae, Brassicae folia de-  
pascens. *Vires.* Erucae tusa, earumve pulvis  
adhibitus vesicas excitat, ut Cantharides &  
cutem denudat. *Mouffetus* ait eas facere ut den-  
tes ex alveolis excidant. *Hippocrates* Anginae  
conducere tradit.

## *Insecta Coleoptera seu Vagini-pennia.*

### *XVII. De Scarabeo.*

- i. **S**carabæus cornutus *Schrod.* Cervus vo-  
lans *Nonnullis.* Schröter. Reperitur  
Majo & æstate in sylvis. *Ufu.* Ipsi  
H h s Sca.

**Scarabæi, & cornua.** *Vires.* Scarabæi commendantur ad dolores & contracturas nervorum ad febrem quartanam amuleti loco impositi. *Cornua* suspensa de collo infantum urinam cohibere dicuntur. *Schrod.*

2. *Scarabæus pilularis Schrod. Jonsf. Vires* *Ros, Käfer / Mist, Käfer.* Commendatur magno perè in procidentia ani, in hæmorrhoidibus cœcis dolorificis leniendis. *Schrod.*

3. *Cantharides Offic. Schrod. Aldrov. Jonsf. Musca Hispanica quibusdam. Spanische Fliegen. Goldwürmlein.* Scarabæus est oblongus, parvus, aureo fulgore viridans, saporis acris & erodentis. *Vires.* Calidæ sunt & siccæ sat validè adeoque corrosivæ seu vesicatoriæ, diureticæ emmenagogæ. Hinc usus creberrimi in vesicatoriis. Internus earum usus rarissimus est, quippe inter venena vulgò recensentur: Vesicæ nimirum Urinariæ adeò infensæ sunt, ut vel extrinsecus cuti alligatæ eam exulcerent. Sunt nihilominus audaculi, qui diureticis eas admiscunt. *Schrod. Vid. Geierum de Cantharidibus.*

4. *Teredo Offic. Schrod. Holz, Wurm. De* Teredine multa inter rei naturalis Authores est dissensio, alius hoc, alius aliud esse vult. *Aldrovandus* quatuor teredinum genera constituit. Unum in lignis reperitur. Alterum Vermiculus dictum. Tertium Thris. Quartum Cossus. His addit *Jonsonus* quintum ab *Agricola*, quem ab æneo colore *Rupfer, Wurm* vocat. Nos autem hexapoda illum Scarabæi minoris arborei productricem, qui in arboribus frequens invenitur  
Tere-

Teredinem Officinis esse arbitramur *Ufu*. Excrementa farinacea dicta. *Vires*. Exiccat pulvis iste, unde ulceribus humidis & fluidis foeliter inspergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratibus admodum familiaris est in excoriationibus Infantum exiccandis. *Schrod.*

5. *Cochinilla* & *Coccinilla* *Offic.* *Coccinill.* *Ufu*. Insectum ipsum, ex Nova Hispania & Mexicana allatum. *Vires*. Cardiacum insigne habetur, sudorificum, alexipharmacum, & antifebrile medicamentum, febres omnes quantumvis malignas sanans, ideoque in peste & febribus petechialibus sæpius exhibetur.

De *Cochinilla* quid sit non levis est controversia inter rei Physicæ & Medicæ authores, aliis hoc, aliis aliud affirmantibus. Nonnulli originis vegetabilis eam esse volunt; è quibus aliqui *Tuna* seu *Ficus Indica* baccam fructumve, alii ejusdem gemmam seu florem nondum explicatum faciunt: Alii, & quidem rectius, productum quoddam animale esse statuunt; quæquamvis in eo omnes consentiant, quod ad regnum ( ut vocant ) Animale pertineat, quid tamen in specie sit, opinionibus inter se dissident, nam alii Insecti cujusdam nidum esse ajunt, alii animalculum hexapos Cimici simile, alii *Scarabæum* parvum dictum; Alii denique, & hi quidem nostra sententia rectissimè, *Scarabæum* esse affirmant parvum *Scarabæo* parvo prædicto similem, duobus tantum maculis in vaginis penarum insignitum, cujus præstantissimam iconem nobis exhibuit accuratissimus ille *Anatomicus*;



micus, D. *Edwardus Tyson*. M. D. in *Artis Philosoph. Londinensibus*, Num. 176. *Cochinilla* in Officinis nostris vulgò venalis Insecti corpus dumtaxat est; cujus propagandi, & ad usum parandi modus, in eisdem *Artis Philosophicis* Num. 193. describitur, ex observatione Hispani cujusdam senioris, *Jamayca* insulæ incolæ, qui in ea parte Indiæ Occidentalis in qua pretiosæ istius mercis magna quotannis copia colligitur, diu vixerat, quam descriptionem in epitomen contractam hic subijciemus.

Insectum hoc initio velut vesica quædam exigua, seu tuberculum parvum in Ficûs Indiæ *Tunæ* dictæ surculis in quibus oritur, apparet, quæ postmodum calore solis in vermiculum aut termitem evadit, qui processu temporis in *Scarabæum* parvum mutatur. *Scarabæos* hosce cum jam plenam maturitatem adepti sunt, occidunt fumo crasso, è materia quadam combustibili ex ea parte, unde ventus in frutices quos insecta depascuntur spirat, sita, excitato, substratis prius sub fruticibus linteis. Insecta fumo suffocata, & exanimata, levi fruticum concussione in lintea facilè decidunt; adeoque magnâ copiâ, nullo fere negotio colliguntur. Deinde super lintea expansa in arenoso quodam aprico loco, aut pavimento saxeo, solis colori tamdiu exponunt, donec exsiccantur corpusculis contractis, quæ manibus leniter confricatae in grana abeunt, alis pedibusque, &c. decedentibus, quæ postea ventilatione aliove artificio separanda sunt. Imò qui  
dubi-

dubitat (inquit doctissimus *Paulus Ammannus*) *Cochinellam* Insectum esse, hæc grana putati-  
tia indat aquæ calidæ, & statim videbit crura  
post aliqualem emolliationem; Interdum etiam  
apud Mercatores integrum Insectum, interdum  
alæ instar Muscarum reperiuntur.

### XVIII. De *Cicindela*.

**C**icindela Offic. Schrod. Mous. Lampiris ala-  
ta, Aldrov. *Johannis* Fliege. Usa. Insectum  
ipsum. Vires. Sunt qui in calculo commen-  
dant. Schrod. Vim anodynam ei attribuit.  
*Cardan.*

De *Cicindela* magna inter autores dissensio  
& lis est, aliis volentem à reptili sexu tantum,  
aliis specie differre affirmantibus, in quibus  
*Julius Scaliger*, Exercit. 191. & ingeniosissimus vir  
*D. Richardus Waller*, Philosoph. Transact. N. 167.  
qui propriâ experienciâ *Cicindelas* volantes  
utriusque sexûs esse se didicisse ajunt, siquidem  
coeuntes viderint. De quorum fide quamvis  
minimè dubitem, *Vintimiglia* tamen apud *Fab.*  
*Columnam* sententiam, etiamque *Mouffeti*, p. 109.  
*Cicindelas* volatiles mares esse, reptiles foemi-  
nas, confirmant experimenta nuper facta à vi-  
cino nostro *D. Beniamino Allen*, M. D. hic *Brain-*  
*trix* degenti, qui *Cicindelas* volantes cum repti-  
libus coivisse sæpius observavit, volantes inter  
se nunquam, ut neque reptiles; unde non im-  
merito colligit & concludit, (cujus etiam expe-  
rientiæ nos acquiescimus) volatiles mares esse,  
reptiles foeminas,

## XIX. De Proscarabæo.

**P**roscarabæus Offic. Mouf. Aldrov. Scarabæus unctuosus Schrod. Pinguiculum Agricol. Me-loen Paracels. Schmalz; Käfer / May; Gurm. Majo & Junio juxta vias & passim in sylvis ob-repit. *Ussu.* Ipsum insectum, & ejus liquor oleo-sus colore subflavo. *Vires.* Cantharidum na-turam imitatur, urinam pellit & sanguinem, canis rabidi morsum egregiè expugnat, varos dictos, i. e. Arthritidem vagam, Authore *Wie-ro*, curat pulvis vel conditura exhibita. Ex-trinsecus expetitur à quibusdam ejus liquor ad-vulnera. Additur & Emplastris in bubone & carbunculo pestilentiali; permiscetur & anti-dotis, fitque inde Oleum ex infuso animalium vivorum in oleo communi, quod loco olei Scor-pionum nonnulli adhibent. *Schrod.*

---

## SECTIO SECUNDA.

## De Exanguibus majoribus.

**A**nimalia Exanguia majora pleraque Aqua-tica sunt; & ab *Aristotele Hist. Animal. lib. 4. cap. 1.* Commodè dividuntur in tria genera, nimirum *Mollia* sive *Mollusca*, *Crustacea*, & *Testacea*.



**Animalia Exanguia** majora sunt vel

Mollia sive Mollusca; *Sepia.*

Testacea, hæc autem vel sunt

Univalvia, minimè tortilia, paululum curva, tènua,  
ex utraque parte hiantia, externè

{ Glabra, colore albo; *Dentalia.*

{ Striata, colore ex viridi albicante; *Entalia.*

Turbinata, figura

{ Breviore, testæ apertura clausa operculo

{ E saliva confectio tantum ad hyemem; *Cocblea*  
*terrestris.*

{ Testaceo:

{ Oblongo & majore, colore spadiceo odore  
gravi; *Blatta Byzantina.*

{ Rotundiore & minore, colore vario ex ru-  
bente & albo; *Umbilicus Marinus.*

Productiore, rostro sinuato, sive canaliculato, ven-  
tricoso, & basi & capite sive rostro produ-  
ctiore, succo

{ Purpureo prægnans; *Purpura.*

{ Aqueo, seu decolore; *Buccinum.*

Bivalvia valvis

Similibus non striatis

{ Asperis, Unionifera; *Mater Perlarum.*

{ Planis; *Mytilus.*

Diffimilibus asperis; *Ostrea.*

**Crustacea**, corpore

{ Productiore, media inter *Astacum marinum* &  
*Squillam* magnitudine; *Astacus Fluvialis.*

{ Breviore & rotundiore, depresso, colore

{ Livido, tibiis & brachiis levioribus; *Cancer*  
*Marinus.*

{ Ex ruffo nigricante, tibiis & brachiis asperiori-  
bus & rugosioribus; *Cancer Fluvialis.*

*Exanguia*

## *Exanguia Mollia sive Mollusca.*

**M**ollia sive Mollusca sunt, quæ cum sanguine careant, extrinsecus habent carnosum seu carnisforme corpus, intus autem solidum & firmum offi respondens. R. Hist. Animal p. 52.

### *I. De Sepia.*

**S**epia Offic. Schrod. Blackfisch / Black-Rittel  
*Usu.* Os, seu Testa, substantia est testacea candida & levis, utrinque tumida, parte superiora duriuscula, lævi & glabra, inferna fungosa mollicula, leviter aspera & friabili, in dorso piscis nata, saporis aliquantulum subacris. *Vires.* Exiccat, abstergit, maculis, nævis, scabiei humidæ medetur, oculis convenit, gingivis tumidis subvenit, asthmaticis auxilio est, Gonorrhœam sistit, calculos pellit, urinas movet, Schrod.

## *Exanguia Testacea.*

**E**xanguia testacea sunt, quorum intus est carnososa pars, foris firma, quæ & flexu frangi, & ictu rumpi, compressione disjici non possunt. R. Hist. Animal. p. 52.

Hæc autem vel sunt *Univalvia*, vel *Bivalvia*, vel *Turbinata*.

## Univalvia.

## II. De Dentalio &amp; Entalio.

1. **D**entalium Offic. Schrod. Autales dicuntur, alii ejusdem formæ, sed minores Bonann. Zahn Schnecken. In mari Britannico capiuntur. Tubulus est oblongus, gracilis, teres, nonnihil inflexus sive arcuatus, paulatim angustior, ab imo ad summum, concavus, utraque extremitate apertus, absque ulla naturali rima aut fissura, albus, altero tamen extremo parum rubescens, exterius lævis admodum & velut politus.

2. Entalium Offic. Schrod. Tubulus aut Siphunculus maris Bonann. Purpur Schnecken. Præcedente longior est & crassior multò, aliàs persimilis, nisi quòd hic striatus sit, striis profundis, seu mavis porcis elatis, & coloris plerumque viridantis. Ex India Orientali transfertur. Vires. Utrumque etsi in medicina hætenus parum usitatum sit, attamen cum aliis testarum generibus ad similes affectus adhiberi posse verisimile est.

Itali moderni lapides, metalla, ligna quæcunque lineis aut figuris insculpta, aut etiam cannulata *Entaglie* vocant, unde & à vocis Dentalii proximitate, Entalii nomen ortum habuisse conjecturatur eruditissimus simul & ingeniosissimus vir, D. Martiaus Listerus, M. D. Qui plura de Dentalio & Entalio desiderat, consulat *Acta Philosoph. N. 197.*



*Turbinata.**III. De Cochleis.*

1. **C**ochlea terrestris, & Limax terrestris  
*Offic.* Cochlea testacea *Schrod.* Cinea,  
 maxima, edulis, cujus os operculo  
 crasso velut gypseo per hyemem clauditur  
*List.* Pomatia *Gesn.* Ein Schnecke. In meridionali  
 Angliæ parte frequens. *Ufu.* Cochlea integræ.  
*Vires.* Cochleæ refrigerant, incrassant,  
 consolidant, leniunt, nervis conveniunt ac  
 pulmonibus. Hinc usus præcipui internè ac  
 tussim, phthisin, excreationem sanguinolentam,  
 aliosque pulmonum affectus; hinc ac Epatis  
 calorem, & colicum dolorem. Extrinsecus  
 maturant ac rumpunt anthraces, consolidant  
 vulnera præcipuè nervorum, ulcera sanant,  
 inflammationes mitigant, ventrem hydro-  
 picorum, hydrocelemque herniosorum detumescere  
 faciunt, hæmorrhagiam cohibent *Schrod.*  
 Verùm quoniam hoc genus Cochleæ minùs  
 frequens, nec ubique obvium est, *Offic.*  
 cinæ nostræ ejus loco Cochleæ vulgari majori  
 pulchellæ, maculatæ, & fasciatæ hortensi utuntur,  
 absque ullo sententiæ nostræ, gravi aut periculoso  
 errore.

2. Cochlea aquatica *Offic.* fusca, fasciis crebris  
 angustisque prædita *List.* Wassertschnecke. In  
 Catalogo simplicium Pharmacopœæ Londinensi  
 præfixo inter aquatilium testas invenitur  
 Cochleæ & Buccini titulos, quæ cum nomina ge-  
 nericæ

nerica sint, species sub se plurimas complectentia, ut *Aldrovandum*, *Gesnerum*, *Jonstonum*, *Bonannum*, sed præcipuè celeberrimum nostrum, *D. Martinum Lister*, M. D. consulentibus patebit, quænam ex omnibus deligenda sit non auisim determinare, huic tamen pisci id nominis attribui, quoniam in mari nostro aut ore maritimo frequens invenitur, ejusque caro eadem vires habere dicitur, quas *Cochlea* terrestribus. Quod ad testas *Cochleæ*, *Conchæ*, *Buccini* attinet, quamcunque assumas & utaris, modo marina sit, perinde est: Sunt enim omnes *Alkali* & earundem virium participes. At neque *Dioscoridem* aut *Aetium* inter *Osiream*, *Purpuram*, aut *Buccinum* in calcem aut cinerem reducta ullam distinctionem facere observavi; eruditissimus *Listerus*, verum omnibus eandem vim causticam tribuisse.

3. *Cochlea cælata Alaroi. Jons.* Cælata antomastice dicta, eo quod operculum habeat inter cætera singulare *Bonann.* In mari mediterraneo inveniuntur. *Ussu.* Operculum *Umbilicis marinus* *Officinis* dictum, substantia lapidea, superficie plana, sphærali linea insigni, colore fulvo; altera parte concava umbilici in modum, colore carneolo aut igneo, sapore terreo. *Vires.* Venerem stimulat, inquit *Jonstonus*.

*Augustinus Scilla*, aut ova *Cochlearum*, aut abbreviata, nondum perfecta & ab iisdem cochleis generata hoc operculum esse sibi persuadet; at ingeniosissimus ille vir *D. Joannes Rainus* cum in Italia peregrinatus est, ipsum piscem vi-

vum in testa sua huiusmodi operculo tectum recens è mari extractum Romæ nactus est.

#### IV. De Blatta Byzantia.

**B**Latta Byzantina Offic. Byzantia Schrod. Byzantia sive Unguis odoratus Park. Conchylum Aldrov. Jons. Tegumentum est oblongum quibusdam Testæ Turbinatæ, substantia cornea, colore spadiceo, odore gravi, Aloen Barb. æmulans. Vires. Internè laxat alvum, splenem emollit, vitiososque humores discutit. Externè excitat suffitu foeminas strangulatu uteri oppressas, comitialesque. In reliquis idem præstare poterit quòd aliæ concharum testæ. Schrod.

Testa hæc multæ inter eruditos contentio-  
nis materia fuit, *Matthiolus* Unguem Odoratum & Blattam Byzantinam pro eadem re à *Serapione* & *Avicenna* aliisque è Græcis recentioribus habitam fuisse affirmat. Cui opinioni *Officinæ* etiam nostræ & *Schroderus* & *Parkinsonus* atque etiam *Paulus Annimannus* favent; ut & *Rumphius*, qui Blattam Byzantinam operculum Muricis seu Pseudopurpuræ in mari Amboinico inventæ esse tradit. His contradicit *Fuchsius*, qui Blattam Byzantinam Purpuræ operculum esse ait, & ab *Onyche Dioscoridis*, i. e. ungue odorato diversum: quod ab ingeniosissimo, D. *Martinio Listero*, M. D. literis ad me datis clarius demonstratur, cuius observationes ipsius verbis in Latinum versis accipe.

Blattam Byzantinam Ungui odorato successisse,



fuisse, ejusque loco in Officinas illatam fuisse autumo. *Diosc.* temporibus, optimus viz. pallidissimus & pinguisissimus à mari Rubro advectus est; nigrior minorque à Babylone aut sinu Persico. Verum ut videtur recentior ætas circa Byzantium inventis contenta est, unde *Blatta Officinalis* hodierna cognomen obtinuit. *Blattæ* nomen huic operculo (ut conjicio) inditum est à colore, ut quæ *Blattæ pistrinaria* Londini frequentissimæ colorem obscure capillaceum referat, partim etiam quòd *Blatta* hæc *Scarabæi* genus sit latum & tenue operculi istius instar.

Fatendum equidem est, eundem *Dioscoridem* Unguem dictum operculum fuisse (πῦμα χογ-χολίς) affirmare *Purpuræ* piscis operculo simile, suo tempore usitatum intelligit, quando (ut videtur) *Unguis Odoratus* deperditus fuit, saltem in Europam non illatus. Verum ex eodem *Dioscoride* apparebit Unguem verum operculum minimè fuisse, unde & operæ pretium erit errorem hunc detegere, & consequenter ostendere quantum delirarunt moderni, *Turbinis marini* operculum pro vero *Ungue odorato* substituendo.

*Unguis* historiam, prout eam tradit *Dioscorides*, accipe. In lacubus, inquit, *nardiferis* *Indiæ* reperitur, quapropter, & *Conchylis Nardum* depascen-  
tibus, aromaticus evadit (seu odora menta redolet) colligitur verò postquam æstivis caloribus lacus inaruerint. Concludit *Conchylum* ipsum ustum seu calcinatum eadem quæ *Purpura* & *Buccinum* efficere. Et in capite de *Nardo*, *Indicam Nar-*

*Nardum prope fluvium Gangem nasci scribit*, hoc est, in lacubus quibusdam quos fluminis istius inundatio efficit. Hinc apparet ( 1 ) Unguem odoratum aquarum dulcium Conchylii partem fuisse. ( 2 ) Si in lacubus Nardiferis ad fluvium *Gangem* colligeretur, quâ sit, ut idem à mari *Rubro* aut *Babylone* adterretur? Deinde, cur testâ ipsa, inutilis sarcina, tam longo itinere à *Gange* fluvio ad *Græciam* usque deportaretur, si solius operculi ( quod decimam partem ipsius testæ pondere rarò excedit ) usus esset. Quod si adferri & venundari non soleret, quorsum vires ejus adjicerentur, aut quomodo earum experimentum fieri posset? Hinc conjicio Unguem odoratum verum nonnihil similem fuisse dimidiæ testæ *Pectunculi* istius fluviatilis in fluvio *Thamesi* frequentissimi, pollicaris unguis magnitudine & crassitie, idque ob sequentes rationes.

1. Quòd Unguis odoratus pisciculus Bivalvis, seu *Mytulus*, aquarum dulcium alumnus esse videatur, cum lacuum ad fluvium *Gangem* exsiccationem expectarent antequam eos colligerent. Jam verò Bivalvia arena & limo reconduuntur, nec unquam in summas aquas emergunt. iisque innatant & fluitant, ut *Turbinata* solent ( quibus solis operculum proprium est ) ideoque quovis tempore facillè capiuntur. 2. Animalculum hoc *Conchylium* vocat, & generali illo nomine ab aliis omnibus Speciebus, de quibus variis capitibus agit, distinguit; quod quamvis utrique Generi tam *turbinato* quàm *bivalvi*

bivalvi commune sit, peculiariter tamen & maxime propriè Concham seu Bivalve denotat. 3. Onyx disertis verbis à *Plinio* inter Bivalvia recensetur. Siquidem (l. 32. c. 11.) synonyma illi sunt *Solen*, *Aulos*, *Donax*, *Onyx*, *Dactylus*. Et expressius adhuc (lib. 9. cap. 61.) Concharum genera sunt Dactyli ab humanorum unguum similitudine appellati. Unde verisimillimum est Onychem odoratum à lacubus aquæ dulcis, qui ad Gangem Indiæ flumen sunt, olim advectum non ab similem fuisse vulgari Onychi maris Mediterranei, qui è *Solenum* genere fuit. Hæc omnia *Listerus*. Ex quibus Vir ille doctissimus rectè infert & concludit Blattam Byzantinam Offinarum, Unguem Odoratum Veterum (quo cum confunditur) non fuisse; quem ob difficilem ex India in Europam transitum olim perditum & oblivioni traditum esse magna probabilitatis specie conjectatur. Illud certè nobis constat, operculo illi quod in Officinis nostris Blattæ Byzantinæ nomine venditur è notis caracteristicis Unguis odorati Veterum nullam convenire, quem medicamentum probum & efficax fuisse credibile est ab odore quem obtinuit aromatico, qui in pulveribus nostris testaceis desideratur.

#### *V. De Buccino.*

**B**uccinum Offic. album, læve, maximum, septem minimum spirarum *List.* Hornschnecke / Kinghorn. In alto mari ea piscantur. Nomen est genericum sub se plurimas species



complectens, ut in cochlea aquatica ostendimus. *Vires.* Cum Ostrea & reliquis testis viribus convenit.

## VI. De Purpura.

**P**urpura *Offic.* violacea *Col.* Violacea *Fab.* *Columnæ.* *List. H. Conch. lib. 4. Sect. 15. c. 1.* Ex Tarentino sinu allata, *Bonann.* Purpur *Schnecken.* In mari Mediterraneo frequens. *Ussu.* In Officinis testa valida, rugosa, striata, tuberculis brevibus inæqualis, inter Mechanicos Sanies purpurea ad tingendum olim in usu fuit. *Vires.* Alkali est, & cum reliquis testis viribus convenit.

In Purpura describenda adeò breves & obscuri fuere Veteres, ut quodnam Conchylium sit, recentioribus litigandi occasionem dederint, à quibus variæ producuntur species, purpuream saniem gignentes. Verùm *Fab. Columna* litem determinavit, veram Purpuram demonstrando. Quamvis autem hodie purpura genuina Officinis nostris vix cognita sit, purpurei tamen succi cognitio adnotante ingeniosissimo illo & eruditissimo viro jam antea laudato, *D. Martino Lister*, ab antiquis usque temporibus ad sæculum nostrum traditione saltem transmissa & derivata est, in hisce etiam Insulis; inter Arcana tamen habita & studiosè celata. donec *D. Guil. Cole* eam arripuit, & publico exhibuit, *Adis Philosoph. N. 178. p. 1278.* quo Lectorem refero. Quin etiam *D. Robertus Southwell*, *E. A.* Regiæ Societatis nunc Præses dignissimus, multos ante annos *D. Listero* retulit,

tulit, Matrem suam in *Hibernia* dum viveret celebrem fuisse sudariis piscis cujusdam succo indelebilibus notis, quæque elui nequirent signandis. Quin & *Beda* temporibus *Ars purpuram* tingendi in *Anglia* usitata summoque in pretio habita erat. *Variis Conchyliorum generibus* ( inquit *Histor. Ecclesiast. Gentis Angliæ*, lib. 1. cap. 1. ) exceptis : in quibus sunt & Musculi , quibus inclusam sæpè Margaritam omnis quidem coloris optimam inveniunt , id est, & rubicundi , & purpurei, & hyacinthini , & prasiini sed maxime candidi. Sunt & Cochleæ satis superque abundantes , quibus Tinctura coccinei coloris conficitur. Cujus rubor pulcherrimus nullo unquam solis ardore, nulla valet pluviarum injuria pallescere ; sed quò vetustior, eò solet esse venustior.

---

## Bivalvia.

### VII. De Ostreo.

**O**streum Offic. *Jons.* vulgare maximum, intus argenteo quodam splendore albescent *List.* Ostrea *Schrod.* Concha satis nota in cœnis Ostrea Latinè dicta , non Ostreum *Bonan.* *Oester.* Plurimis in locis in nostro mari capiuntur. *Usu.* Testa & Margarita *Scotiæ* Officinis dictæ, sunt substantiæ lapideæ, rotundæ, albæ, Viciæ vel Pisi ferè magnitudine, saporis terrei; Caro in culinis frequentissima est. *Vires.* Testæ vim habent exsiccandi, sudorem movendi, abstergendi, &c.

Hinc usus earum internus præcipuè est in febribus quibus interveniente sudore medentur. Externè conveniunt in dentifriciis absterforiis, in mariscis & Condylomatis ani reprimendis. Ostrea pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt. *Schrod.* Margaritæ cum orientalibus viribus conveniunt.

### VIII. De Matre Perlarum.

**M**Ater Perlarum *Offic. Schrod.* Concha Margaritifera plerisque, Berberis Antiquis Indis dicta *List. Icon. lib. 3.* Concha mater Unionum dicta aut Margaritifera, à Margaritis quas gignit *Buonann.* Margaritifera *Jons. Perlen Mutter.* In Mari Mediterraneo & alibi inveniuntur. *Ufu.* Testa est, valida & ponderosa, extus rugosa, & aspera, non striata, intus lævis, argenteo colore, saporis terrei. *Margaritæ Offic. Perlen.* Sunt substantiæ lapideæ, rotundæ, aut angulosæ, granulatae, albæ, pellucidæ, saporis terrei, ex perittomate eodem quo testæ generantur productæ. Duplices censentur, Orientales & Occidentales: Ille splendiores sunt, adeoque cæteris præferuntur, & præsertim Persicæ. *Vires.* Testæ præter vires concharum communes (quas videtis in Ostreo) sunt qui vim cordialem huic attribuunt, verum quo successu, videant ipsimet. Margaritæ Cordiale præbent nobilissimum, quo balsamum vitæ oppressum, viresque exolutæ insigniter recreantur ac confortantur, proinde venenis, pesti, & putredini resistunt, animum exhilarant,



rant, &c. Schrod. NB. *Margaritas non tantum in hujus generis conchis reperiri, sed etiam in aliis multis, ut Ostreis, Mytulis, &c.*

*Plinius Hist. Nat. lib. 9. cap. 35. Margaritas è rore genitas esse tradit: cui à Petro Joan. Fabro contradicatur, qui, Quod ipsæ Margaritæ sint nihil aliud, quàm lepra concharum, affirmat, Dicit enim: Conchæ omnes sunt leprosæ. Nobis autem ejusdem naturæ & qualitatis esse videntur cum concharum in quibus inveniuntur testis, quarum morbosæ quædam excrescentiæ sunt, non roscidi conceptus; earum vires tantopere celebratæ, non aliæ sunt, quam quæ conchis omnibus communes.*

## *IX. De Mytulo.*

**M**Ytulus Offic. *Rondeletii List. Icon. lib. 3. ex cæruleo niger ejusd. Hist. Animal. Angl. Musculus Bonann. Muschel. In mari nostro capiuntur. Ussu. Testa. Vires. Alkali sunt, & cum reliquis testis viribus conveniunt.*

## *X. De Ungue Odorato.*

**U**NGuis Odoratus Offic. *Onyx Dioscorid. Indische Schnecklein. Quid sit Officinis nostris ignoratur, cujus in loco Blattam Byzantinam substituunt, ut in capite de Blatta Byzantina ex observationibus eruditissimi D. Martini Lister demonstravimus, quò Lectorem refero. Qui plura de ea velit, consulat Act. Philosoph. N. 192. p. 642.*

## XI. De Concha.

**C**Oncha Offic. Schrod. longa lataque, in mediis cardinibus, cavitate quadam pyriformi insignita *List. Muscheln. Usu. Testa. Vires.* Ostreis & reliquis testaceis convenit. Ut Cochleæ & Buccini, ita & Conchæ nomen genericum esse sub se plurimas species complectens in capite de Cochleis ostendimus, quò lectorem refero.

---

## Exanguia Crustacea.

**E**xanguia crustacea sunt, quæ firmas suas partes extus habent, intus autem carneam mollitiem. Partes quoque illæ firmæ non potius frangi, quàm disjici compressæ dici debent. *R. Synop. Animal. p. 52.*

## XII. De Astaco Fluviatili.

**A**stacus fluviatilis *Aldrov. Jonsf. Bach. Krebs.* In fluviis invenitur. *Usu.* Lapilli (Oculi Cancris Offic. *Krebs. Ugen dicti*) crustacei, duri, albicantes, orbiculati, pisi magnitudine, una parte compressi, & sinuati acetabuli in modum, alterâ convexi, saporis terrei, nati in ventriculis cerebri, utrinque unus. *Vires.* Refrigerant, siccant, abstergunt, discutunt, tartarum & sanguinem coagulatum resolvunt, calculum atterunt. Hinc usus magni in Nephritide, Pleuritide, Asthmate, dolore Colico &c. inserviunt dentibus abstergendis. *Schrod.*

## XIII. De

## XIII. De Cancro Marino.

**C**ancer Offic. Schrod. marinus Aldrov. Jons.  
 Taschen Krebs / Meer Krebs / Meer Krab-  
 be. In mari capiuntur. Uu. Ungulae seu Che-  
 lae Officinis dictae, & Testa. Vires. Easdem  
 cum Conchis vires obtinent. Insuper Scabi-  
 em puerorum ex falsis humoribus sanant, fe-  
 brium intermittentium paroxysmos arcent.  
 Schrod. Praeferuntur apices nigri Ungularum.  
 Cancer integer i. e. substantia edulis in cibis  
 laudatur. In Medicina, Phthisicis prodesse  
 Rondeletium experientia docuit. Stranguriam  
 sanant. Jons.

## XIV. De Cancro Fluviatili.

**C**ancer fluviatilis Offic. Jons. Krebs. In  
 Graecia, Creta, Sicilia, &c. inveniuntur.  
 Vires. Refrigerant, humectant, dolorem se-  
 dant, ferocientes Spiritus figunt. Hinc usus  
 praecipui in aestu, ac dolore capitis & renum,  
 in Angina, Atrophia; extrinsecus valent in  
 igne Persico ac ambustis.





CLASSIS SECUNDA.  
DE  
Animalibus Sanguineis.  
SECTIO PRIMA.

*De Piscibus.*

**S**anguinem voco, liquorem illum rubicundum vitae sedem fontemque, caloris nativi pabulum & vehiculum, qui circulari motu jugi & indefinenter per arterias & venas fluit. R. Synop. Animal. pag. 50.

Non sum nescius (inquit doctissimus *Rajus*) Piscis nomen à nonnullis quàm latissimè extendi ad Aquatilia omnia significanda tam sanguinea quàm exanguia majora. Quin & vulgus nostrum hæc omnia pro piscibus habet: verum nobis definientibus Piscis Animal est aquatile, sanguineum, pedibus carens, vel squamis vel cute nuda contactum, pinnis natans, in aquis perpetuo degens, nec sponte unquam in siccum exiens, *Willoughb. Ichthyograph. p. 1.*

Pisces sunt vel

{ Branchiis respirantes corde unico ventriculo præditos, iisque vel

{ Ovipari (i. e. ova, non intus foventes sed in aquas ejicientes, ubi calore solis foventur & excluduntur,) dorso erecto natantes, vel corpore

{ Longo & lubrico, squamis quoque carente, pinnis

{ Ad branchias obtinentes, ventralibus destituti; *Anguilla.*

{ Utroque pari donati, i. e. branchiali & ventrali

Quibus

a b c

{ Duabus in dorso pinnis; *Mustela fluviatilis*.  
 { Unica in dorso pinna; *Lupus Marinus*.

Contractiore, vel saltem non admodum lubrico pinnis

{ Non aculeatis, quibus

{ Unica in dorso pinna,

{ Marini, quorum pinna dorsalis aut

{ Gravitatis centro apponitur; linea in ima ventris carina e squamis composita

{ Serrata; *Halec*.

{ Non serrata; *Encrasicholus*.

{ Non longe e cauda sita

{ Squamosus, corpore pentagono; *Sturio*.

{ Non squamosus; *Ichthyocolla*.

{ Fluviales & lacustres

{ Dentati; *Lucius*.

{ Edentuli, Squamis

{ Maximis; *Carpio* sive *Cyprinus*.

{ Mediae magnitudinis; *Barbus*.

{ Minimis, tenuibus, musco viscido cornexis; *Tinca*.

{ Duæ in dorso pinnæ eriguntur

{ Edentuli; *Aschia* sive *Thymalus*.

{ Dentati; *Trutta*.

Aculeatis, duabus in dorso pinnis, anteriore autem spinis radiata

{ Marini; *Mugil*.

{ Fluvialis; *Perca*.

Vivipari, i.e. qui ova intus concipiunt majuscula, avium modo, eaque in utero fovent, Cartilaginei longi; *Galeus*.

Pulmone respirantes, corde duobus ventriculis præditi, iisque vel

{ Cornuti; *Monoceros*.

{ Non cornuti.

{ Dentati & fistulosi; *Orca*.

{ Edentuli & non fistulosi; *Balana vulgaris*.

Nos ne à communi hominum opinione (inquit doctissimus Raius) nimis recedamus, & ut affectata novitatis notam evitemus; Cetaceum Aquatiliū genus quamvis cum Quadrupedibus viviparis in omnibus ferè præterquam in pilis & pedibus & elemento in quod degunt, convenire videantur, Piscibus annumerabimus  
 Synops. Animal. p. 55.

---

## De Piscibus anguilliformibus, seu lævibus, lubricis.

**P**isces anguilliformes vocamus, qui corpore sunt lubrico & squamis carente. R. Ichthy. p. 103.

### I. De Anguilla.

**A**nguilla Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Ual. In lacubus, fluviis, stagnis, &c. vivit. Usus. Pinguedo. Vires. Vulneraria est, capillos generat, in alopecia illita: auditum restituit auri instillata; hæmorrhoides mitigat Schrod.

### II. De Mustela.

**M**ustela Offic. Schrod. fluviatilis Gesn. Aldrov. Fluviatilis, nostratibus Ualspunt nomine à Belgis mutuato, & Burbot Gallico vocabulo dicta R. Ichthy. p. 125. Barbot Bellon. Ualraupe, Quappe. In fluviis. Usus. Hepar, ventriculus & Spina. Vires. Hepar in vitro suspensum caloreque expositum, in liquorem liquefcit flavum, admodum utilem oculorum hebetudini ac nubeculis. Ventriculus commendatur summe ad affectus uterinos, præcipue autem fer-

tur



tur secundinas pellere, colicosque dolores abigere, potus. *Spina pulverisata caducum expugnare fertur, Schrod.*

### III. De Lupo Marino.

**L**upus marinus *Schönf. marinus Schonfeldii* *Jonst. Marinus nostras & Schonfeldii. R. Ichth. pag. 130. Anarrhichas Gessn. Seewolff / à Balthicis populis Klippsich vocatus. In mari capiuntur. Usu. Dentes molares Lapis Bufonites Officinis dictus, Krötenstein. Sunt bullæ instar, altera parte cavi, altera convexi, coloris ex fusco pallentis, aliquando fusci, interdum nigri, albi, viridis, versicoloris. Vires. Commendatur ad pestem & venena, ceu remedium præstantissimum, &c. Schrod.*

D. Merret in Pinace rerum naturalium Britanniae lapides *Bufonios* dictos, & pro Gemmis habitos nihil aliud esse quam dentes molares hujus piscis his verbis ostendit. *Bufonius falso sic dictus, demonstravi enim coram serenissima Majestate regia (in Collegio nostro qui interesse dignatus est exquisitissimis prælectionibus ornatissimi Collegæ Doctoris Georgii Ent, quem titulo Equitis aurati merito honoravit) hunc esse dentes molares Piscis Lupi, quem vide apud Schwenckfeld & Jonst. de Piscibus, Tab. 47. Et Aurifices summa cum admiratione confessi sunt hosce molares esse veros lapides Bufonios abs iis divenditos. Mer. Pin. p. 210.*

*Pisces non aculeati tribus in dorso  
pinnis donati.*

*IV. De Asino Antiquorum.*

**O** Nos Offic. sive Asinus Antiquorum Turn.  
Asellus tertius seu Æglesinus Gesn.  
Rondel. Æglesinaus vel Ægresinus Bellon.  
Usu. Officula è capite exempta Pharmaco-  
polis nostris *Lapides Dentales* dicta fortè quod  
dentata sint: Longa sunt & tenuia, colore  
albicante; ab uno latere convexa, & velut  
characteribus notata, ab altero nonnihil con-  
cava, & striata marginibus dentatis, colore  
exalbido. *Vires.* Viribus cum Officulis capi-  
tum Percæ & Cyprini piscium convenit, ad  
quos lectorem remitto.

NB. Officulum hoc pro Dentalio à Pharmaco-  
polis nostris Londinensibus venditur.

*Pisces non aculeati.*

*V. De Harengiformibus.*

**H**orum nota characteristica est, linea serrata à  
squamis composita in ima ventris carina, color  
in lateribus & ventre argenteus, splendens,  
squame grandes & facile deciduæ. R. Ichthy. p. 218.

1. Halec. Offic. Schrod. Harengus Rondel. Gesn.  
Aldrov. Jonsf. Chalcidis species Bellon. Hå-  
ring. Piscis est marinus Germaniæ Oceano &  
alibi

alibi familiaris. *Ufu.* Halec ipsum, & muria, quod brodium est, quo Halec vel alius piscis fuerit conditum. *Vires.* Integrum Halec salitum imponitur plantis pedum, ad humores à capite derivandos, æstumque febrilem domandum. *Cinis* exhibetur ad calculum atterendum. *Muria* inservit clysteribus, in Coxendicum dolore & Hydrope, mundificat ulcera foetida, Gangrænam cohibet, strumas dissipat, ad Anginas valet cum Melle illitus, *Schrod.*

2. Encrasicholus *Offic. Aldrov. Jons. Aphya* Encrasicholus, quos alii Engraules, alii Lycostomos appellant *Rondel. Gesn. Haleculæ Bellon. Schönfeld* vocat *Sehe Marensen / ling. German. recepta Anchovies.* Sale conditæ in doliolis asservantur, & ad nos adferuntur. *Ufu.* Garum quod ex his optimum conficitur. *Vires.* Iisdem usibus inservit quibus Muria Halecis.

## *VI. De Sturione.*

**S**Turio *Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. R. Iäby. p. 239. Accipenser Rondel. Silurus Salv. Ein Stör / Stur / Sturlein.* Muria eum gignunt, sed flumina maximè nobilet. *Ufu.* Ossa, & Caviarium, quod est massa, saponem Hamburgensem viridem colore & substantiâ referens, advehiturque magna copia ex Muscovia in Italiam & alibi, cujus condiendi modum *Gesnerus* refert. Ova exemptis quibusdam nervis qui intererant, lota ex aceto aut vino albo, in tabulam extendes ut exiccentur. Salita deinde in vase aliquo, aut involuta Sale, manu, non



tudicula, refringantur: in saccum raræ texturæ, ut inde humor exeat, conjicies. Postremò verò in seriam in fundo perforatam, ut siquid humoris inest, inde exeat, in usum repones, bene premendo & operculando. *Vires.* Ossa commendantur in Arthritide vaga, ut & in Colicis doloribus discutiendis exhibita. *Schrod.* Caviarium nutrit, Semen auget, libidinem excitat.

## VII. De Ichthyocolla.

**I**chthyocolla *Offic. Rondel. Bellon.* Ichthyocolla *Jonsf.* Huso Ichthiocola *Schrod.* Hausen / ein Leimichter Fisch ohne Graten. In fluviis magnis. *Usu.* Gluten Ichthyocolla dictum, substantia est ex albo flavescens, in spiras coacta, saporis glutinosi, odoris nullius, ex corio, intestinis, ventriculo, pinnis & cauda hujus piscis confecta, hoc modo. Partes dictæ in frustula tenuissima sectæ macerantur in Aqua calida quanta sufficit; hinc coquuntur lento igne ad consistentiam pultis, malaxanturque antequam refrixerint in massam & in pelliculas deducta. *Vires.* Siccat, explet, quadantenus mollit. *Schrod.* Incrassat Sanguinem & anodynum est, usurpatur etiam in exulceratione pulmonum & faucium, in fluore albo exhibetur cum successu: sunt qui exhibent in Dysenteria. Externè conglutinat.

*Ichthyocolla*, ex vesica Husonis fit, ut D. *Willughby* affirmat, at *Schroderus* ex corio ejus, &c. præparatam esse vult, *Schottus* ex pisce Ichthyocolla fieri statuit; hinc patet ex diversis piscibus

bus, fieri, nimirum ex Husone & pisce hic descripto sub Ichthyocollæ titulo & fortasse etiam (inquit clarissimus & doctissimus vir D. Joannes Raius) aliis nonnullis.

---

*Pisces non aculeati, quibus unica in dorso pinna, fluviatiles, dentati.*

**F**luviatilium nomine aquarum dulcium incolas intelligimus, tam lacustres, quàm fluviatiles. R. Ichthy. p. 245

*VII. De Lucio.*

**L**ucius Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Rondel. Belon. Ein Hecht. In fluviis familiaris est. Usus. Mandibula seu inferior maxilla, & Axungia. Vires. Axungia vulgare medicamentum est, illiniturque plantis pedum & petusculis Infantulorum, ad revellendos catarhos, & demulcendam tussim. Mandibula exiccat, abstergit. Hinc datur in Pleuritide seu specificum; confert itidem ut & reliqua capitis ossicula in calculo, fluore albo mulierum, partuque difficili. Extrinsecus (cinis) sistit synoviam, vulnera inveterata mundificat, hæmorrhoides exiccat, Schrod.

*Pisces non aculeati, quibus unica in dorso pinna, fluviatiles, & edentuli.*

**H**IS maxilla edentulae sunt, dentes autem in gutture seu imo ore prope ventriculi orificium. Hinc malacostomi pisces dicti sunt. Vesica natatoria his omnibus bipartita. R. Ichthy. p. 245.

### IX. De Carpione.

**C**arpio Offic. vel Carpo Schrod. Cyprinus Aldrov. Rondel. Gesn. Jons. Bellon. Carpa Cassiod. Ein Karpffe. In lacubus & fluviis. Usu. Fel, Axungia, Ossa in faucibus Lapidescarpcionum in Officinis dicta. Vires. Fel oculorum hebetudini & nubeculae subvenit, Axungia nervorum affectibus calidis auxilio est. Os triangularis colicis doloribus calculosis, comitialibusque conferre statuitur, & ad Epilepsiam commendatur. Schrod.

Lapis palati ægris in gravi febris æstu allevamentum aliquod afferre traditur, quòd sitim fedet & refrigeret; sanguinisque è naribus fluxiones cohibere si ore contineatur, sunt qui affirmant. R. Ichthy. p. 246. Ex Cyprinorum ovis Caviarium rubrum fieri solere Judæis dictum scribit Bellonius.

### X. De Tinca.

**T**inca Offic. Schrod. Jons. Aldrov. Omnium ferè Autorum R. Ichthy. p. 251. Schlyene. Piscis est mucosus excrementitius amans aquas palu-



palustres, cœnosas, lutosasve. *Vires.* Dissectus imponitur pulsibus manuum pedumq; plantis, ad mitigandum æstum febrilem, vel ad diver-tendum venenum pestilentielle, Simili etiam modo adhiberi solet in dolore capitis ac articu-lorum. Vivæ Tincæ una post alteram umbilico ac epati impositæ, donec moriantur, Icterus curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tincam, præcipuè tegu-mentum, in fluore albo mulierum exhiberi cum successu vidi. *Schrod.*

## *XI. De Barbo.*

**B**Arbus *Offic. Rondel. Aldrov. Gesn. Jons.* Barbo *Schrod.* *Mytus fluviatilis Bellon.* Barbe / *Barine.* In fluviis. Piscis est in culinis satis laudabilis, officinis autem rarò in usu est. *Vires.* Ova nonnullis assumuntur ad cien-dum vomitum & alvum, quod sat violenter perficiunt. Ova venenata esse vulgò credun-tur, inquit *Rondeletius*, quod vim turbandæ alvi & ventriculi subvertendi habeant. Vide hac de re duas historias apud *Gesnerum* p. 143.

---

*Pisces non aculeati quibus duæ in dorso pinnae eriguntur.*

## *XII. De Genere Truttaceo.*

**T**rutacei generis nota characteristica, quibus ab omnibus aliis piscibus queant distingui, est pinnu-la parva, adiposa, in extremo fere dorso nullis

radiis instructa, *Ceterum truttaceum genus commo-  
dissime dividitur in edentulos ut Aschia, & dentatos,  
ut Trutta. R. Ichthy. p. 182.*

1. *Aschia & Thymallus Offic. Thymallus  
Schrod. Gesn. Aldrov. Rondel. Jons. Thymum  
Bellon. Usche. In fluminibus montosis. Usu,  
Axungia, Vires. Oculorum maculas, unguet-  
que abstergit, sole liquata & melle permixta  
maculas cutis tollit, foveas post variolas reli-  
ctas explet, illita, Schrod.*

2. *Trutta Offic. Schrod. fluviatilis Aldrov.  
Gesn. Bellon. Rondel. Jons. Johre / Forelle. In  
fluviiis saxosis & rapidis. Piscis est culinis cre-  
berrimus & laudabilis. Usu. Pinguedo, Vires.  
Hæc illinitur utiliter mariscis & ani fissuris.  
Schrod.*

*Pisces Spinosi quibus Pinnarum dorsa-  
lium radii aliqui aculeati sunt.*

### *XIII. De Perca.*

**P***erca Offic. Schrod. fluviatilis Aldrov. Gesn.  
Rondel. Bellon. Fluviatilis minor Jons.  
Porcus Niloticus Strab. Aurata fluviati-  
lis Trag. Ein Barsch / Bersich. In fluviiis fre-  
quens. Usu. Ossa in capite reperta, juxta  
spinæ dorsi initium, Lapides Percarum Offi-  
cinis dicti. Vires. Hi viribus conveniunt cum  
reliquis lapidibus testaceis, adhibenturque in  
calculo atterendo, renibus abstergendis. Ex-  
trinsecus in dentifriciis, vulneribus exiccandis, Schrod.*

## XIV. De Mugile.

**M**ugil Offic. R. Ithy. p. 274. Aldrov. Cephalus Rondel. Cephalus seu Mugil Belon. Gesn. In mari. Ufu. Botargum i. e. Ova salita quæ hoc modo parant. Folliculos ovorum integros exemptos sale trito aspero operiunt per quatuor aut quinque horarum spatium, deinde inter duos asseres seu tabulas ligneas opprimunt per diem & noctem, postea lavant, tandem tredecim aut quatuordecim diebus continuis in sole exiccant, noctu sub tectum recipientes, NB. Alii ad fumum suspendere ajunt, procul tamen flamma, ne vehementem calorem sentiant. Vnes. Dejectam appetentiam excitant, sitim proritant, vini que gustum jucundiores reddunt. R. Ithy. pag. 275.

## Pisces Cartilaginei.

**P**isces Cartilaginei Plinio dicuntur, qui pro spinis cartilaginem habent; qui intra se ovum grande concipiunt, quod in utero fovant & excludunt, adeoque vivum animal pariunt. Hi omnes squamis carent, pro branchiis autem seu potius branchiarum aperturis quinque habent utrinque foramina oblonga, eorumque mares duos appendices pinnis que podicem amplectuntur adnexas, quas mentulas esse putamus. R. Ithy. p. 45.



## XV. De Galeo.

**M**ustelus spinax Offic. Bellon. Salvia. Gaz-  
 spinus Scalig. Galeus acanthias Jons. A-  
 canthias sive Spinax Aldrov. Gesn. Rondel. Hund  
 Fisch / See-Hund. Cœnosa maris receptacul-  
 incolit. Ufu. Cutis aspera, cujus usus est apud  
 mechanicos ad Alabastritem, Sagittas, &c. po-  
 liendum, in medicina nunquam occurrit.

---

## De Piscibus Cetaceis.

**C**etacei Pisces, autore Aristotele, ii propriè di-  
 cuntur, qui magni sunt, & perfectum animal ex  
 semine, non ex ovo gignunt, vel sunt qui Qua-  
 drupedum viviparorum mole pulmone respirant, coeunt  
 concipiunt, vivos foetus pariunt, & lacte alunt. R.  
 Ichthy. p. 21. & 22.

## XVI. De Monocerote.

**Q**uatuor Animalium terrestrium monoceros  
 species ab autoribus describuntur. 1.  
 Oryx bisulca seu Strepsiceros i. e. Lupus mari-  
 nus Gesn. & Bellon. 2. Asinus Indicus monoceros  
 3. Monoceros Equi figurâ vulgo pictus. 4. Rhino-  
 ceros. Quarum priores tres, quicquid de iis  
 garriant aut litigent Authores, pro fictitiis &  
 fabulosis habemus, nec ullum Animal terrestre  
 Unicorne præter Rhinocerotem agnoscimus  
 quem Andreas Baccius verum Monocerotem esse  
 affirmat.

Piscium

Piscium quoque species aliquot Monoceros esse dicuntur; è Cetaceo genere duæ, quarum altera piscis ille est cujus cornu aut potius dens, intortus & intus concavus, in muris curiosorum sæpius occurrit, estque Cornu monocerotis Officinarum, quem hic exhibeo.

Monoceros & Unicornu *Offic. Park. Einhorn.* In freto Davis invenitur. *Ufu.* Dens prægrandis, candidus, teres, striatus, tornabilis, ex mandibulâ superiori sinistra, eodem fere modo ac Elephantis prodiens, dextra autem citò decidit. Ab Ebore distingui potest, fibris quas subtiliores exhibet, simul & solidius ac gravius ferè est; in cæteris ebur æmulatur. *Vires.* Sudoriferum est, Alexipharmacum, ac Cordiale. Hinc laudatur adversus venena, morbos contagiosos, &c. Proficuum quoque censetur in Epilepsia infantum. *Schrod. Andreas Baccius* qui integrum de Unicornu Tractatum conscripsit, ejus fragmenta annulis includere jubet, digitisque circumferre, vel de collo, loco amuleti, suspendere ut cutim tangat. Eandem vim habet cum Cornu Cervi, Ebore, &c.

Frustula cornuum quæ nomine monocerotis venduntur nihil sunt aliud, ut affirmat *Paulus Amannus*, quàm Ossa Balænæ, Equi Marini, aut Elephantis dentes, qui juxta *Cardanum* artificio ita sequacia reddi possunt ut Monocerotis mentiantur.

## XVII. De Cete.

I. **O**Rca Offic. Aldrov. Gesn. Rondel. Bellon. Jon Trompa Park. An Cetacei generis piscem quem nostrates Grampus vocant *Mer. Pin* Ein grosser Braun's Fisch. Schönfeld. In Mas Groenlandico & Islandico capiuntur, *Ulsu*. Pinguedo quædam naturalis, substantiæ squamosæ albæ, teneræ, mollis, quasi ex parvis raris furaceis squamis conflata, nata in ventriculo cerebri, aliquando etiam ex maris superficie collecta, lixivii beneficio purificata, saporis pinguis & viscosi. NB. 1. Quod ad nos transfertur rarò colligitur è summo mari, potius qui Groenlandium navigant, colligunt ex ipsa superficie cerebelli Balænarum interfectarum & per pannum exprimunt & cum domum veniunt lixivio forti extrahunt pinguedinem omnem superfluum, ut album reddatur. 2. In aliis piscibus præter Orcam non reperitur, inquit *Wormius*. Alii autem inter lobos Tuberonis cerebelli propriis manibus se collegisse affirmant, alii sedem collocant in cavitate glandulosâ Maxillæ interioris. *Vid. D. Tyson de Anatom. Phocæne*. Eligatur candidum, pingue, recens, non rancidum, neque flavum. *Vires*. Humeat, resolutum anodynum est, proin vulgaris usus in coagulatione sanguinis resolutione à casu vel similiter contracti. In torminibus colicis sedandis, ut & in torminibus ventris Infantum mitigandis. In Tussi tartaroque pulmonum demulcendo. Ex-

trin-



insecus sunt qui cicatricibus exanthematum  
allinunt, ut carne eas repleant. *Schrod.*

De Spermate Ceti Authores in varias opinio-  
nes distracti sunt. *Schroderus* Mineralibus illud  
accenset, & bituminis genus in Mari collectum  
esse vult. Sunt autem alii qui florem salis à Ve-  
teribus descriptum nominant, adeoque spu-  
mosum quid salis marini esse perhibent. Verum  
& hi hallucinantur, inquit *Schroderus*. 1. Quòd  
cum veterum flore salis, qui ruber & liquidus  
describitur, minimè conveniat. 2. Quòd sit ci-  
tra vim absterforiam & salsam, quam spuma sa-  
lis utique referat. Verum plerique Philosophi  
Animali cuidam originem suam debere con-  
tendunt. Hi tamen etiam sententiis suis divisi  
sunt. Nonnulli Ceti cujusdam Sperma revera  
esse statuunt, ut nomen ipsum arguit. *Gesnerus*  
Lac Balænarum in mare effusum & ibi concre-  
tum esse vult. *Borrichius* quod sit spinalis Me-  
dulla contendit. Alii denique Cerebrum ipsum  
esse existimant. Quod Sperma non sit ostendit  
*Wormius*, Corpus illud inquires, quod à nobis  
Sperma Ceti vocatur, non est ipsum semen sed  
liquor Cerebri non cujusvis Ceti, sed hujus ge-  
neris qui *Orca* vocatur. Eiusdem opinionis est  
*Clusius*. Quodque nec lac sit, neque spinalis Me-  
dulla, neque Cerebrum ipsum ab ipsius pingue-  
dine demonstrari potest. Quid sit, quibusque  
in Animalibus inveniatur jam ante ostendi.  
Fieri itaque potest, ut tam in mari, quam in  
tali Ceto reperiatur hæc materia, inquit *Am-  
mannus*. In Ceto, quando capitur quia genera-  
tur

tur in ejus cerebro : In mari autem quando h  
Cetus pugnando cum aliis occubuit, fracto cu  
nio, vel etiam certo tempore, instinctu natu  
per proprios meatus sponte evacuavit.

2. Cetus *Offic. Schrod. Balæna Aldrov. Rond*  
*Gesn. Bellon. Vulgo Jons. An Cetus Britannic*  
*Mer. Pin. Balæna Britannica antiquorum? Wa*  
*fisch. In mari. In Usu. est Axungia, sed in Off*  
*einis rarò, inter Mechanicos frequenter, c*  
*etiam laminæ corneæ in ore positæ nostratibu*  
*Fischbein dictæ. Vires. Axungia medetur scabi*  
*illita. Schrod.*

## SECTIO SECUNDA.

### De Avibus.

**A**ves sunt, animalia Sanguinea, ovipara, plum  
sa, alata, bipeda, pulmone respirantia, corde duob  
bus ventriculis prædita, capite rostrato, rostr  
substantiæ corneæ, dentibus carentia.

Aves sunt vel

Terrestres

Rostro & unguibus aduncis, carnivoræ & rapaces

Diurnæ quæ interdiu prædantur

Majores; atque hæc vel

Generosiores; A

quila.

Ignaviores; Vulture

Minores, ad aucupium institui solitæ

Macropteræ, i. e. alis longis & caudæ ferè  
æqualibus instructæ; *Milvus.*

Brachypteræ, i. e. alis brevibus & ab extre  
mâ caudâ multum deficientibus, digitis  
posticis.

a b c

Singulis

- a b c { Singulis, unguibus nigris; *Accipiter*.  
Binis, unguibus etiam luteis; *Cuculus*.  
Nocturnæ, quæ internoctu volant & prædantur;  
Noctua.  
Rostro & unguibus rectioribus minusque hamatis,  
suntque vel.  
Maximæ, singulares & sui generis, ob corporum  
molem & alarum parvitatem volandi impotes;  
*Struthio*.  
Mediæ magnitudinis, rostris instructæ  
Magnis, crassis, validis & oblongis, quæ vel  
sunt  
Victu promiscuo, ex carnibus & insectis, colo-  
lore  
Nigricante, corpore  
{ { Majore; *Corvus*.  
{ { Minore; *Cornix*.  
Vario, ex nigro & albo; *Pica*.  
Insectivoræ; *Upupa*.  
Minoribus & brevioribus, quæ vel carne  
Alba, exque vel  
Cicures seu domesticæ, cauda  
{ { Longissima, corpore majore; *Pavo*.  
{ { Breviore, corporeque etiam minore;  
{ { *Gallus*.  
Feræ seu sylvestres,  
{ { Major; *Perdix*.  
{ { Minor; *Coturnix*.  
Nigra  
{ Torque carentes; *Columba*.  
{ Torquati  
{ { Major; *Palumbus*.  
{ { Minor; *Turtur*.  
Minimæ, Aviculæ dictæ, quæ vel sunt rostris  
{ Longissimis, piscivoræ; *Alcedo*.  
{ Brevioribus

Ternibus,



- Tenuibus, insectivoræ, cauda  
 { Unicolore, digito postico  
 { Longissimo; *Galerita*.  
 { Breviore & majore; *Passer troglodytes*.  
 Bicolore longissima  
 { Forcipata, alis longissimis; *Hirundo*.  
 { Non forcipata, pennis exterioribus  
 { Omnibus albis; *Motacilla*.  
 { Extremis tantum; *Parus*.  
 Crassis; *Passer*.  
 Aquaticæ sunt vel  
 Fissipedes, quæ circa aquas versantur, & in aquosis  
 plerumque victum quærunt, aquis tamen non  
 innatant,  
 { Maximæ; *Grus*.  
 { Minores piscivoræ, collo  
 { Longiore; *Ardea*.  
 { Breviore; *Ciconia*.  
 Palmipedes quæ aquis innatant, cruribus breviori-  
 bus donatæ, tetradactylæ, digito postico soluto,  
 latirostræ, corpore  
 { Majore, collo  
 { Longiore, rostro & pedibus nigris; *Cygnus*.  
 { Breviore, rostro & pedibus rubris; *Anser*.  
 { Minore; *Anas*.

## *Aves aquaticæ fissipedes.*

**H**Æ omnes longicruræ sunt, cruribus quoque su-  
 pra genua aliquousque nudis, ut aquas vadosas  
 commodius ingrediantur, circa aquas versantur,  
 & in aquosis victum quærunt; aquis tamen non inna-  
 tant. R. Ornith. p. 199.

## I. De Grue.

**G**Rues ab Ardeis differunt, 1. Ungue medii digiti minimè serrato. 2. Magnitudine qua illas superant. 3. Rostro brevior. 4. Ventriculo Musculoso. 5. Appendicibus binis, cum Ardea singulas habeant. 6. Mira asperæ arteriæ revolutione. R. Ornith. p. 200.

Grus Offic. Schrod. R. Ornith. Kranich. Sæpissimè ad nos commeant. Usu. Avis integer. Pinguedo, Fel, Caput, Oculi, Ventriculus, Medulla tibiæ. Vires. Avis hæc quia nervosa est, nervosis ac membranosis partibus peculiariter convenire statuitur. Hinc usus ejus commendatur in doloribus colicis. Pinguedo surditati auxilio est, auribus instillata, Lienis duritiem, aliosque tumores renitentes emollit, rigori cervicis velocissimè succurrit, ejusdemque naturæ esse dicitur cujus Anserina pinguedo. Fel oculis prodest. Caput, Oculi, & Ventriculus pulverisata fistulis, cancris, & varicosis ulceribus insperguntur. Medulla tibiæ intervitt unguento Ophthalmico inde parando. Schrod.

## II. De Ardea.

**A**Rdearum autem familia hac certissima nota ab aliis omnibus avium generibus distinguitur, quod nimirum intestinum cæcum unicum & simplex lingula obtineant, cum aliæ aves geminas nascæ sint. R. Ornith. p. 203.

Ardea Offic. Schrod. Cinerea major Jons. R. Ornith. Aldrov. Pulla sive cinerea Gesn. Reiger. Usu, Pinguedo sive Axungia. Vires, Rarus usus

est in Medicina, lenire tamen dicitur Podagricos dolores, oculorumque nebulas discutere, & visum clarificare illata; hinc & surdastris conferre indita auribus. Schrod.

### III. De Ciconia.

**N**Ota sunt, Collum brevius & crassius quàm in Ardeis, rostro crepitat crebro mandibularum ad se mutuo appulsu, ungues sunt lati humanis similes.

Ciconia Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Alba R. Ornith. p. 210. Storck. Rarò huc advolat, Ussu. Avis ipsa, Fel, Axungia, Stercus, Ventriculus. Vires. Ciconia vim habet alexipharmacam insignem, adeò ut contra omnis generis venena & imprimis contra pestem præstantissima censeatur; insuper nervosis & articularibus affectibus succurrit. Fel ad oculorum vitia commendatur. Axungia podagricis & tremulis articulis utiliter illinitur. Stercus, si ex aqua hauriatur, comitialibus aliisque morbis capitis prodesse credunt. Ventriculus exiccatus ac pulverisatus pro maximo secreto habetur in venenis. Schrod.

### *Aves palmipedibus cruribus brevioribus latirostræ.*

**P**almipedibus autem in genere hæc nota conveniunt.  
 1. Tibiæ breves. 2. Crura ad articulos genuum plumis vestita. 3. Digiti postici breves. 4. Digitus anticus extimus intimo brevior. 5. Uropygia minus erecta, quam aliarum avium. 6. Unguem seu appen-



appendicem habent in extremitate laminae rostri superioris. 7. Capita ad latera compressa obtinent. R. Ornith. p. 241.

### Anserinum genus.

**N**otæ sunt, Moles corporis major; collum oblongum, alæ amplæ, cauda quoque ampla & in circula rem ferè circumferentiam terminata, annulus circa utropygium albus, dorsum rotundius & elatius, nec adeò plantum & depressum ac in Anatinogenerè, rostrum ad basin crassius, versus apicem tenuius, minusque planum ac resimium quam Anatibus. R. Ornith. p. 271.

### IV. De Cygno.

**C**Ygnus Offic. Aldrov. Gesn. Jons. mansuetus R. Ornith. Olor Schrod. Schwan. Usu. Adeps, Vires. Emollit, lenit, attenuat, adeoque utilis est hæmorrhoidibus, vulvari duritiei, oculos purgat, cum vino lentigines cutis tollit. Schrod.

### V. De Ansere.

**A**Nser Offic. Schrod. domesticus R. Ornith. p. 273. Aldrov. Gesn. Jons. Gans. Usu. Pinguedo, Sanguis, Stercus, Cuticula pedum. Vires. Pinguedo calore suillam superat, suæque subtilitatis ratione promptius penetrat ac resolvit, adeoque rectè per anum injicitur, ad obtundendam erosionem in alto corporis sitam; alopecias capillis explet, rimis labiorum medetur, tinnitui aurium succurit, spasmus

nervosque rigidos sanat, alvum laxat, præcipue infantum. *Sanguis* alexipharmacus habetur. *Stercus* calefacit & siccatur vehementer, incidit, aperit; Menses, secundinam & urinas potenter movet. Hinc maximi usus in morbo regio, Ictero, Hydrope, Scorbuto. *Cuticula pedum* exiccata & pulverisata ob abstringendi vim commendatur in profluvio mensium sistendo. Extrinsecus cum successu pernioni imponitur. *Schrod.*

## VI. De Anate.

**A**Nas Offic. *Schrod.* domestica *Aldrov. Jons.* Domestica vulgaris *R. Ornith. pag. 293. Cicur Gesn. Ente / Endt; Vogel. Uss.* Anas viva, Adeps, Sanguis, Fimus. *Vires.* Viva sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata. Eapropter eo utimur in dolore interno & externo, scil. laterum, artuum, in nervorum frigida intemperie, &c. *Sanguis* alexipharmacus est, & hinc inter antidota nonnunquam ascitur. *Fimus* morsui venenatorum animalium imponitur. *Schrod.*

## *Aves terrestres minores seu Avicula.*

**A**vicula in genere dividi possunt in 1. Longirostras seu piscivoras. 2. Tenuirostras seu insectivoras. 3. Rostris brevibus ac crassis seu phytivoras.

*Aviculæ rostris longissimis seu  
Piscivoræ.*

*VII. De Ispida.*

**A**vis est speciosa, passere paulo amplior, rostro longo, colore, tum cœruleo, tum viridi, tum purpureo, juxta glaciem rivulorum degens.

Ispida Offic. Aldrov. Gesn. Jons. an Veterum Alcyon. R. Ornith? p. 101. Alcedo Schrod. Eise Vogel / Eisen: Bart. Ussu. Cor. Vires. Siccatum & collo infantum appensum comitalem arcere volunt. Schrod.

---

*Aviculæ rostris tenuibus seu  
Insectivoræ.*

*VIII. De Alauda.*

**N**otæ sunt, Calcaneum seu digiti postici unguis prælongus, color plumarum testaceus terreusve; in sublime evolantes cantillare. R. Ornith. p. 148.

Galerita Offic. Alauda Schrod. Aldrov. Gesn. major Jons. Vulgaris R. Ornith. pag. 149. Serche. Ussu. Avis ipsa, cor, sanguis. Vires. Avis ipsius cor femori alligatum arcere colicum dolorem aiunt, idem quoque de corde recenti devorati perhibent, Sanguis recens ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissime subvenit. Schrod.



## IX. De Hirundine.

**N**Otae sunt, Caput grande, rostrum breve; Oris hiatus amplius: Pedes breves & exigui: Alae longissimae: Volatus pernix & ferè continuus: cauda longa & forcipata, ad corpus expeditius flectendum & circumagendum. R. Ornith. p. 154.

Hirundo Offic. Schrod. domestica Aldrov. Gesn. Jonsf. R. Ornith. pag. 155. Vulgaris Scalig. Schwabe. Usu. Avis integra, Cor, Sanguis, Lapilli, Nidus, Stercus. Vires. Integræ & earum pulli Epilepsiæ specificè subveniunt, oculorum hebetudini, lippitudini, cinis cum melle illitus, Anginæ ac Uvulæ inflammatae medetur. Cor Epilepsiæ itidem conferre, memoriamque roborare aiunt, alii contra quartanam devorant. Sanguinem peculiariter oculis conferre volunt. Lapillus in pullorum nonnullorum ventriculo, (rarò licet) invenitur, Chelidonium dictus, grani, lentis vel pisi magnitudine. Hunc Epilepsiæ puerorum convenire volunt, brachio alligatum vel collo suspensum. Nidus auxilio anginæ est, oculorum rubedini medetur: Ictui viperino convenit impositus Stercus, calefacit impensè, discutit, acre est. Usus præcipui in moribus canis rabidi, in doloribus colicis & nephriticis, alvum irritat. Schrod.

## X. De Passere troglodytide.

**P**asser troglodytes Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jonsf. R. Ornith. p. 164. Regulus Bellon.

Tarn.

*Turn. Baun König. Vires. Maximopere commendatur ad calculum atterendum & expellendum, sive integer evulsis pennis sale conditus crudè devoretur, sive incineratus assumatur. Schrod.*

## XI. De Motacilla.

**A**vicula est circa fluentia præcipuè degens, cauda tremula bicolore.

Motacilla Offic. Schrod. alba Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. p. 171. Culicilega Turn. Albicula Gaz. Cnipologus Aristotelis Bellon. Bachstelge / Queckstelge. Ufu. Avicula integra. Vires. In calculo atterendo vis mira prædicatur. Schrod.

## XII. De Paro.

**P**aros vocamus, aviculas quæ circa arbores plerumque versantur, deque insectis quæ ibi inveniunt præcipuè victitant. Irrequietæ sunt & certo aliquo loco residere nesciæ, at modò hanc modò illam arborem petunt, Rostra his brevia: Corpuscula exigua, caudæ longæ. R. Ornith. p. 174.

Parus Offic. major Aldrov. Gesn. Jons. Carbonarius Turn. Carbonarius major Schrod. Fringillago seu Parus major R. Ornith. Kohlmeise / Spiegelmeise. Ufu. Avicula ipsa. Vires. Efficax prædicatur adversus renum calculos & colicos cruciatus, in cibo vel cinere exhibitus. Schrod.

*Aviculae magnis crassis & validis  
rostris seu Phytivora.*

### XIII. De Passere.

**R**Ostra eis brevia, crassa, nonnihil incurva, color testaceus, terreusve. R. Ornith. p. 182.

Passer vulgaris Offic. Schrod. domesticus Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. Sperling. Vires. Quia avis salacissima est, commendatur ad Venerem, comesta præcipuè cerebella. Schrod.

*Aves rostro & unguibus minus  
hamatis Majores.*

**H**Æ sunt vel rostris crassis, validis & longiusculis rectis, vel rostris brevioribus aut minoribus donata.

*Aves majores rostris crassis, validis  
& longiusculis rectis.*

**H**Æ sunt vel carne, insectis & frugibus, vel insectis & frugibus promiscuè vescentes, vel insectis tantum.

### XIV. De Corvo.

**C**ORVUS Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. pag. 82. Nabe. Usu. Pulli, Cerebrum, Pinguedo, Sanguis & Stercus, Vires. Pulli



Pulli incinerati commendantur ad comitiales morbum, & ad Podagram, Alphos, itidemque Cerebrum ad Epilepsiam. *Pinguedo* & *Sanguis* capillos reddit nigros. *Stercus* Infantum tussim, doloremque dentium sedare aiunt, de collo suspensum. Sunt qui *Ova* in Dysenteria exhibent. *Schrod.*

### *XV. De Cornice.*

**C**ornix *Offic. Schrod. R. Ornith. p. 83. Gesn. Jons. Nigra Aldrov. Simpliciter Turn. Krähe. Usu. Fimus. Vires.* Fimum in vino potum Dysenteriam sanare tradit *Kyranides. Schrod.*

### *XVI. De Pica.*

**P**ica *Offic. Schrod. Varia caudata R. Ornith. p. 87. Varia sive caudata Aldrov. Gesn. Jons. Aglaster oder Uhel. Vires.* Avis hæc maximè commendatur ad oculorum obscuritatem, ruborem, dolorem, comesta vel incinerata, oculisque indita, vel quocunque modo apposita. Convenit & Maniacis, Epilepticis, Melancholicis cinis exhibitus, *Schrod.*

### *XVII. De Upupa.*

**U**pupa *Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Wiesdehopff. Avis est melancholica, spurcissima, victitans vermiculis in stercore repertis, Erucis, Scarabæis, &c. Usu. Caro, Pennæ. Vires.* Caro ejusque decoctum proprietate sua colicos juvat, assumpta. *Avicen.* Pennæ dolores capitis demulcere dicuntur, impositæ. *Schrod.*

## XVIII. De Struthione.

**A**vis est maxima, exotica, ob corporis molem & alarum parvitatem ad volandum omnino inepta, facultate chylica celebris.

Struthio Offic. Schrod. Struthio - camelus Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. Strauß. Usu. Tunica ventriculi, Adeps, Ova. Vires. Tunica interior Ventriculi ventriculum corroborat, calculosque dissolvit mirè. Adeps nervosis partibus convenit, duritiem Lienis mollit, dolores nephriticos mitigat, inunctus. Schrod. Ova Usta & in aceto trita impetigines emendant. Jons.

---

*Aves majores rostris brevioribus aut minoribus donatæ, seu Granivoræ.*

**H**æ sunt vel carne alba seu Genus gallinaceum, vel carne nigra seu Genus Columbinum.

---

## Gallinaceum Genus.

**G**allinacei generis notæ sunt, 1. Rostrum habere breve, validum & nonnihil recurvum, ad grana colligenda perquam idoneum. 2. Corpus crassum, carne multa, alba, præcipuè musculorum pectoris. 3. Alas breves & concavas. 4. Ventriculum crassis musculis instructum. 5. Appendices seu intestina cæca longissima. 6. Multiparum esse & humi nidificare. R. Ornith. p. 108.

## XIX. De Gallo gallinaceo.

**G**Allus & Gallina *Offic. Schrod.* gallinaceus & Gallina domestica *R. Ornith. p. 109. Jonsf. Hahn und Henne oder Huhn. N. Gallus castratus Capo dicitur. Usu. Avis integra, Cerebrum. Tunica Ventriculi, Testiculi, Fel, Pinguedo, Guttur, Stercus, Ova. Vires.* Gallina dissecta sanguine adhuc calente imponitur capiti in Phrenitide, Cephalalgia, &c. Moribus itidem venenatorum animalium simili ratione mederi ajunt: anthracibus imposita venenum elicit; nec prætereundum, quod sanguinis eruptionem in vulneribus recentibus sistat. *Viva* circa anum deplumata è bubonibus venenum extrahit, imposita. *Cerebrum* vim habet incrassandi, fluxusque compescendi. *Tunica interior* ventriculi extracta, siccata & pulverisata, singularem vim habet tum astringendi & corroborandi ventriculum, adeoque vomitum & fluxum alvi compescendi, tum & calculum comminuendi. *Testiculi* deperditas in morbis vires mirificè restituere dicuntur, semen prolificum suppeditant, & Venereas vires roborant. *Fel* maculas cutis aufert illitum, oculis convenit. *Pinguedo* Gallinarum & Caponum calefacit, humectat, emollit, lenit, mediaque inter suillam & anserinam existit, harumque acrimoniam obtundit: convenit labiorum rimis, aurium doloribus, oculorum pustulis. *Guttur* galli ustum & non consumptum, sed tostum & exiccatum, sub noctem ante coenam exhi-



exhibitum, specifica proprietate sanat mictionem involuntariam nocturnam. *Solenard. f. 4 Conf. II. Stercus* omnia eadem præstare aptum est, quæ columbinum, sed inefficacius, privatim tamen colico & uterino dolori convenit. Valet itidem ad icterum, calculum & urinæ suppressionem. N. Præstantius habetur id quod in stercore album est. Extrinsecus excipiat achores capitis, aliamque scabiem manantem cinis inspersus. Luteum stercoreis conso lidat Vesicæ exulcerationem. *Ova* medicina exhibent testas, membranulas, albumen vitellumque. *Testæ* vim habent lithontripticam, tartareamque mucilaginem incidendi. *Membranule* vim habent diureticam intrinsecus & extrinsecus adhibitæ, præputioque imponuntur infantum. *Albumen* vim habet refrigerandi, astringendi, agglutinandi, Ususque crebri est in oculorum rubedine, in conglutinatione vul nerum ( cum Bolo communi ) in fracturis, &c. Intervit & anacollematis. N. *Hippocrates* exhibet febricitantibus albumina N. 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum. *Vitellum* Ovum vim habet anodynâ, maturandi, digerendi, laxandi, proinde usu creberrimo Clysteribus immisceri, quin & cum salis tantillo mixtum infantum umbilico (in testa juglandis) imponi solet ad ciendam alvum. *Schrod.* Qui plura velit *Aldrovandum* & *Schroderum* adeat.

## XX. De Pavone.

**A**Vis hæc passim nota, vel sola cauda longitudine, & gemmantibus oculis ab aliis omnibus abundè distinguitur, Sc. R. Ornith. p. 112.

Pavo Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. Psau / Pagelun. Usu.. Integer, Adeps, Fel, Stercus, Penna, Ova. Vires. Jus pavonis Pleuriticis specificè fertur prodesse, præcipuè si sit pingue. Adeps, cum succo Rutæ & Melle, colicos affectus optimè sanat. Fel, oculorum hebetudini, fluxionibus, asperis item superciliis medetur. Stercus, proprietate Vertiginem & Epilepsiam sanat, (in dies multos exhibitum) nimirum exiccatum & pulverisatum ʒj. maceratur per noctem in vino, &c. Penna adhibentur in suffitu, adversus uteri ascensum. Ova exhibentur ad curandam arthritidem vagam dictam. Schrod.

## XXI. De Perdice.

**P**ERDIX Offic. Schrod. cinerea Aldrov. Gesn. Jons. R. Ornith. Rebhun / Feldhun. Usu. Caro, Medulla, Sanguis, Jecur, Fel, & Pennæ. Vires. Caro comesta semen atque lac auget, Venerem excitat. Medulla ut & Cerebrum propinatum, Ictericos juvare dicitur. Fel ad affectus oculorum præfertur aliis. Sanguis oculis cruore suffusis & recentibus eorum vulneribus illinitur. Jecur siccatum ad ignem & pulverisatum, morbo regio resistit singularique fertur antidotus contra febrem, si aliquoties in  
Aqua

Aqua Millefolii assumatur. *Crato. Penna* infer-  
viunt suffocationi uterinæ (suffitus naribus ad-  
motus) doloribus colicis, aliisque mitigandis,  
discutiendis &c. *Schrod.*

## XXII. De Coturnice.

**C**oturnix Offic. *Schrod. Aldrovand. Gesn.*  
*Jonsf. Wachtel. Usu.* Pinguedo & Excre-  
menta. *Vires.* Pinguedo oculis prodest ma-  
culas abstergendo. Excrementa Coturnicum  
helleboro vescentium (quod ipsis ut quidam  
scribunt, in alimentum cedit) singulari pro-  
prietate quadam conferre Epilepticis quidam  
volunt. *Schrod.*

## XXIII. De Columbis.

**C**olumbarum nota, omnibus speciebus communes, quibus ab aliis avium generibus distinguantur, non admodum multe sunt, viz. Figura corporis peculiaris, cuculum referens, tibiæ breves, Ala prolonga, volatus pernix, Vox gemebunda, bina duntaxat unica vice ova ponere; sæpius tamen in anno parere, pedes rubri & sanguinei. *R. Ornith. p. 150.*

1. Columba Offic. *Schrod. Jonsf. vulgaris Aldrov. Gesn. Domestica seu vulgaris R. Ornith. Hauf; Daube. Usu.* Columba viva, Sanguis, Tunica ventriculi, Fimus. *Vires.* Columba viva per medium dissecta, capitique dum sanguine adhuc calet, imposita, feroces humores mitigat, melancholicam tristitiam discutit. Hinc convenientissimum medicamen est, in Phrenitide, Cephalalgia, Melancholia, Podagra.



gra. Sanguis tepens oculis instillatus, dolorem, lippitudinemque sedat, suffusiones sanguinemque discutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruorem è membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat. *Tunica ventriculi* exiccata & pulverisata commendatur in Dysenteria. *Fimus* vehementer excalefacit, ( ob nitrosam facultatem qua maximè pollet ) ideoque urit, discutit, ruborem cutis sanguinem alliciendo excitat. Hinc usus frequentis in Cataplasmatibus & Emplastris rubificantibus. Sic tritus & cribatus cumque semine Nasturtii impositus, facit ad affectus inveteratos; cujusmodi sunt Arthritides, Hemicrania, Vertigo, Cephalalgia, &c. Internè calculum atterit & urinam pellit. *Schrod.*

2. *Turtur Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Turtel = Daube. Usu. Integer avis, Adeps. Vires.* Turtur viribus cum Columba convenit, peculiariter tamen commendatur in Dysenteria, ac præcipuè in sistendo mensium profluvio. *Pinguedo* inter assandum collecta illinitur Renibus, ventri, pectori, inguinibus, &c. *Schrod.*

3. *Palumbus Offic. Schrod. Torquatus Aldrov. Turn. Major Jons. Ringel. Daube / Holz. Daube. In Sylvis. Vires.* Convenit cum Columba, exustæque plumæ Ictericos reficere, calculosis, Urinæque difficultatibus subvenire dicuntur. *Schrod.*

*Aves rostro & unguibus aduncis seu  
Rapaces vel Carnivora.*

*Hæ vel sunt Diurnæ vel Nocturnæ.*

*Aves Rapaces Diurnæ.*

**R**apacibus in genere hæ notæ conveniunt. Caput habere grande, collum breve, rostrum & ungues aduncos, validos, acutos, ad rapinam & laniationem comparatos: Femora itidem valida, Linguam latam, crassam, carneam & humanæ similem. R. Ornith. p. 25.

*XXIV. De Aquila.*

**A**vis rapax diurna, è maximis, omnium generosis-  
sima, rostro à radice statim adunco. R. Ornith.  
p. 26.

Haliæetus Offic. Turn. Aldrov. Gesn. Jons. id est, Aquila marina R. Ornith. p. 29. Nilus Veterum Alder. Usus. Medulla crurum & ossium; in medicina autem raro occurrit; ad Pisces capiendos utilis esse vulgò creditur.

*XXV. De Vulture.*

**N**otæ sunt: Rostrum non confestim atque à fronte enascitur in hamum curvatum, verum post duorum digitorum continuam rectitudinem; Collum fere implume habere: Inguviem ante ventrem velut sacculus propendentem. R. Ornith. p. 34.

*Vulture*

*Vultur Offic. Schrod. niger Aldrov. Gesn. Jons. Bellon. Gener. Usu. Caro, Pinguedo, Cerebrum, Fel, Fimus. Vires. Caro convenire judicatur affectibus capitis, Epilepsiæ, Hemicraniæ, & simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur. Pinguedo convenit nervis. Cerebrum subvenit capitis imbecillitati. Fel Epilepsiam arcere dicitur, assumptum cum vino. Fimus, nidore partum excutit. Schrod.*

## *XXVI. De Milvo.*

**M**ilvus *Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Turn. vulgaris cauda forcipata R. Ornith. pag. 41. Weihe / Hünere Dieb. Usu. Ipse incineratus, Caput, Epar, Sanguis, Fel, Stercus, Pinguedo. Vires. Incineratus Podagræ, Epilepsiæque subvenire dicitur, exhibitus; idem de capite affirmant, ac Epate incineratis. Epar insuper oculorum Medicamentis adhibetur. Sanguis podagricos juvat, cum Urtica mixtus & impositus. Fel oculariis additur. Stercus, articulis cum successu imponitur. Pinguedo, articulorum doloribus illinitur, Schrod.*

## *XXVII. De Accipitre.*

**A**ccipiter *Offic. Schrod. Fringillarius Aldrov. Gesn. Jons. Fringillarius & Nisus Mer. Pin. Fringillarius, seu Recentiorum Nisus R. Ornith. pag. 51. Habich. Usu. Accipiter integer. Adeps, Excrementa. Vires. Integer oculorum vitiis succurrit, in oleo coctus, oculoque inunctus. Idem sentiendum de Adipe: Insuper*



omnibus vitiis cutis medetur oleum illud illitum. *Excrementa* calefactoria vi adeò pollent, ut à *Galeno* ex foro Medico eliminentur, nihilominus tamen sunt, qui oculorum vitiis arcendis adhibeant, aliis ad partum promovendum exhibita, vel in suffitu adhibita. *Hippocrates* & *Plinius* ad sterilitatem emendandam propinant. *Schrod.*

## XXVIII. De Cuculo.

**C**Uculus *Offic. Schrod. R. Ormith. Jons. Aldrov. Rondel. Coccyx Mer. Pin. Ruckuck. Usus.* Avis ipsa, Fimus. *Vires.* Ustus commendatur ad calculum, ventriculi dolorem & humiditatem. *Rondel.* Datur & utiliter febricitantibus paroxysmi tempore, medetur Epilepticis, &c. *Fimus*, morsum canis rabidi curat, potus. *Schrod.*

---

## *Aves Rapaces nocturnæ.*

## XXIX. De Noctua.

**N**Octua *Offic. Schrod. Nacht-Eul. Usus. Caro, Fel, Pinguedo. Vires. Caro* curat Paralyticos, *Plinio*; Melancholicos, & sim. *Rabbi Moys.* Apostema Anginæ mirabiliter aperit & rumpit, cinis integræ non deplumatae in guttur immissus, *Fel*, ad maculas Oculorum valet, *Pinguedo*, aciem Oculorum acuit. *Schrod.*

## SECTIO TERTIA.

## De Serpentino Genere.

**S**erpentini generis notæ sunt, Corpus depile, Pulmo rarus, unicus in corde ventriculus, ovipara esse saltem intus, caput corporis respectu parvum, hiatus tamen amplius.

Serpentini generis Animalia sunt vel

- Apoda
  - Vivipara, id est, ova in utero foventia & vivos foetus parientia; *Vipera*.
  - Ovipara, id est, ova in fimetum aliumve calidum locum deponentia, ubi calore solis foventur & excluduntur; *Anguis*.
- Pedata,
  - Caudata, corpore
    - Squamoso
      - Terrestria; *Lacerta*.
      - Amphibia, colore
        - Cinereo; *Scincus*.
        - Vario, nigro & luteo; *Salamandra*.
      - Testa dura & robusta testō; *Testudo*.
    - Non caudata
      - Amphibia; *Rana*.
      - Terrestria; *Bufo*.

## I. De Serpente.

**S**erpens Offic. Schrod. Anguis Gesn. Natrix torquata Aldrov. Jons. Schlange. Usu. Adeps, Exuviae, Fel. Vires. Pinguedo emollit Strumas, oculorum rubedini & maculis medetur, visum acuit, podagricos dolores mitigat. Exuviae partum facilitare creduntur, ventri vel lumbis alligatae, odontalgiamque in gargarismis

mitigare; impetigines curant, alopeciis medentur ac pilos nasci faciunt. *Fel*, Ictibus Serpentum impositum, venenositatem in se allicit, idem, & de capite imposito affirmant. *Schrod.*

## II. De Vipera.

**Vipera** *Offic.* *Schrod.* *Aldrov.* *Gesn.* *Jons.* *Natter* / *Otter* / *Brand* / *Schlange.* *Usu.* *Caro.* *Vires.* Vim habet alexiteriam, sudoriferam, ususque præcipui est intrinsecus, in omnibus morbis venenatis ac malignis, quales sunt pestis, febris petechialis, lepra & similes: Quinimo & ad Phthysicos Gallicove morbo laborantes, pro secreto venditat *Cardanus.* Si scil. caro cocta comedatur, jus bibatur, pinguedoque spinæ & juncturis illinatur *Schrod.*

## III. De Lacerto.

**Lacertus** *Offic.* terrestris *Schrod.* *Vulgaris* *Jons.* *Aldrov.* *Gesn.* Terrestris vulgaris ventre nigro maculata *Mer.* *Pin.* *Ichtachs* / *oder* *Hagediß.* Degunt in cavernis terræ, ruderibus murorum, aliisque locis asperis. Commendatur præ reliquis genus Lacerti viride & magnum, verum cum in hisce regionibus minus usitatum id sit, Lacertum vulgarem hic describimus. *Vires.* Elicit è corporibus spicula, vitra, &c. (sectus vel cum sale tusus & impositus, imprimis v. caput,) capillos renasci facit, (cum adipe illita caro, vel cinis applicatus.) Ictui scorpionum succurrit, &c. *Schrod.*



## IV. De Scinco.

**S**Cincus Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Crocodilus terrestris Dioscorid. Minor Bellon. Erd: Crocodill. Animal est aquaticum squamis cinereis vestitum, cæcia à capite ad caudam decurrente linea insignitum. *Vires.* Alexipharmacus est, Veneremque accendit. Schrod. Ob id virtutem possidet alexipharmacam (inquit clarissimus *Ammannus*) recipitur in *Mithridatium*, ob aphrodisiasticam facultatem in *Electuarium Diasatyrium* & quidem quoad diversas partes: Nam in *Diasatyrium* venter & lumbi tantum expetuntur, hypothesei forsan isthac propter situm renum & spermaticorum vasorum: *Mithridatium* ventrem animalis tantum recipit. Unde colligas, (inquit *Hoffmannus*) diversas partes diversa posse. Imo cum *Dioscorides* carnes circa renes, *Galenus*, lib. II. *Simpl.* Renes ipsos Veneriendæ commendet: at verò *Plinius*, lib. 28. cap. 8. Rostrum & pedes: hæ & aliæ hypothesei de Scinco, rectè ab *Hoffmanno*, pag. 647. rejiciuntur, quem qui velit consulat.

## V. De Salamandra.

**A**Animal est, quadrupes ex Lacertorum genere, amphibium, nigrum, luteis maculis aspersum.

Salamandra Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Animal stellatum *Plin.* Lacerta venenaria *Ætio.* Moll / Olm / Salamander. *Vires.* Erodit, exulcerat, incinerata medetur felicissimè *Scrophulis exulceratis.* (Cinis inspersus) *Schrod.* Latius videri potest *Wurffbainii Salamandrologia Curiosa.*

## VI. De Testudine.

**A**nimal est amphibium, scutum testaceum ac robustum in dorso gerens.

1. Testudo marina Offic. Schrod. Gesn. Jons. See: Schild: Kröte. Usu. Crura, Fel, Sanguis, Priapus. Vires. Crura pro Periapto antipodagrico expertissimo adhibentur. Fel, oculis confert. Sanguis, in remediis internis pro antidoto adhibetur. Schrod. Priapus in morbis Nephriticis. v. Ligon de Insulâ Barbadenf. pag. 118.

2. Testudo terrestris Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Erd: Schild: Kröte. Usu. Sanguis. Vires. Ad Hecticam imperatur recens ac crudus, exiccatus ad Epilepsiam commendatur. Schrod.

## VII. De Bufone.

**B**ufo Offic. Schrod. Jons. Aldrov. Rana rubeta tum palustris, tum terrestris Gesn. Kröte, Easche. Usu. Bufones siccantur in aëre. Vires. Internè pulvere ejus hydropicorum aquas per urinam educi, desperatus quidam expertus est Hydropicus qui præter spem attentatæ necis sanitatem illo acquisivit. Extrinsecus imponitur Bufo, parte qua venter est, anthracibus (in aceto parum maceratus, ad eliciendum scilicet venenum, ingreditur itidem amuleta aëri contagioso arcendo dicata, Hæmorrhagiam narium certo experimento sistit.

Idem

Idem & cinis sive pulvis præstare perhibetur loco affecto inspersus, &c. Prolixius vide *Paulini Bufonem Curiosum*.

## VIII. De Rana.

1. **R**ana viridis *Offic.* minima & viridissima *Plin.* Ranunculus viridis *Schrod. Jons. Aldrov.* Viridis sive Dryopetes *Gesn.* Agredula *Isidor. Laub: Grosch. Usu.* Rana & Sanguis. *Vires.* Animal convenit viribus cum Rana aquatica, ejusque cinis vulneribus inspersus mirifice sanguinem cohibere dicitur. *Sanguis*, peculiariter pro Philtro commendatur. *Schrod.*

2. Rana *Offic.* aquatica *Schrod. Aldrov. Jons.* Aquatica vulgaris vel maculata *Mer. Pin. Wasser: Grosch.* Præfertur ex aquaticis, quæ in fluviis puris ac fontibus reperitur. *Usu.* Ipsæ Ranæ, Sperma. *Vires.* Ranæ ipse contra omnium serpentium venena *Dioscoridi* pro Antidoto sunt. Valent & adversus inveteratos tendinum rigores. Viva Anthraci pestilenti imposita, donec moriatur, venenum elicit. *Sperma*, refrigerat, constipat, incrassat, dolores mitigat, manuum scabiem curat, paronychias & herpes interficit, erisypelati & ambustis aliisque inflammationibus succurrit, Faciei ruborem curat, &c. *Schrod.*



## SECTIO QUARTA.

*De Quadrupedibus.*

**Q**uadrupedum notæ sunt, Cor duobus ventriculis instructum, pulmo solutus, cutis pilosa, terrestria vel saltem amphibia esse, & gressilia, denique vivipara, quod Cetaceo etiam Piscium generi commune est.

*Quadrupedia ab Aristotele, quem omnes ferè Historie Naturalis Scriptores secuti sunt, dividuntur, in 1. Solidipeda aut Solidungula. 2. Bisulca. 3. Fissipeda seu digitata.*

Ad hæc etiam referimus *Manati*, quod Animal est viviparum pilosum, pulmone respirans, cum duplici etiam in corde ventriculo, sed binis tantum pedibus instructum.

Quadrupeda sunt vel

Ungulata eaque vel

Solidipeda, auriculis

{ Minoribus, juba longiore; *Equus.*

{ Majoribus, juba non adeò promissa,

{ Mansuetum; *Asinus.*

{ Ferum; *Onager.*

Bisulca, seu unguâ bifidâ, quæ vel

Ruminantia, cornibus

{ Perpetuis

{ Æqualibus & minimè rugosis, papillis quatuor sibi mutuo proximis sub imo ventre, corpore

{ Majore, cute durissima, cornibus etiam magnis, crassis, intortis, & nigris; *Bubalus.*

{ Minore, cornibus albis, apicibus nigris; *Bos.*

{ Rugosis

a b c d

*Recurvis*

a b c d

Recurvis & in spiras convolutis, lanigeræ ;  
Ovis.

Reclioribus, non lanigeræ, suntque vel

Barbata, odore gravi & ingrato ; *Hircus.*

Imberbia, cornibus

Longis, rectis, prope caput annulatis ;

*Gazella Indica.*

Brevioribus, extremo aduncis seu ha-

matis ; *Rupicapra.*

Deciduis, iisque vel

Teretiformibus

Maximis, ramosissimis, ramis in acutos  
maucrones desinentibus ; *Cervus.*

Minoribus & brevibus, ramulis obtusis ;

*Capreolus.*

Palmatis, Animal ipso

Maximo & altissimo ; *Alce.*

Minore ; *Animal Bezoarticum Occidentale.*

Non Ruminantia, auriculis externis

Longioribus & angustioribus, rostro brevioribus,

Manfuetum ; *Porcus.*

Brevioribus & rotundioribus, rostro produ-

ctiore, ferum ; *Aper.*

Quadrifurca,

Majus, cum cornu rostro innascente ; *Rhinoceros.*

Minus, Cornu carens ; *Animal Moschiferum.*

Unguiculata, pede multifido, quæ sunt vel digitis

Indivisis, sibi invicem cohærentibus & communi

cutetectis, eorum tantum externis in margine

pedis extantibus, & unguibus obtusis munitis ;

*Elephas.*

Divisa, unguibus angustioribus, auriculis externis

Carentia, phytivora, amphibia :

Quadrupes duobus in superiore maxilla denti-  
bus insignioribus ; *Equus Marinus.*

Bipes ; *Manati.*

Prædita, dentibus primoribus incisioribus in utra-  
que maxilla, vel

- [ Binis insignioribus, hæc sunt Phytivora, quæ vel
  - [ Terrestria, Auriculis
    - [ Longis, cauda brevi, quæ subsultim incedunt
      - [ Troglodytes, quod fodiendo pedibus foramina sibi excavat; *Cuniculus*.
      - [ Foramina sibi non fodiens, sed in superficie terræ degens; *Lepus*.
    - [ Curtis, cauda longa,
      - [ Troglodytes, in hoc genere maximum; *Mus Alpinus*.
      - [ Foramina pedibus non excavans,
        - [ Majus; *Rattus domesticus*.
        - [ Minus: *Mus domesticus*.
  - [ Amphibia, cauda nuda, lata; *Castor*.
- [ Quaternis, carnivora, rostro
  - [ Brevis, capite rotundiore, cauda
    - [ Longa, pelle
      - [ Unciolore, seu maculis carente, in hoc genere maximum; *Leo*.
    - [ Maculosa,
      - [ Majus; *Pardus*.
      - [ Mediæ magnitudinis; *Lynx*.
      - [ Minus; *Felis, Catus*.
  - [ Brevis, pilis longis undique vestita; *Ursus*.
- [ Productiore, quæ vel
  - [ Terrestria, folliculis odoriferis
    - [ Carentia, cauda
      - [ Productiore, pilis
        - [ Densis & longis vestita, auriculis erectis,
          - [ Major; *Lupus*.
          - [ Minor; *Vulpes*.
        - [ Brevis & rarioribus; *Canis*.
      - [ Brevis, cruribus brevibus, pilo rigido longo; *Taxus*.
    - [ Prædita, cauda producta; *Animal Zibethicum*.
    - [ Amphibia; *Lutra*.



Pluribus aut incerto numero, rostro productio-

re, cute

Pilo molli tecta,

Majus, cauda brevi, cuniculos in terra sibi  
fodiens, oculis minimis; *Talpa.*

Minus, cauda longa; *Mus araneus.*

Spinis undique obsita; *Erinaceus.*

## *De Quadrupedibus Ungulatis.*

### *Quadrupeda Solidungula.*

#### *I. De Equo.*

**A** *B* *Asino* differt, magnitudine quâ eum excellit,  
auriculis minoribus, juba longiore, caudâ undi-  
que setis prælongis obsita. *R. Synop. Animal.*  
pag. 62.

*Equus. Offic. Schrod. Gesn. Aldrov. Jons.*  
*Pferd. Usu. Sanguis, Coagulum, Lac, Stercus,*  
*Lichen, Testes, Pinguedo, Ungulæ, Pili, Saliva,*  
*Dens, Lapis. Vires. Sanguis* admiscetur septi-  
cis ac causticis. *Coagulum, (Hippacen vocant)*  
privatim *Cœliacis Dysentericis*que convenit.  
*Lac* utile censetur *Epilepticis, Phthificis, Tuf-*  
*sientibus, Asthmaticis. Stercus,* extrinsecus san-  
guinis eruptiones cohibet, foetum mortuum,  
ac secundinas expellit. Internè propinatur in  
dolore colico, ac strangulatu uteri, in pleuriti-  
de, & similiter, in foetu mortuo & secundinis  
expellendis. *N. Præstat ex equo non castrato.*  
*Lichenes,* laudantur peculiariter ad uterinas suf-  
focationes, ut & ad morbum comitalem &  
cal-

calculus. *Testes*, ad secundinas pellendas remedium præsentissimum. Commendantur quoque in doloribus colicis. *Pinguedo*, illinitur commodè articulis luxatis. *Ungula*, partus mortuos exturbat, pediculos fugat. *Pili*, sanguinis fluxum reprimunt. *Saliva*, spuma oris triduo pota tussim sanat, fervorem faucium contundit. *Dentes*, primum nascentes dentitionem facilitare dicuntur. *Lapes* (*Hippolithus*) in ventriculo aut intestinis repertus, uti Lapidus Bezoar Occidentali, figurâ & laminea structura non dissimilis est, ita & viribus eundem æmulari statuitur, *Schrod.*

## II. De Asino.

**A** Nimal est Equo minus, ignavius, tardius, stupidius, auriculis longioribus, jubâ non adeò promissâ, cauda longiore, in extremo tantùm setosâ: frigoris minus patiens. R. Synop. Animal. p. 63.

Asinus Offic. *Schrod.* Gesn. *Aldrov.* Jous. Esel. *Ufu.* Ungula, Sanguis, Lac, Urina, Stercus. *Vires.* Ungula, in Morbo comitiali ungulæ Alcis vicaria censetur. Extrinsecus commendatur cinis ad discutiendas strumas & sanandos perniones, ad rimas cutis consolidandas; apostemata discutienda, pterygium oculorum tollendum, ad foetum mortuum eliminandum, ad Epilepticas & Hystericas excitandas. *Sanguis*, sudorem ciet; Pulli asini sanguis Icterus curat. *Lac*, nutrit, abstergit fortiter; hinc utile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis doloribus,

ribus, laxat nimirum alvum, abstergit vias urinarias, ciet menses. Extrinsecus adhibitum, stabilis gingivas, compescit dolores podagricos, faciei que gratum conciliat pallorem. *Urina*, medetur peculiariter morbis renum (inquit *Dioscorides*) tum & scabiei, verrucis & callis, membrorum atrophie & paralyfi, podagricisque doloribus, &c. *Stercus*, sanguinem sistit. *Schrod.* Prolixius agit *Paullini in Onographia Cariosa*.

### III. De Mulo.

**M**ulus *Offic.* *Schrod.* *Gesn.* *Jons.* *Maul.* *Esel.*  
Non est certa & constans Animalis species, sed hybrida & spuria, ab Asino Equam ineunte genita. *R. Synop. Animal. p. 64.* *Ufu.* *Ungula*, *Urina*, *stercus*. *Vires.* *Ungula* sufficit menses nimium fluentes sistit, *Cinis* potus steriles reddit; illitus alopecie subvenit. *Urina* cum luto suo pedum clavos curat. *Stercus*, *Mensium* fluorem sistit, & *Dysenterie* opitulatur, *dolori Lienis* subvenit. *Schrod.*

### IV. De Onagro.

**O**nager *Offic.* *Aldrov.* *Gesn.* *Jons.* *Bald.* *Esel.*  
Sunt qui ab Asino domestico non aliter differre existimant, quam ut ferum & sylvestrem à cicuri & mansueto: alii pro diversa specie habent. In Usus medicum non venit, eorum autem pelles apud Mechanicos *Chagrin* vocantur.  
*Quadrup.*



*Quadrupeda bisulca.**V. De Bove.*

**A** Reliquis hujus generis differt magnitudine, cornibus equalibus & minime rugosis, paleari sub collo dependente, papillis quatuor sibi mutuò proximis sub imo ventre. R. Synop. Animal. p. 70.

Bos Offic. Schrod. Mas *Taurus* Stier dicitur, fœmina *Vacca* Kuh. Fœtus *Vitulus* Kalb. Animal est vulgo notissimum *Usu*. Cornu, Fel, Jecur, Splen, Sanguis, Medulla, Sevum, Axungia seu oleum ex pedibus, Ungulæ, Urina, Stercus, Lapilli, Lac, Butyrum, Caseus, Priapus, Offa. *Vires*. Cornu rari usus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam; adhibetur quoque in suffitu, ad aërem contagiosum corrigendum. Fel bubulum præstat fere omnium quadrupedum fellibus; specificè aurium medetur fusurro, ac dolori, alvum movet. (Lumbricos necat.) Jecur rari usus est, ejus loco vituli epar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi ferè solet. Splen, inservit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie, mensiumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt. Sanguis, intrinsecus singularem opem fert dysentericis, mensium & internis hæmorrhagiis. Extrinsecus discutit & emolli tumores, faciem extergit. Medulla vitulina post cervinam locum primum bonitatis obtinet, vim habet indurata &

Scir.

Scirrhusa corpora emolliendi, sive musculus, sive tendinibus, sive ligamentis, sive etiam visceribus ipsis durities acciderit. Quin pessi quoque inde confiunt, uterum emollientes. Bovinum proximum bonitatis locum habet: præterque vires generales trementia membra reficit, nervis induratis confert. *Sevum*, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mortificationem intestinorum & Tenesinum, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis affectibus medetur. *Oleum ex pedibus*, usitata vulgò est in molliendis tumoribus, leniendis doloribus, luxationeque articulorum. *Ungula*, adhiberi solent in suffumigio ad arcendum aërem malignum. *Urina*, aurium dolores lenit. *Stercus Vaccinum*, refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat, &c. *Vitulinum*, Erysipelati convenit. *Lapillus ex ventriculo exectus* medetur Ictericæ, specificè comminuit ac consumit calculum. *Lapillus fellis* in pulverem reductus errhinum exhibet egregium. *Lac Vaccinum*, crassum est, nutrit benè, Renum & Vesicæ dolori convenit, diarrhœæ, dysentericæ, tenesmo, erosionique intestinorum succurrit. *Butyrum*, calefacit moderatè, emollit, digerit, lenit, resolvit, laxat, oculorum hebetudini prodest. *Caseus*, recens mollis podagricorum dolores lenit, Epatis æstum mitigat, Exomphalo infantum succurrit. *Priapus Tauri* dysentericis prodest. *Ossa*, ad corroboranda viscera, & ad arcendam Epilepsiam à nonnullis adhibentur. *Schrod.*

## VI. De Bubalo.

**B**ove domestico major est, corpore crassiore, cute durissima, cornibus magnis seu crassis, intortis & nigris. R. Synop. Animal. p. 72.

Bubalus Offic. Schrod. Italis Bufalo R. Synop. Animal. Buffelus Aldrov. Bellon. Jons. Buffel. Ussu. Cornua & Ungulae, Sevum, Stercus, &c. Vires. Cornua & Ungulae medentur spasma. Sevum, Stercus, &c. eisdem cum Bovino pollet, Schrod.

Veterum Bubalum esse hoc Animal Historiae Quadrupedum conditores negant; sed potius Bovem illum sylvestrem Indicum, Aristoteli sine nomine descriptum & Arachotis adscriptum Hist. 2. cap. 1. Nobis tamen (inquit doctissimus & clarissimus Raius) verisimile videtur Bubali nomen una cum Animali ipso in Italiam migrasse: proinde loco suo natali qui India est, aut Asia, Bubalum fuisse dictum. R. Synop. Animal. Bovem Africanum pro Bubalo veterum habet Bellonius Obs. lib. 2. cap. 50.

## VII. De Ove.

**O**vis Animal est lanigerum, rostro quam Bos angustiore; cornibus rugosis, recurvis, & in spiras convolutis, papillis binis. R. Synop. Animal. p. 73.

Ovis Offic. Schrod. Jons. domestica cujus mas Aries dicitur, foetus Agnus R. Synop. Animal. Schaaff. Ussu. Cerebrum, Fel, Oesypus, Lana succida, Sevum, Pulmones, Omentum, Stercus, Urina, Vesica, Caput & Pedes, Ossa incin-



*cinerata*, *Coagulum*, *Vires*. *Cerebrum Arietis* prodesse ajunt in somno immoderato arcendo, in morbis Epidemiis. Facilitat dentitionem. *Fel*, solvit alvum, carcinoma exterius sanat, auribus purulentis auxilio est. *Fel agni* ad morbum comitiale exhibetur. *Oesypus*, emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat, luxatis, contusis, & similibus convenit. *Lana*, Anginæ, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert. *Lana succida* calefacit, emollit, lenit, viribusque cum *Oesypo* convenit. *Sevum*, datum ex vino rubro, sanguinem sistit, diarrhœam, dysenteriam, & tormina ventris curat. *Pulmones* capiti impositi dolores & æstus mitigant, ferocesque spiritus sopiunt. Hinc usus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c. *Omentum* calidum colico medetur dolori. *Stercus*, vim habet refrigerandi, exiccandi, aperienti, discutiendi. Hinc maxime usus in aurigine, &c. Extrinsecus convenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tumoribus cutaneis, &c. Maximi itidem solaminis est in ambustis. *Urina* sumpta, aquam intercutem abigit. *Vesica*, cremata & exhibita, iis qui urinam inviti reddunt, succurrit. *Caput & Pedes Vervecis* in Aqua fluente optime decocta, atrophix & contracturæ subveniunt. *Ossa cinerata* agni, consolidationem vulnerum, etiam eorum, quæ difficilioris sunt consolidationis, promovent. *Coagulum*, valet ad venena, ad lac coagulatum, ad morsus venenatos. *Schrod.*

VIII. *Caprinum Genus.*

**A**B Ove differt, quòd pilis non lana vestiatur, cornua rectiora nec adeò contorta obtineat. R. Synops. Animal. p. 77.

1. Caper Offic. Schrod. mas Hircus dicitur, foemina Capra, foetus Hoedus. Aldrov. Gesn. Jons. Capra domestica R. Synop. Animal. Ziege / Geiß. Locis arduis gaudet. Ufu, Sanguis, Medulla, Sevum, Lac, Serum lactis, Lapilli, Stercus, Urina, Vesica, Omentum, Pellis, Fel. Vires. Sanguis hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis convenit, sanguinem concretum resolvit, calculum atterit. Medulla hircina acrior est ac siccior reliquis, ideoque & efficacior. Sevum hircinum validissimè discutit, podagricis auxiliatur, stranguriam tollit, hæmorrhoidum dolores lenit. Lac caprinum nutrit, abstergit, feбри hectica laborantibus & Phthisicis, consumptisque ac emaciatis optimè convenit. Serum ejus præstat reliquis seris aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc frequentè usu ad infusiones: purgandæ Melancholiæ recipitur. Lapilli in ventriculis & felle reperti commendantur vi diaphoretica & resolutiva. Stercus, calefacit, siccit, abstergit, digerit, aperit, acrisque est facultatis. Hinc usus præcipue in duris tumoribus; Lienis & aliarum partium in parotidibus, ac bubonibus, in ulceribus desperatis consolidandis, in Hydrope, in coxendicum dolore; ustum tenuioris est substantiæ, congruitque ad omnia vitia, quæ extergi volunt.

lunt, ut ad Alopecias, Lichenas, &c. Intrinsecus convenit Spleneticis, exhibetur itidem in Ictero, menstruis retentis & morbis similibus. *Urina* hirci commendatur præ reliquis omnibus urinis ad calculi attritionem, urinæque expulsionem. Hinc convenit in Hydrope, &c. *Vesica* urinaria exiccata ac pulverisata urinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur. *Omentum* calidè impositum mitigat feros & ebullientes spiritus; hinc prodest in doloribus Colicis, in Mania, &c. *Pellis* sedat diarrhœam, sistit Hæmorrhagias, & præcipuè narium. *Fel*, febrim quotidianam curat. *Schrod.*

2. Capra alpina *Offic.* alpina sive Rupicapra *Schrod.* Rupicapra *Aldrov. Gejn. Bellon. Jons. Diosc.* Caprea *Varron. Gembß.* In Alpibus Helveticis, &c. frequens. Caprarum genus sylvestre est, magnitudine ac figura domesticis conforme, cornibus brevibus extremo aduncis seu hamatis. *Usu.* Sanguis, Sevum, Jecur, Fel, Stercus, Lapis Ægagropila dictus. in ventriculo repertus; Magnitudine varia & maxima ad juglandis magnitudinem accedente, ex triplici substantia quasi compositus: quarum interior germina, aut fibras radicum, aut filamenta aut cauliculos plantarum, succo concreto, compacta refert. Exterior coriaceam cutem, interdum tamen lignosum corticem quendam, coloris aut cinericei, aut nigri, ponderis levissimi. *Vires.* Sanguis recens vertiginis est medela. *Sevum*, Phthisi exulcerationique pulmonum succurrit. *Jecur*, alvi fluxum



sistit. *Fel*, oculorum nubeculæ, nyctalopiæque auxilio est. *Stercus*, calculum atterit & expellit. *Ægagropila*, hujus vires experientia docuit insignes ad febres malignas, venena, pestem, & simil. Unde alii *Bezoar Germanicum* vocant. *Schrod.* Laudantur potissimum in partu difficili, & in omnibus ferè morbis malignis. *Ammannus*. Qui plura de *Ægagropilis* velit consulat *Georgium Velschium*.

3. Capri-Cerva Orientalis, è qua Lapis Bezoar Orientalis *Schrod.* *Gazella Indica* cornibus rectis longissimis nigris, prope caput tantum annulatis. *R. Synop. Animal. p. 70.* *Capra* sive *Hircus Bezoarticus Jons.* *Indica Amat. Montana Manard.* *Sylvestris Lacun.* Animal est in Persia & India Orientali degens. *Ufu.* Lapis in ventriculo repertus, Bezoar Orientalis dictus, figurâ scil. variante Ovali, rotunda, sessili & intus interdum cava, superficie lævi & splendente: substantia è laminis instar cæparum sibi invicem incumbentibus compacta: variante etiam colore, plerumque sunt atrovirente, hinc dilutius virente, pallescente, &c. odore nullo: Magnitudine & pondere varians. Frequenter adulteratur, notas ergo bonitatis ab Authoribus passim notatas apud *Schroderum* vide sis, quo lectorem remitto. *Vires.* Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lipothymia, Palpitatione Cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermificatione, Calculo, Mensibus obstructis, partu

partu difficili, Melancholia. Præcipuè autem in Peste, febribus malignis, venenis assumptis, &c. *Schrod. Vid Baubinum de Lap. Bezoar.*

### *IX. De Cervino genere.*

**C**ervinum genus cornibus quotannis deciduis, solidis, ramosis ab aliis Ruminantibus cornigeris abundè distinguitur, ut alijs notas conquirere non sit opus. *R. Synop. Animal. p. 84.*

**I. Cervus** *Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R. Synop. Animal. Spirsch.* In Vivariis passim nutritur. *Ussu.* Cornu, Os de Corde est arteriarum in basi cordis concursus, inquit *Schroderus*, qui cum ætate & imprimis turgescentiæ tempore durior fit, & in Os degenerat; Priapus, Testiculi, Sanguis, Lachrymæ, Medulla, Serum, Astragalus & Lapis. *Vires.* Cornu crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc usus ejus proficuus in variolis, morbillis, febribus putridis & malignis aliisque morbis ubi sudore opus est. *Os cordis*, peculiariter cordi convenit, idque à malignitate tuetur, custodit partum, & prægnantibus mirè conducit. *Priapus* diureticus est, Venerem stimulat, dysentericis, colique dolore correptis auxiliatur. *Testiculi*, concubitus cum voluptate excitant. *Sanguis*, dysenterias & cœliacorum profluvia sistit; est & efficax contra toxica, commendatur ad dolores coxendicis & lateris. *Lachrymæ* siccant, adstringunt, corroborant, sudorem cient, ideoque adversus venena, mor-

bosque contagiosos quàm summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicantur. Profunt quoque in difficultate partus, adeò ut earum vis nuper adhuc sit comperta in mortuo etiam foetu expellendo. *Medulla*, ferè omnium laudatissima est, præstat quoque præ reliquis in ulceribus malignis, &c. *Serum*, commendatur præ aliis in tumoribus molliendis, vulneribus astringendis: perniones persanat, dolores sedat. *Astragalus*, utilis est Dysentericis. *Lapis* in ventriculo repertus cum Lapide Bezoar viribus suis convenire dicitur. *Schrod.* Prolixius agit *Job. Andr. Graba* in descriptione *Cervi*, quem vid. An Ossa, quæ in Officinis pro ossibus Cordis Cervi venduntur semper sint genuina, inter Authores magna est dissensio, nec immerito inquirendum est, quia in bobus etiam reperiuntur. *Plempius* pleraque ossa Cordis Cervi putat esse ossa Hyoidea: Figura enim iisdem ferè eadem est.

2. *Capreolus Offic. Schrod. Aldrov. Jons.* *Caprea Plin.* *Cervulus sylvestris septentrionalis nostras. R. Synop. Animal. p. 89. Rehbock. Usu.* Coagulum. Jecur, Fel, Stercus. *Vires.* Coagulum Diarrhœæ & Dysenterix convenit. Jecur, oculorum aciem reficere creditur, sanguinis hæmorrhagiam & præcipuè narium sistit. Fel, maculas faciei abstergit, oculorum albugines & nubeculas, aliosque affectus curat, aurium tinnitus reprimit, odontalgiam mitigat. *Stercus* Icterus solvit. *Schrod.*



3. *Animal Bezoarticum Occidentale Offic.*  
*Capri-Cerva Occidentalis Schrod. Vicuniras,*  
*five Toraguas Acoft. Cuguacu Pis. Margg.*  
*Teuhtlamacame Hern. Bezoar Thier. Animal*  
*est Peruanum. Ufu. Lapis in Ventriculo reper-*  
*tus Bezoar Occidentalis dictus, substantia est*  
*lapidea, quam Bezoar Orientalis fragilior, &*  
*laxior, foris scabra, & minus levi, colore cine-*  
*riceo, albo nigro, obscuréve virente, tunicata,*  
*forma rotunda, magnitudine variâ, res hete-*  
*rogeneas in medio continens. Vires. Iisdem vi-*  
*ribus celebris est cum Orientali, cujus tamen*  
*bonitati non parum cedit, &c. Schrod.*

4. *Alces Offic. Schrod. Aldrov. Gefn. R. Synop.*  
*Animal. Jons. Elend. Animal est gregarium bi-*  
*fulcum, cornibus palmatis, in hoc genere ma-*  
*ximum. Ufu. Ungula, Nervi. Vires. Ungula*  
*specifica virtute celebratur adversus Epilepsi-*  
*am, tum præcavendo, tum curando, idque usu*  
*tam interno quàm externo. Internè propina-*  
*tur Scobs. Externè includitur particula an-*  
*nulo gestaturque digito, qui minimo proximus*  
*est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno,*  
*applicatur pulsui, immittitur in aurem fini-*  
*stram, suspenditur de collo ut cutim attingat.*  
*Nervi, Circumlignantur membris spasmo ob-*  
*noxiiis. Schrod.*

## *X. De Porco.*

*PORCINUM genus sunt Quadrupeda bisulca, non rumi-*  
*nantia, pilis rigidis, rostro oblongo, in planum*  
*rotundum terminato, in quo nares, papillis plurimis,*  
*multipara.*

1. *Porcus Offic. domesticus* sive *Sus R. Synop. Animal. p. 92. Sus Aldrov. Gesn. Jons. Schwein / Sau. Ufu. Axungia, Fel, Stercus, Pulmo, Astragalus, Vesica. Vires. Axungia* calefacit minus, idque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articulorum sedat. *Fel* suillum contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno successu adhiberi scribit *Dioscorides*. *Pilorum* proventum impedit. *Stercus*, emollit, discutit, hinc prodest in prurigine, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, Ictibus medetur animalium venenatorum, Hæmorrhagiam narium sistit. *Pulmo* mirificè prodest impositus attritui à calceamentis contractio. *Astragalus*, commendatur ad fracturas ossium, ut & ad coli capitifque dolores. *Vesica* juvat eos qui inviti lotium reddunt. *Schrod.* Eadem præstat pubi imposita. Urinam ciere fertur. *Plin.*

2. *Aper Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Sus agrestis*, sive *Aper R. Synop. Animal. p. 96. Wild Schwein / Eber. Ufu. Adeps, Dens, Priapus, Fel, Stercus, Urina. Vires. Adeps* ut domestico cognatus est, ita & vires communes obtinet sed fortiores. *Dens* specificè in pleuritide exhibetur: *Cynanchen* curat. *Priapus* & *Testiculi* ad Veneris impotentiam ac proliferationem faciunt. *Fel* Strumas discutit. *Stercus* aridum rejectiones sanguinis sistere creditur, id quod etiam præstat extrinsecus ad motum. *Urina* comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit, *Schrod.*

## Quadrupeda Quadrifulca.

**A** Nimalia quæ Quadrifulca appellamus, quatuor habent ungulas antrorsum sitas; saltem exteriores duas ad latus mediarum, velut in eadem peripheria circulari, non retro tantopere ab anterioribus remotas & reducias ut in Bisulcis, nec reliquis tanto minores. R. Synop. Animal. p. 121.

## XI. De Rhinocerote.

**M** Agnitudine Elephanti æmula, cruribus tamen brevioribus, ut minus conspicuum sit animal; uno in ætare cornu, ab aliis omnibus Quadrupedibus abundè distinguitur. R. Synop. Animal. p. 122.

Rhinoceros Offic. Schrod. Alarov. Joss. Abada siye Rhinoceros Bont. Rhinocer. Ussu. Cornu nigrum, fissile, cubitum longum, pyramidale, bubali cornu forma sua repræsentans, solidum sine cavitate. Vires. Commendatur ad venena, contagia, aliosque affectus sudore opus habentes ideoque loco unicornu in hujus defectu esse poterit. Schrod. Quamvis Authores varia Animalium Quadrupedum Monocerotum genera describant; nostra tamen sententia omnia præter Rhinocerotem fictitia sunt, qui solus inter Quadrupeda Monoceros est, & fortasse Veterum ille cujus cornu Ælianus nigrum esse affirmat. Quin & Schroderus alique cornu Monocerotis vires Rhinocerotis cornu attribuunt.



## XII. De Animalī Moschifero.

**A** Nimal Moschiferum Offic. R. Synop. Animal. p. 127. Moschius sive Moschi Capreolus. Schrod. Capra Moschus Aldrov. Jons. Bisama Thier. Neque è Caprino, neque è Cervino genere esse videtur. Usus. Moschus Offic. Bisam. Est substantia grumosa, pinguis & unctiosa, sanguini congrumato similis ex ferrugineo nigricans, saporis subacris, & subamaricantis, odoris fragrantis & grati, collecta ex folliculis prope umbilicum sitis. Vires. Calefacit, siccatur, attenuat, discutit, cordialis est, & alexipharmacus, hinc & cephalicus. Usus præcipui in omnibus affectionibus, cordis palpitatione, Spiritus nimirum vitales fovet, suscitatur, recreatur. Hinc in affectionibus capitis & nervorum, à frigore & crassis humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c. Externè detergit tenues oculorum albugines, & humiditas defluxiones exiccatur, & Venerem concitat, auditum imminutum restituit. Schrod. Moschi ortus seu generatio controversias non leves inter Authores excitavit, aliis hoc, aliis aliud affirmantibus. Nonnulli eum humorem purulentum excrementitium esse volunt, concoctum, & in folliculum prope Animalis umbilicum collectum, Animal autem inquit æstu venereo turgens & lasciviens, ventrem petris aut arboribus affricando folliculum dilacerat, & humori prædicto exitum præbet, qui aere & sole coagulatus in hujusmodi corpus concrevit, Alii Moschum

Moschum non dilaceratione aliqua è folliculo e-  
mitti contendunt, sed per proprium meatum  
excrètorium sponte effluere. Alii affirmant  
Moschum folliculos duntaxat esse ex Animalibus  
occisis exsectos: quorum opinionem Mercatores  
nostri confirmant, qui folliculo suo naturali  
contentum plerumque emunt. Alii sanguinem  
extravasatum, & in Apostemata collectum  
tumoribus & abscessibus Animal tunden-  
do excitatis, esse credunt, locis contusis, liga-  
mento quasi in folliculos constrictis, & excisis.  
Alii denique omnes Animalis partes Moschum  
præbere opinantur. Nobis Moschus sanguis  
excrementitius esse videtur, varias coctiones  
& alterationes in proprio suo folliculo passus,  
& vel naturâ secretus & humanâ industriâ  
collectus, vel in Animalis idonea tempestate  
occisi, folliculo abscisso contentus. At versipelles  
Mercatores ex sanguine, pellibus, aliisque  
Animalis exuviis Moscho additis, marsupia,  
quæ pellis Animalis subministrat interciunt ac  
tanquam vera & genuina venditant. Fucus  
tamen non latet peritiores. Si enim adustum  
evaporat, verum esse creditur, quòd si carbonis  
ad instar quidpiam adustum remaneat, adul-  
terato actu contaminatum est. Qui plura de  
Moscho velit, consulat *Schrockii Historiam  
Moschi.*

## De Quadrupedibus Unguiculatis.

### XIII. De Elephanto.

**E**lephas Offic. Schrod. R. Synop. Animal. pag. 191. Aldrov. Gesn. Jons. Elephant. Usus. Dentes bini, è maxilla superiore egressi intus albæ, extus fuscæ. Ebur Offic. Elfenbein dicti. Vires. Ebur refrigerat & siccatur, moderate adstringit, incidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit. Ictero convenit, lumbricos fugat, diuturnis obstructionibus confert, stomachi dolores & imbecillitatem abigit, Epilepsiæ medetur, melancholiam arcet, putredini ac venenis resistit. Schrod. NB. Eburustum Spodium in Officinis dicitur, & ad differentiam Spodii mineralis, Spodium ex Ebo-re vocatur.

*Quadrupeda vivipara amphibia, auriculis externis carentia.*

### XIV. De Equo Marino.

**A**nimal est amphibium magnum, auriculis externis carens, duobus dentibus magnis & recurvis prædium.

Equus marinus Offic. Marinus & Hippopotamus falso dictus R. Synop. Animal p. 191. Ros maris Jons. Wall-Ros. Usus. Priapus osseus est & rotundus cubitum & amplius longus, cras-



crassus, ponderosus & solidus, in fine prope glandem longè crassior & rotundior. *Dentes*, magni, longi ac crassi, ponderosi, concavi, colore albo. *Vires*. Priapi hujus pulvis ad bellendum calculum in usu est. *Dentes*, usus & pretium ebori comparatur, ex quibus varia conficiunt, ut annulos ad Spasmodum, manubria cultrorum, &c.

### *XV. De Manati.*

*Animal est amphibium, magnum, bipes, auriculis externis carens, phytivorum.*

*Manati Offic. Schrod. Clus. Hern. Jons. seu Vacca marina R. Synop. Animal. p. 193. Ges. Ruh. Usu.* Os crustaceum, album, Ebori simile, ex capite exemptum, idque variforme. *Vires.* Summè commendatur ad calculos renum & vesicæ comminuendos, dolores nephriticos ac colicos sedandos. *Schrod.*

---

*Quadrupeda vivipara pede multifido herbivora binis prælongis dentibus anterioribus in utraque maxilla.*

### *XVI. De Lepore.*

*Lepus Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Nase. Usu.* Cinis, Caput, Oculus, Sanguis, Pulmo, Cerebrum, Cor, Jecur, Fel, Renes, Testiculi, Uterus, Coagulum, Astragalus, Adeps, Stercus, Pili. *Vires.* Cinis fit ex lepore integro combusto, vel ex pelle to-

le tota, ad nigredinem cinereumve colorem incinerata. Præstantissimum medicamentum est in calculo. Alopeciiis item & Pernionibus extrinsecus medetur. *Caput*, Alopecie subvenit, dentes dealbat. *Oculi* valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam. *Sanguis* cutis vitia in facie, ut lentigines, vitiliginemque sanat; Dysenterias & Cæliacorum profluvia sistit, calculum comminuit. *Pulmo* suspiriosos juvat, Epilepsiam curare dicitur. *Perniones* sanat. *Cerebrum* gingivis infantum affricatum dentitionem faciliat, tremores artuum emendat. *Cor* dicitur itidem Epilepsiam curare, dolores uterinos arcere; Quartanæ peculiariter mederi. *Jecur* fluxum sedat alvi. *Jecinorosisque* opem fert. *Fel Ophthalmicum* & *Otalgicum* insigne exhibet. *Renes* & *Testiculi* calculosis propinquantur, conceptum juvant, mictionem involuntariam corrigunt, Vesicæ morbis subveniunt. *Uterus*, itidem conceptionem promovet. *Coagulum* sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet, Epilepsiam arcet, &c. *Astragalus* commendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusque enixionem. *Adeps* extrinsecus applicata, maxime si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, ut vel Spicula cuti infixæ eliciat; insuper abscessus rumpit, dolori dentium medetur. *Stercus*, calculosis prodesse dicitur, Dysentericæ convenit, ambustis medetur. *Pili*, Linimentis sanguinem sistentibus miscentur. *Schrod.* Latius hæc deducit *Paullini* in sua *Lagographia Curiosa*.

## XVII. De Cuniculo.

**Q**Uoad figuram corporis externam in omnibus ferè cum Lepore convenit, magnitudine excepta quæ illi cedit; carnis tamen colore albo ab eo differt, & proprietate foramina in terra effodiendi. R. Synop. Animal. p. 205.

Cuniculus Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Runiglein / Raninichen. Integer uetus, Axungia, Cerebrum. Vires. Cuniculus exustus medetur Anginæ sive faucium inflammationibus. Axungia articulis & nervis induratis utilis est. Cerebrum venenis resistere creditur, alioquin leporinæ correspondens. Schrod.

## XVIII. De Castore.

**A**Nimal est amphibium, cauda nuda lata, Oculis parvis subnigris, Auriculis externis minutis, brevibus, rotundis.

Castor Offic. Schrod. Jons. sive Fiber R. Synop. Animal. p. 209. Bieber. Utriusque Indiæ indigena est. Usu. Axungia, Glandulæ odoratæ (qui Castoreum vocantur,) oblongæ, rotundæ, crassæ, ovi magnitudine, natæ in inguinibus sub testiculis pellicula crassa vestitæ, liquore oleoso & ceroso impletæ, tractu temporis seipsum exsiccante, saporis acris, amaricantis, nauseosi, odoris gravis & fragrantis. Præferuntur quæ ex Russia adferuntur. Pellis. Vires. Axungia peculiariter nervoso generi ac utero convenit, adeoque morbo comitiali, membris resolutis, convulsis, apoplexiæ, &c. Castoreum calefacit, siccatur, attenuat, aperit, flatum discutit,



tit, nervos nervosasque partes, adeoque caput roborat, spiritus animales torpidos excitat, venenis resistit, sternutationem ciet, anodynum est, menses promovet. Hinc proficuum est in Lethargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, artuum tremore, defluxionibus ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico, idque usu tum externo, tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit, dentiumque dolori succurrit. Opii virulentiam corrigit. *Pellis* opem fert Podagricis & Paralyticis. *Schrod.* Vid. quoque *Marü Castoreologiam Curiosam* à *Job. Franco* editam.

Quid sit *Castoreum*, ab extraneis nationibus vix sciri potest, inquit *Blancardus*, quia Mercatores nostri illud emunt à nationibus, quæ illud iterum ab aliis habent. Inter eruditos quoque magna est controversia, alii enim Testiculos, alii glandulas odoriferas esse affirmant. Anatomia detexit non esse Testiculos, qui gallorum testes vix superant, sed glandulas duas, quæ tam in maribus quàm in foeminis, utrinque in inguinibus, statim sub cute, ovorum gallinaceorum magnitudine, & sæpe majores conspiciuntur, ex quibus liquor oleosus & graveolens emanat, quem Animal lingua lambit.

### XIX. De Mure Alpino.

**M**US Alpinus *Offic. Schrod. Plin. Aldrov. Gesn. Jons.* Alpinus *Plinii* Marmota *Italidis R. Synop. Animal.* p. 221. Marmota *Hermol. Marmelsthier.* In altissimis Alpium degit. *Usu. Adeps. Vires.*  
Com:

Commendatur ad genus nervosum & articulos contractos rigidos, &c. *Schrod.*

## XX. De Mure.

*A*uriculis erectis tenuibus, cauda longissima raris pilis obsita à reliquis differt.

1. Mus major *Offic. Schrod.* domesticus major sive Rattus *R. Synop. Animal. p. 217. Kaze. Usu. Stercus. Vires.* Stercora murium majorum novem numero deglutita mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum, quo mensibus obstructis succurrere moliantur. *Plater.*

2. Mus *Offic. domesticus Schrod.* Domesticus vulgaris seu minor *R. Synop. Animal. p. 218. Haus. Maus. Usu.* Mus ipse, *Stercus. Vires.* Mus vivus dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat ictus scorpionum, extrahit venenum. Cinis mictioni involuntariæ sive nocturnæ medetur, alopeciæ succurrit, tussi convulsivæ medetur. *Stercus* movet alvum infantum, inservit Clysteribus, alopeciæ succurrit, furfuresque capitis abstergit, Calculos renum & Vesicæ atterit: Condylomata, omnisque generis verrucas, ficus, mariscas, &c. ani tollit. *Schrod.*

*Quadrupeda vivipara unguiculata mult-  
tífida, carnivora, capite breviorē seu  
Genus Felinum.*

**H**oc genus Ferarum, Felinum voco ob similitudi-  
nem cum Fele Animali domestico & notissimo.  
R. Synop. Animal. p. 162.

### XXI. De Leone.

**A**nimal est fortissimum, generosissimum, & ferarum  
princeps, capite crasso, fronte quadrata. R. Synop.  
Animal.

Leo Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Löwe. Usus  
Adeps. Vires. Ductu Dioscoridis lotus, au-  
rium dolores immixtus sistit, & membris à fri-  
gore adustis felici successu illinitur. Eodem qui-  
dam in scirrhis & pernionibus utuntur. Jons.

### XXII. De Pardo.

**P**ardus Offic. Jons. Pardalis R. Synop. Animal.  
p. 166. Panthera quibusdam. Leopard / Pan-  
ther. Thier. Usus. Adeps. Vires. Inter præ-  
stantissima Cosmetica censetur. Jons.

### XXIII. De Lynce.

**L**ynx Offic. Schrod. Jons. Lupus cervarius  
nonnullis. Luchs / Zieger / Wolff. Usus. Axungia,  
Unguis. Vires. Axungia convenit arti-  
culis resolutis, convulsis, luxatis. Unguis ar-  
gento & auro includitur, gestaturque adversus  
morbum Comitialem & Spasmodum, loco amu-  
leti. Schrod.

### XXIV. De



## XXIV. De Cato seu Fele.

**F**elis & Catus Offic. Catus domesticus & sylvestris Schrod. Felis Aldrov. Jons. Rake. Ufu. Axungia, Sanguis, Caput, Stercus, Pellis, Secundina. Vires. Axungia Cati sylvestris calefacit, emollit, discutit, mirificè articulorum affectibus prodest. Sanguis Herpetem curat. Caput Cati nigri incineratum ad oculorum vitia, unguem, nubeculam, albuginem, &c. remedium præstantissimum est. Stercus, alopecias curat, & podagricos juvat. Pellis gestatur ad calefaciendum ventriculum, articulosque contractos. Secundinam de collo suspendunt ad oculorum affectus arcendos. Schrod.

## XXV. De Urso.

**U**rsus Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R. Synop. Animal p. 171. Bâv. Ufu. Pinguedo, Fel. Vires. Pinguedo calefacit, resolvit, emollit, discutit, &c. Ufus præcipui in alopecia, medetur doloribus Arthriticis, parotidibus, tumoribusque aliis, ulcera crurum tibiæque sanat. Fel, commendatur intrinsecus ad morbum comitalem, ad asthma, & icterum. Extrinsecus ad ulcera cancrosa ac serpentia, ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c. Schrod.

*Quadrupeda vivipara unguiculata multifida carnivora, capite longiore, seu Caninum Genus.*

**H**æc genera animalium non tantum rostro productiore à præcedentibus differunt, sed quod plus est, Dentium numero & situ, summa quadraginta habent, Claviculis insuper carent, & ossicula in pene habent; quæ notæ ad distinctionem sufficiunt. R. Synop. Animal. p. 173.

*XXVI. De Lupo.*

**H**uius generis Animal maximum est & ferocissimum Cani persimile. R. Synop. Animal p. 173.

Lupus Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. Wolff. Ufu. Dentes, Cor, Hepar, Intestina, Axungia, Ossa, Stercus, Pellis. *Viros*. Dentes, argento inclusi infantulis familiares sunt, quibus gingivas scilicet fricant, dentibusque erupturis patefcere faciunt. Cor comitialibus prodesse fertur. Hepar Epatis vitiiis confert, ideoque & Hydropicis ac Emaciatis, nec non & Tussientibus. Intestina imprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio. Axungia non vilioris virtutis est quàm canina: Calefacit, digerit, articularibus morbis medetur, oculorum lippitudini confert. Ossa ad morbum intercostalem, ut & ad ictus puncturasque valent. Stercus colicis confert. Pellis commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos. Schrod. Prolixius agit Paullini in *Lycographia Curiosa*.

XXVII. *De Cane.*

**C**ANIS Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R. Synop. *Animal.* p. 175. *Mund. Usu.* Catulus, Caput, Axungia, Fel, Sanguis, Stercus, *Album Græcum* dictum, Urina, Dens, Pellis, Pilus. *Vires.* Catulus vivus ventri impositus, dolores colicos mitigat. Paralytica membra confortat. Caput live *Calvaria* incinerata desiccatur, ulcера, curat vitia sedis, rhagades, & testiculorum tumores. Intrinsecus Icterus sanat. *Axungia* canina re' quis calidior est adhibeturque internè, in vulneribus & exulcerationibus abstergendis, consolidandis, adeoque & in Phthisi & cruore ex casu dissolvendo. Externè in Podagricis, auriumque doloribus leniendis, lenticulis capitis arcendis, auditu difficili reparando, scabie & pruritu corrigendo. Fel catuli nigri Epilepsiam mirè curat. Extrinsecus abstergit maculas faciei, oculorum albugini medetur. Sanguis contra Veneficarum venenum commendatur, bibique cum successu dicitur, contra morsum rabiosæ Bestiæ ac Toxicum. Stercus siccatur, abstergit, discutit, aperit, apostemata rumpit, exulcerationes abstergit; hinc utile est in Dysenteria, dolore colico & simil. Extrinsecus medetur Anginæ, ulceribus malignis; tumores duros emollit, aquas trahit hydropicas, verrucas abigit. Urina, ulcera capitis manantia, fursureque abstergit, verrucas abigit. Dentium cinis, infantium dentitionem faciliat, odontalgiam sedat. Pellis parata manuum lenit pruritus,



ritum, nervosque emollit contractos. *Pilus* moribus canis medetur. *Schrod.* Videri quoque meretur *Paullini Cynographia Curiosa.*

## XXVIII. De Vulpe.

**E**st Animal astutissimum, naturæ caninæ quodammodo particeps. *Schrod.*

*Vulpes* Offic. *Schrod.* *Aldrov.* *Gesn.* *Jons.* *R. Synop. Animal.* p. 177. *Fuchs.* *Ufu.* *Pinguedo*, *Pulmo*, *Jecur*, *Fel*, *Lien*, *Pellis*, *Sanguis*, *Integrum animal*, *Stercus.* *Vires.* *Pinguedo* auxilio est convulsionibus, contracturis, tremoribus, &c. aurium doloribus, vulneribus capitis & alopeciis. *Pulmo* consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum, & angustiam pectoris. *Jecur* Epatici & Spleneticis confert. *Fel* Oculorum Pterygio succurrit. *Lien* Lienis duritiæ ac tumori medetur. *Pellis* pilosa membræ refrigeratis, ac articulari morbo infestatis feliciter imponitur. *Sanguis* arefactus & tritus calculo Renum & Vesicæ medetur: Idem felicius præstare perhibetur sanguis recens. *Vulpes* integra vel Caro ejus combusta, ad vitia pectoris commendatur. *Vulpes* in aqua vel oleo cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac doloribus articulorum medetur. *Stercus* scabritiem cutis sanat. *Schrod.*

## XXIX. De Animalis Zibethico.

**A**nimal Zibethicum Offic. *R. Synop. Animal.* p. 178. *Jons.* Catus Zibethicus *Schrod.* *Scalig.* Zibethicum Animal Americanum *Rech.* *Felis* Zibethus *Ludovic.* *Hyæna* veterum *Bellon.* Zibetha

**Zibeth**, *Raze. Usu.* Zibethum Zibeth / substantia est pinguis & unctuosa, consistentiam mellis seu butyri habens, odoris fragrantissimi & grati. *Vires.* Calidum, humidum est atque anodynum. Usus crebri in dolore colico. inungitur umbilico, in dolore ventris infantum, in strangulatu uteri, applicatur Vulvæ, vel cavernulæ umbilici. *Schrod.*

Zibethum non est semen Animalis Zibethici, nec sudor, nec testiculi aut scrotum, ut nonnulli affirmant, quia nihil olent; sed est excrementum proprium à naturâ secretum collectum in folliculis substantiæ glandulosæ, in mare inter penem & testes, in foemina, inter uterum & anum sitis. Modum colligendi Zibethum videsis apud *Fabrum* in Notis ad Animalia *Novæ Hispaniæ*. Præfertur pallida in Anglia collecta, non Butyro sophisticata, rejiciatur nigrum ex India Orientali transportatum. Qui plura de Zibetho velit consulat *Hyenam* odoriferam *Petri Castellæ*.

### XXX. De Taxo.

**T**AXUS *Offic. Schrod. Jonsf. sive Meles Aldrov. Gesn. R. Synop. Animal. p. 185. Dach8.* Cryptas incolit. *Usu.* Integer incineratus, Sanguis, Adeps. *Vires.* Incineratus, cum successu exhibetur pulmoniacis, sanguinem exscreantibus. Sanguis pulverisatus lepræ conire dicitur, destillatusque peste subvenire. Adeps qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo, Renum doloribus auxiliatur, à calculo subortis, febrilem

æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatibus artuum succurrit. *Schrod.*

### XXXI. De Lutra.

**C**astore minor est, corpore etiam graciliore, & longiore, cauda pilosa. *R. Synop. Animal. p. 187.*

*Lutra Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Lytra Var-  
ron. Otter. In fluviis Majoribus incola est.  
Usu. Adeps. Vires. Medicamentis digerenti-  
bus infarctus & exassatus ad tollenda articulo-  
rum vitia, perutilis est. Holler.*

---

*Quadrupeda vivipara rostro productio-  
re, dentibus pluribus, incerto  
numero.*

### XXXII. De Erinaceo.

**A**nimal est terrestre, echinatum, hyeme in caver-  
nis arborum latitans.

*Erinaceus Offic. Schrod. Echinus terre-  
stris Jons. Echinus sive Erinaceus terrestris.  
R. Synop. Animal. p. 231. Ggel / Hochel. In vepre-  
tis & sepibus. Usu. Animal ipsum. Jecur,  
Axungia, Ventriculus. Vires. Echinus vel  
coctus, vel incineratus, involuntariè min-  
gentibus auxiliatur, stomacho gratus est, alvum  
& urinam movet. Forest. Extrinsecus illitus  
alopecie subvenit. Jecur, vel corpus exicca-  
tum, atque cum Oxymelite sumptum, renum  
vitiis auxilio est, medetur Cachexiæ, Hydro-  
pi,*



i, Convulsionibus, & Elephantia; viscerum  
fluxiones exiccat. *Dioscorid. Axungia felicissi-*  
*mè Herniis medetur Hartm. Ventriculi tuni-*  
*cam internam commendant ad dolores coli-*  
*cos. Schrod.*

### XXXIII. De Talpa.

**A** Nimal est subterraneum, coloris nigri, pilis mollis-  
simis, rostro suillo, oculis minimis, cruribus bre-  
vissimis.

Talpa Offic. Schrod. Aldrov. Gesn. Jons. R.  
Synop. Animal. p. 236. Maulwurff. Sub terra  
in Cuniculis vivit. Ufu. Talpa ipsa, Cor,  
Sanguis. Vires. Cinis confert lepris, strumis  
ac fistulis. Intrinsecus cum Cerevisia, aut  
Vino potus curat Arthritidem vagam dictam  
& Scrophulas. Cor, Herniam sanat. Sanguis  
recens illitus capillis calvitiam decorat. Plu-  
ra vide in *Paullini tract. de Talpa.*

### XXXIV. De Mure Araneo.

**A** Mure domestico minore differt, quod minor est, ro-  
stra porrectiore Porci instar, oculis minoribus, au-  
riculis brevioribus.

Mus Araneus Offic. Schrod. Aldrov. Jons.  
R. Synop. Animal. p. 239. Epig. Maus. Inveni-  
tur in agris. Vires. Affectibus sedis, peculiari  
experimento utilis est, ustus & illitus cum  
axungia anserina. Schrod.

---

# PHARMACOLOGIÆ

## SEU

## MANUDUCTIONIS

## AD

# Materiam MEDICAM

# LIBER QUARTUS.

---

### *De Anthropologia.*

**A***nthropologia est pars Pharmacopœiæ, quæ Medicamenta ex humano corpore desumpta recenset.*

Reliquis omnibus materiæ medicæ partibus absolutis, superest tantum ut de Homine agamus, totius universi compendio, ultima ordine non dignitate hexaemeræ creationis parte, cujus gratia reliqua omnia facta fuisse creduntur; de quo in genere agere, aut universalem tractatum edere mihi in animo non est. Sed ut in præcedentibus tribus hujus opusculi libris, seu partibus, ad ea duntaxat quorum aliquis in medicina usus est tractanda memet restrinxi, ita etiam hoc in loco de iis solummodo in homine agam, quæ homini ipsi medendo utilia sunt; ea autem vel à vivo corpore desumuntur, vel à mortuo.

## SECTIO PRIMA.

*De medicamentis simplicibus in Officinis  
usitatis, quæ ab humano corpore  
adhuc vivente desumuntur.*

**S**implicia Officinalia ex partibus humani corporis adhuc viventis desumpta sunt; Capilli, Ungues, Saliva, Aurium sordes, Sudor, Lac, Menses, Secundinæ, Urina, Stercus, Semen, Sanguis, Calculi ex vesica, Membrana caput foetus cingens. *Vires.* Capilli commendantur ad capillorum productionem, ad icteritiam, ad membra luxata, ad hæmorrhagiam vulnerum. *Ungues*, cient vomitum, aquas Hydropicorum ducere dicuntur. *Saliva* jejuni commendatur ad venenatos morsus serpentis, canis rabidi, & simil. *Aurium sordes* colicæ laborantibus, præsentissimum perhibentur remedium. Extrinsecus medentur ictibus Scorpionum, conglutinant vulnera, fissuras & scissuras cutis. *Sudor* usus proficui esse dicitur, contra scrophulas, si cum herba radiceque verbasci mixtus folio involvatur, inque cineribus calefactus imponatur. *Lac* refrigerat, lenit, maturat, oculorum rubedini subvenit. *Sanguis menstruus*, Zenith juvenula exiccatus commendatur intrinsecus ad calculum & Epilepsiam. Extrinsecus sopit dolores podagricos, conducere item dicitur in Peste, apostematibus,



bus, carbunculisque, Erysipelat. extinguit, pustulas faciei abstergit. *Secundina* magni fit ad strumas gutturis tollendas, ad Epilepsiam & philtrea compescenda; ad molam & foetum exterminandum, nec non ad animalia enecanda, etiam ea quæ maleficio in homine extiterint. *Urina*, calefacit, exiccat, resolvit, abstergit, discutit, mundificat, putredini resistit, ideoque usus est præcipui intrinsecus, in obstructione Epatis, Lienis, Vesicæ biliaris, Pestis præservatione, Hydrope, Ictero. Quin & mariti urina hausta (mulierculis Aqua Castoris dicta) partum difficilem facilitare dicitur. Extrinsecus siccatur scabiem, resolvit tumores, mundificat vulnera etiam venenata, arcet gangranam, solvit alvum, abstergit furfures capitis, compescit febriles insultus, exulceratas aures sanat, oculorum rubedini subvenit, artuum tremorem tollit, uvulæ tumorem discutit, Lienis dolores sedat. *Præp.* Sal Armoniacum, Sal est artificiale striatum, in placentulas coactum colore exalbido, sapore amaricante pungente, ex urina, fuligine & sale communi coctum. Eligatur candidum ac purum. N. B. Vestigia Salis Armoniaci naturalis superesse videntur in *Dioscoride* & *Plinio*, aliisque à majoribus descripti, sub arenis Libycis inventi, verum in Officinis nostris hodie ignoratur. Vide *Matthiolum* in *Dioscoridem*. *Vires.* Internè vim habet diaphoreticam, præcipuè in febribus, resistit putredini. Externè adhibetur in Gangranæ carne putrida absumenda. Quin-  
imo

imo Tonsores aquam suam Cœruleam inde conficiunt, ad albuginem oculorum tollendam. *Stercus* emollit, maturat, anodynum est. Ea- propter magni usus ad mitigandos dolores in- cantatione introductos, ad anthraces pestilen- tiales maturandos, ad phlegmonem, v. g. gut- turis sive anginam curandam, ad inflamma- tiones vulnerum arcendas. *Quin* & intrinse- cus à nonnullis adhibetur in Angina, in febri- bus ad paroxysmos profligandos, in Epilepsia. *Semen* sive *Sperma*, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scilicet ligaturam ma- leficam dissolvendam adhiberi, sed & *Mumiam* magneticam inde fieri, quo amoris concilie- tur fervor. *Sanguis* recens adhuc & calidè potus conferre dicitur ad Epilepsiam, si scilicet potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris usque prorruptionem; hæ- morrhagiam quamcunque sedat. *Quin* & ex- trinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præ- cipuè narium hæmorrhagiæ. *Calculus* Tarta- rum sive calculos in omnibus partibus solvit, & expelli facit, ideoque omnibus obstructio- nibus subvenit. *Schrod.* Præ cæteris sudorem & urinam movet & pesti egregiè resistit. *Bont.* *Membrana*, quæ caput nonnullorum foetuum cingit, maximam vim habere dicitur adversus colicum dolorem. *Schrod.*

## SECTIO SECUNDA.

*De Medicamentis simplicibus in Officinis  
usitatis, quæ ab humano corpore  
jam mortuo desumuntur.*

**S**implicia Officinalia ex Cadavere desumpta sunt Mumia; Substantia est resinosa, indurata, nigra, splendens, saporis subacris, subamaricantis, odoris fragrantis, communiterque quatuor denotat. 1. *Mumiam Arabum*, quæ est liquamen, sive liquor concretus exudans in sepulchro è cadaveribus Aloe, Myrrha Balsamoque conditis. Quæ si vera haberi potest, præ cæteris speciebus erit æstimanda. 2. *Mumiam Egyptiorum*, quæ est liquamen ex cadaveribus pissasphalto conditis. 3. *Pissasphaltum* factitium, id est, mixtum Pici Bitumen, quod pro Mumia venditant. 4. *Cadaver* sub arena Solis æstu torrefactum, sed rarò apud nos inveniuntur. *Cutis*, *Pinguedo*, *Ossa*, *Cranium*, *Cor*. *Vires*. *Mumia* resolvit sanguinem coagulatum, conferreque dicitur purgationi capitis, punctiōi Lienis, tussi, inflationi corporis, mensibus obstructis, aliisque affectibus uterinis & sim. Extrinsecus adhibetur vulneribus consolidandis. *Cutis*, commendatur in difficili partu & affectibus hystericis, in aridura & contractura articularum. *Pinguedo* roborat, discutit, mulcet dolores,



res, removel contracturas, cicatricum duritiem lenit, foveas post morbillos relictas explet. *Ossa* exiccant, discutunt, astringunt, fluxus quoscunque sistunt, adeoque utilia sunt in Catarrho, fluxu mensium, Dysenteria, Lienteria; Insuper articulorum dolores compescunt. *Medulla* commendatur summò ad contracturas membrorum. *Cranium* ad capitis morbos conferre compertum est, & nominatim ad Epilepsiam, unde & varias passim compositiones Antepilepticas ingreditur. Laudatur autem præcipuè *Os triquetrum* temporum ceu peculiare Epilepsiæ specificum. Cor Epilepsiæ medetur, *Schrod.*



OFFI-

# OFFICINA SIMPLICIUM.

## RADICES.

|                              |       |                                 |       |
|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| <b>A.</b>                    |       | <b>Behen albi</b>               | 292   |
| <b>A</b> Cetosæ, Oxalidis.   | 132.  | rubri.                          | 173   |
| Acori Veri, Calami           |       | Bellidis, Symphyti minimi.      | 163   |
| aromatici officin.           | 337   |                                 | 136   |
| Adulterini, Pseudacori,      |       | Betæ albæ.                      | ibid. |
| Gladioli lutei.              | 321   | rubræ.                          | 228   |
| Alii.                        | 317   | Bismalvæ, Althææ.               | 134   |
| Althææ, Bismalvæ, Ibisci.    | 228   | Bistortæ.                       | 204   |
| Anchusæ.                     | 205   | Borraginis.                     | 242   |
| Angelicæ.                    | 188   | Brusci, Rusci.                  | 240   |
| Anthoræ, Antithoræ.          | 253   | Bryoniæ albæ.                   | 241   |
| Apii palustris, Eleoselinis. | 192   | nigræ.                          | 204   |
| Ari.                         | 331   | Buglossi hortensis.             | 205   |
| Aristolochiæ longæ, te-      |       | fylvestris.                     |       |
| nuis.                        | 259   | <b>C.</b>                       |       |
| rotundæ.                     | 280   | Calami aromatici officin. i. e. |       |
| Clematidis.                  | ibid. | Acori veri.                     | 337   |
| Arthanitæ, Cyclaminis.       | 313   | Capparum.                       | 430   |
| Arundinis.                   | 343   | Cardui Mariæ.                   | 156   |
| Asari vulg.                  | 137   | Caryophyllatæ.                  | 229   |
| Virg.                        | 138   | Caulium.                        | 266   |
| Asclepiadis, Vincetoxici.    |       | Centaurii majoris.              | 157   |
| Hirundinariæ.                | 310   | Cæpæ                            | 316   |
| Asparagi.                    | 245   | Chamaeleontis albi, Carli-      |       |
| Asphodeli veri albi.         | 322   | næ.                             | 152   |
| lutei, Hastæ Regiæ. ib.      |       | nigri.                          | 156   |
| <b>B.</b>                    |       | Chelidonii majoris.             | 277   |
| Bardanæ majoris, Lappæ       |       | minoris, scrophulariæ           |       |
| mai.                         | 158   | min.                            | 226   |
| minoris, Lappæ min.          | 127   | Chinæ.                          | 238   |
|                              |       | Cichorii hortensis.             | 146   |
|                              |       | agrestis.                       | 147   |
|                              |       | Cinaræ,                         |       |

# Officina Simplicium.

|  |       |   |              |
|--|-------|---|--------------|
| Cinaræ, Scolymi.   | 155   | Filicis maris.                          | 118          |
| Colubrina virginiana, Serpentaria, Pistolochia virginiana. | 260   | Fœminæ floridæ, Osmundæ regalis.        | 120<br>ibid. |
| Consolidæ, Symphiti majoris.                               | 206   | Filipendulæ.                            | 234          |
| mediæ, Bugulæ.   | 223   | Fœniculi.                               | 196          |
| minoris, bellidis minoris.                                 | 163   | Fraxinella, Dictamni albi.              | 250          |
| regalis, delphinii.  | 151   | Fumariæ bulbosæ                         | 294          |
| Contrayervæ, Draken.                                       | 233   | G.                                      |              |
| Costi dulcis.  | 329   | Galangæ majoris.                        | 330          |
| amari.   | ibid. | minoris.                                | ibid.        |
| Curcumæ.   | 324   | Gentianæ.                               | 255          |
| Cucumeris agrestis   | 236   | Ginseng, Ninzin                         | 303          |
| Cyclaminis, Artbanitæ.                                     | 323   | Glycyrrhizæ, Liquiritiæ                 | 287          |
| Cynoglossæ.  | 203   | Graminis canini.                        | 343          |
| Cyperi longi, Romani.                                      | 334   | H.                                      |              |
| rotundi.   | 335   | Hermodactyli.                           | 319          |
| D.   |       | Hippolapathi.                           | 131          |
| Dauci.   | 197   | Hirundinaria, Asclepiadis, Vincetoxici. | 310          |
| Dentariæ, Dentillariæ.                                     | 265   | Hyacinthi.                              | 317          |
| Dictamni albi, Fraxinellæ.                                 | 250   | Hyoscyami.                              | 254          |
| Doronici Romani.   | 151   | Hydrolapathi.                           | 132          |
| Dracontii.   | 331   | I.                                      |              |
| Dulcamari, Solani lignosi.                                 | 244   | Jalappæ.                                | 256          |
| E.   |       | Imperatorizæ, Ostrutiæ.                 | 188          |
| Echii.   | 205   | Iridis nostratis.                       | 310          |
| Eleoselini, Apii.  | 192   | Florentinæ, Illyricæ.                   | 321          |
| Ellebori, Veratri albi.                                    | 129   | Isatidis, Glaſti.                       | 274          |
| nigri.   | 250   | L.                                      |              |
| Endiviæ.   | 147   | Lapathi acuti, Oxylapathi.              | 132          |
| Enulæ campanæ, Helenii.                                    | 150   | Lappæ, Bardanæ majoris.                 | 158          |
| Eringii.   | 171   | minoris.                                | 127          |
| Efulæ majoris.   | 277   | Levistici.                              | 189          |
| minoris.   | 278   | Lilii albi.                             | 315          |
| F.   |       | Liquiritiæ, Glycyrrhizæ.                | 287          |
| Farfara, Tuſſilaginis.                                     | 149   | Pp                                      | M.           |



# Officina Simplicium.

M.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Malvæ.                       | 227 |
| Mechoacannæ albæ             | 256 |
| nigræ, Jalappæ.              | 256 |
| Mei, Mei Arhamantici.        | 187 |
| Morsus Diaboli, Succisæ.     |     |
| N.                           | 170 |
| Napi dulcis, Buniadis.       | 267 |
| Nardi Celticæ.               | 173 |
| Indicæ, Spicæ nardi officin. | 335 |
| Ninzin, Ginszeng.            | 303 |
| Nymphææ, Nenupharis.         | 314 |

O.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ononidis, Arestæ bovis.    | 293 |
| Oreoselini.                | 181 |
| Oxylapathi, Lapathi acuti. |     |

P.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Pæoniæ maris.              | 249   |
| foeminæ.                   | ibid. |
| Pastinacæ Hortensis.       | 180   |
| Sylvestris.                | 179   |
| Pentaphylli, Quinquefolii. | 229   |
| Petasitidis.               | 149   |
| Petroselini.               | 193   |
| Pewcedani                  | 182   |
| Phu, Valerianæ majoris.    | 171   |
| minoris.                   | ibid. |
| Pimpinellæ, Sanguisorbæ    | 175   |

Saxifragæ.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Plantaginis terrestris.        | 281 |
| aquaticæ.                      | 239 |
| Polipodii quercini.            | 116 |
| Polygonati, Sigilli Salomonis. | 242 |
| Porri.                         | 317 |
| Pyrethri.                      | 163 |

Q.

|   |     |
|---|-----|
| Quinquefolii, Pentaphylli.                  | 229 |
| R.  |     |
| Rapi.                                       | 266 |
| Rhaphani Hortensis.                         | 267 |
| Sylvestris.                                 | 168 |
| rusticani.                                  | 270 |
| Rha, Rhei pontici, Rha-pontici officinarum. | 130 |
| barbari, rhabarbari                         | 158 |
| vulgaris.                                   | 308 |
| Monachorum.                                 | 130 |
| Rhodix.                                     | 248 |
| Rubix tinctorum.                            | 200 |
| Rusci, Brusci.                              | 242 |

S.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Saponariæ.                     | 299   |
| Sarzæparillæ.                  | 238   |
| Sassafras.                     | 384   |
| Satirii maris.                 | 332   |
| foeminæ.                       | ibid. |
| Saxifragiæ albæ.               | 194   |
| Scyllæ.                        | 318   |
| Scrophulariæ.                  | 261   |
| Scorzonæræ nostratis.          | 145   |
| Hispanicæ.                     | ibid. |
| Serpentariæ Virginianæ.        | 260   |
| Sigilli Salomonis, Polygonati. | 242   |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Siferis.                     | 190 |
| Spatulæ foetidæ.             | 311 |
| Succisæ, morsus Diaboli.     | 170 |
| Symphyti, Consolidæ majoris. | 206 |

T.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Taraxaci, Dentis Leonis. | 145 |
| Thapsiæ.                 | 183 |
| Tormentillæ.             | 230 |
| Turbith, Turpethi.       | 257 |

Tuffi.

*Officina Simplicium*

|                                |       |                                   |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| <i>Tuffilaginis, Farfare,</i>  | 149   | <i>Guajaci.</i>                   | 447   |
| V.                             |       | J.                                |       |
| <i>Valeriana, Pbu majoris.</i> | 172   | <i>Juglandis arboris.</i>         | 351   |
| <i>minoris.</i>                | 173   | <i>Juglandium nucum viridium.</i> | ibid. |
| <i>Verbenæ.</i>                | 216   | L.                                |       |
| <i>Victoralis.</i>             | 316   | <i>Laureola.</i>                  | 415   |
| <i>Vincetoxici.</i>            | 310   | <i>Lauri.</i>                     | 444   |
| <i>Urticæ.</i>                 | 125   | <i>Ligni Sancti.</i>              | 448   |
| Z.                             |       | <i>Limonium.</i>                  | 437   |
| <i>Zedoariæ longæ.</i>         | 328   | M.                                |       |
| <i>rotundæ.</i>                | ibid. | <i>Macis.</i>                     | 394   |
| <i>Zerumbet.</i>               | ibid. | <i>Malicorium, cortex gra-</i>    |       |
| <i>Zinziberis.</i>             | 327   |                                   |       |

## CORTICES.

|                                  |     |                                    |               |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|---------------|
| <b>A.</b>                        |     | <b>Mezerei.</b>                    | 415           |
| <b>A</b> Vellanarum.             | 352 | <b>Mori rad.</b>                   | 363           |
| <b>A</b> Aurantiorum.            | 437 | <b>P.</b>                          |               |
| <b>B.</b>                        |     | <b>Peruanus.</b>                   | 371           |
| <b>Berberis, Oxyacanthæ Gal.</b> | 422 | <b>Prunelli sylvestris.</b>        | 398           |
| <b>Betula.</b>                   | 359 | <b>Pineorum nucleorum</b>          | 356           |
| <b>C.</b>                        |     | <b>Pistaciorum nucleorum exte-</b> | 443           |
| <b>Canella vera, Cinnamomi.</b>  | 385 | <b>rioris.</b>                     | 361           |
| <b>alba, Winterani Spuri.</b>    | 389 | <b>Populi arb.</b>                 |               |
| <b>Capparis rad.</b>             | 430 | <b>Quercus.</b>                    | 352           |
| <b>Cassia Caryophyllata.</b>     | 378 | <b>S.</b>                          |               |
| <b>lignea.</b>                   | 386 | <b>Sambuci.</b>                    | 423           |
| <b>Castanearum.</b>              | 352 | <b>Sassafras radicis.</b>          | 384           |
| <b>Cinnamomi.</b>                | 385 | <b>Saberis.</b>                    | 354           |
| <b>Citrui.</b>                   | 436 | <b>T.</b>                          |               |
| <b>E.</b>                        |     | <b>Tamarisci.</b>                  | 451           |
| <b>Ebuli.</b>                    | 423 | <b>Tilia.</b>                      | 445           |
| <b>Esula rad.</b>                | 278 | <b>Thuris.</b>                     | 469           |
| <b>F.</b>                        |     | <b>U.</b>                          |               |
| <b>Frangula, Alni nigra.</b>     | 411 | <b>Ulm.</b>                        | 451           |
| <b>Fraxini.</b>                  | 448 | <b>Winteranus cortex verus.</b>    | 379           |
| <b>G.</b>                        |     | <b>Spurius Canella alba.</b>       | 389           |
| <b>Granatorum immaturorum,</b>   |     | <b>Pp 2</b>                        | <b>LIGNA.</b> |
| <b>Malicorium.</b>               | 370 |                                    |               |





# Officina Simplicium.

|                                       |       |                                    |                 |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| <i>Anethum.</i>                       | 182   | <i>Baglossum.</i>                  | 204             |
| <i>Angelica.</i>                      | 188   | <i>Bugula.</i>                     | 223             |
| <i>Apium, Eleoselinum.</i>            | 192   | <i>Bursa Pastoris.</i>             | 273             |
| <i>Aparine.</i>                       | 201   | <i>Bupbthalmum.</i>                | 161             |
| <i>Aquilegia.</i>                     | 251   | <i>Buxi folia.</i>                 | 446             |
| <i>Argentina, Potentilla.</i>         | 130   | C.                                 | μ               |
| <i>Artemisia vulgaris.</i>            | 169   | <i>Calamintba Vulgaris</i>         | se <sub>2</sub> |
| <i>Chinensis, Moxa.</i>               | ibid. | <i>Montana.</i>                    | 226             |
| <i>Asarum.</i>                        | 137   | <i>Palustris.</i>                  | 216             |
| <i>Asperula odorata, Aspergula.</i>   |       | <i>Calendula.</i>                  | 160             |
|                                       | 201   | <i>Camphorata.</i>                 | 139             |
| <i>Atriplex.</i>                      | 134   | <i>Caprifolium, Periclimenum.</i>  |                 |
| <i>Atractylis.</i>                    | 156   | <i>Matrisylva.</i>                 | 375             |
| <i>Auriculamuris, Pilosella.</i>      | 144   | <i>Cardamine.</i>                  | 269             |
| B.                                    |       | <i>Carduus Mariae.</i>             | 156             |
| <i>Balsamita mas, Costus horto-</i>   |       | <i>Benedictus.</i>                 | 155             |
| <i>rum.</i>                           | 166   | <i>Cariophyllata.</i>              | 229             |
| <i>Bangue.</i>                        | 306   | <i>Cataputia.</i>                  | 278             |
| <i>Bardana, lappa major.</i>          | 158   | <i>Cauda equina, Equisetum.</i>    |                 |
| <i>minor.</i>                         | 127   |                                    | 115             |
| <i>Becabunga, Anagallis a-</i>        |       | <i>Caulis.</i>                     | 266             |
| <i>quatica.</i>                       | 275   | <i>Centaureum minus.</i>           | 311             |
| <i>Beta alba.</i>                     | 136   | <i>Centinodium, Polygonum.</i>     | 133             |
| <i>rubra.</i>                         | ibid. | <i>Ceterach, Scolopendrium.</i>    | 117             |
| <i>nigra.</i>                         | ibid. | <i>Cheresolium.</i>                | 186             |
| <i>Betle.</i>                         | 364   | <i>Chamedris, Trifogo.</i>         | 214             |
| <i>Betonica Sylvestris, vulgaris.</i> |       | <i>Chamamelum.</i>                 | 163             |
|                                       | 220   | <i>Chamapitys, Iva arthetica.</i>  |                 |
| <i>aquatica.</i>                      | 261   |                                    | 223             |
| <i>Bellis major.</i>                  | 162   | <i>Chamæcyparissus, Abro-</i>      |                 |
| <i>minor.</i>                         | 163   | <i>tanum fœmina.</i>               | 165             |
| <i>Bistorta.</i>                      | 134   | <i>Chelidonium majus.</i>          | 277             |
| <i>Blitum.</i>                        | 135   | <i>minus.</i>                      | 226             |
| <i>Bonus Henricus.</i>                | ibid. | <i>Cichorium agreste.</i>          | 147             |
| <i>Borago.</i>                        | 204   | <i>Sativum.</i>                    | 146             |
| <i>Botrys, Ambrosia.</i>              | 135   | <i>Cicuta.</i>                     | 194             |
| <i>Brassica Sativa.</i>               | 266   | <i>Cinara, Scolymi folia.</i>      | 155             |
| <i>Marina, soldanella.</i>            | 257   | <i>Cochlearia Batava, rotundi-</i> |                 |
| <i>Bryonia alba.</i>                  | 240   | <i>folia, bortenfis.</i>           | 271             |
| <i>nigra.</i>                         | 141   | <i>Britannica, marina. ibid.</i>   |                 |



# Officina Simplicium.

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| <i>Hippolapatium.</i>                    | 131   | <i>Lujula, Acetosella.</i>                    | 312   |
| <i>Hipposelinum, Smyrniun.</i>           | 189   | <i>Lunaria.</i>                               | 115   |
| <i>Hispidula.</i>                        | 145   | <i>Lupulus Salictarius.</i>                   | 124   |
| <i>Horminum hortense, Sclavara.</i>      | 219   | <i>Lyfimachia.</i>                            | 301   |
| <i>sylvestre.</i>                        | ibid. | <i>M.</i>                                     |       |
| <i>Hyoſcyamus.</i>                       | 254   | <i>Majorana, Sampsucum.</i>                   | 217   |
| <i>Hypericum.</i>                        | 300   | <i>Malva vulgaris.</i>                        | 227   |
| <i>Hyppogloſſum, Biſſangua.</i>          | 241   | <i>arboorea.</i>                              | ibid. |
| <i>Hyſſopus.</i>                         | 212   | <i>Mandragora.</i>                            | 243   |
| <i>I.</i>                                |       | <i>Marrubium, Præſſum album.</i>              | 220   |
| <i>Iberis.</i>                           | 272   | <i>nigrum.</i>                                | 223   |
| <i>Illecebra.</i>                        | 248   | <i>Marum.</i>                                 | 213   |
| <i>Inguinalis, Aſter Atticus.</i>        | 161   | <i>Matricaria, Parthenium.</i>                | 165   |
| <i>Iſatis, Glaſtum.</i>                  | 274   | <i>Matrifylva, Periclymenum, Caprifolium.</i> | 375   |
| <i>Juncus vulgaris.</i>                  | 336   | <i>Melilotus.</i>                             | 292   |
| <i>odoratus, Schenanthus, ib.</i>        |       | <i>Meliſſa, Meliſſophyllum.</i>               | 222   |
| <i>Iva, arthetica, Chamæpitis.</i>       |       | <i>Mentha Sativa.</i>                         | 215   |
| <i>K.</i>                                | 223   | <i>Aquatica, Siſymbrium.</i>                  | ibid. |
| <i>Kali.</i>                             | 139   | <i>Menthaſtrum, Mentaſtrum.</i>               | ibid. |
| <i>L.</i>                                |       | <i>Mercurialis.</i>                           | 126   |
| <i>Lactuca.</i>                          | 143   | <i>Mezereon, Chamælea.</i>                    | 415   |
| <i>Lagopus, Peſ Leporinus.</i>           | 292   | <i>Millefolium.</i>                           | 162   |
| <i>Lamium, Urtica mortua.</i>            | 221   | <i>Morſus Diaboli, Succifa.</i>               | 170   |
| <i>Lappa, Bardana major.</i>             | 158   | <i>Muſcus.</i>                                | 110   |
| <i>minor.</i>                            | 127   | <i>Myrrhis.</i>                               | 186   |
| <i>Lavendula.</i>                        | 210   | <i>Myrti fol.</i>                             | 376   |
| <i>Laureola.</i>                         | 415   | <i>N.</i>                                     |       |
| <i>Lauri vulgaris folia.</i>             | 444   | <i>Naſturtium hortense.</i>                   | 272   |
| <i>Alexandrina.</i>                      | 241   | <i>aquaticum.</i>                             | 270   |
| <i>Lens paluſtris.</i>                   | 111   | <i>Nepetha.</i>                               | 219   |
| <i>Lepidium, Piperitis.</i>              | 272   | <i>Nicotiana, Petum, Tabacum.</i>             | 254   |
| <i>Leviſticum.</i>                       | 189   | <i>Nummularia.</i>                            | 313   |
| <i>Liguſtrum.</i>                        | 421   | <i>Nymphaea, Nenuphar.</i>                    | 314   |
| <i>Lithoſpermum.</i>                     | 206   | <i>O.</i>                                     |       |
| <i>Limonium.</i>                         | 173   | <i>Ocimum, Baſilicum.</i>                     | 218   |
| <i>Linaria.</i>                          | 259   | <i>P p 4.</i>                                 | Olea  |
| <i>Lingua Cervina, Phillitis.</i>        | 116   |   |       |
| <i>Lotus urbana, Triſolium odoratum.</i> | 292   |   |       |



# Officina Simplicium.

|                                    |       |                                     |       |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <i>Olea fol.</i>                   | 404   | <i>Potentilla</i> , Argentina.      | 230   |
| <i>Ononis, Aresta Bovis.</i>       | 293   | <i>Prassium</i> , Marrubium al-     |       |
| <i>Ophioglossum.</i>               | 115   | bum.                                | 220   |
| <i>Origanum.</i>                   | 217   | nigrum.                             | 223   |
| <i>Oxylapathum, Rumex acu-</i>     |       | <i>Primula veris.</i>               | 309   |
| <i>tus.</i>                        | 132   | <i>Prunella.</i>                    | 220   |
| P.                                 |       | <i>Ptarmica.</i>                    | 161   |
| <i>Papaver album.</i>              | 275   | <i>Pulegium Cervinum.</i>           | 216   |
| nigrum.                            | 276   | Regale.                             | ibid. |
| rubrum, Rhaas, erraticum.          | 277   | <i>Pulicaria, Conyza.</i>           | 150   |
| <i>Parietaria, Helxine.</i>        | 137   | <i>Pulmonaria maculosa.</i>         | 203   |
| <i>Pentaphyllum, Quinquefo-</i>    |       | <i>Pyrola.</i>                      | 333   |
| <i>lium.</i>                       | 229   |                                     |       |
| <i>Persicaria maculata, Hydro-</i> |       | Q.                                  |       |
| <i>piper.</i>                      | 133   | <i>Quercus folia, tum germina.</i>  | 352   |
| non maculata.                      | ibid. | <i>Quinquefolium, Penta-</i>        |       |
| <i>Perfoliata.</i>                 | 198   | phyllum.                            | 229   |
| <i>Persica folia</i>               | 391   | R.                                  |       |
| <i>Petroselinum.</i>               | 193   | <i>Ranunculus.</i>                  | 227   |
| <i>Phyllitis, Lingua cervina.</i>  | 116   | <i>Ros solis.</i>                   | 313   |
| <i>Phu, Valeriana.</i>             | 172   | <i>Rosmarinus.</i>                  | 211   |
| <i>Pilosella, Auricula Muris.</i>  | 144   | <i>Rubi Vulgaris Cyma &amp; fo-</i> |       |
| <i>Pimpinella, Sanguisorba.</i>    | 175   | lia.                                | 432   |
| <i>Pithyusa, Esula minor.</i>      | 278   | Idæi.                               | ibid. |
| <i>Plantago Latifolia, Vulga-</i>  |       | <i>Rumex, Lapathum.</i>             | 132   |
| <i>ris Septinervia.</i>            | 281   | <i>Ruta Capraria, Galega.</i>       | 288   |
| Angustifol. <i>Quinquener-</i>     |       | <i>bortensis, vulgaris.</i>         | 280   |
| <i>via.</i>                        | ibid. | <i>muraria, Adiantum al-</i>        |       |
| <i>Polium Montanum.</i>            | 213   | bum, <i>Salvia vitæ.</i>            | 119   |
| Creticum.                          | 214   | <i>sylvestris, Harmel.</i>          | 280   |
| <i>Polygonum, Centinodia.</i>      | 133   | S.                                  |       |
| <i>Polytricum Officin. Tricho-</i> |       | <i>Sabina.</i>                      | 359   |
| <i>manes.</i>                      | 118   | <i>Salicis folia.</i>               | 361   |
| <i>Populi folia, tum Oculi,</i>    | 361   | <i>Salvia hortensis major.</i>      | 209   |
| <i>Porrum.</i>                     | 317   | minor.                              | 210   |
| <i>Portulaca.</i>                  | 302   | <i>sylvestris, Scorodonia.</i>      | 224   |
|                                    |       | <i>Sambuci folia, tum germina.</i>  | 423   |
|                                    |       | <i>Sampfucum, Majorana.</i>         | 217   |
|                                    |       | San-                                |       |

# Officina Simplicium.

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Sanguisorba, Pimpinella.         |          |
|                                  | 175      |
| Sanicula.                        | 199      |
| Saponaria.                       | 299      |
| Satureia.                        | 212      |
| Saxifragia alba.                 | 194. 303 |
| vulgaris.                        | 191      |
| Scabiosa.                        | 170      |
| Scariola, Endivia.               | 147      |
| Scænanthus, Juncus odoratus.     | 336      |
| Sclæræa, Herminum hortense.      | 219      |
| Scôrdium.                        | 224      |
| Scrophularia.                    | 261      |
| Sedum, Sempervivum majus.        | 247      |
| minus.                           | 303      |
| Senecio, Erigerum.               | 153      |
| Senna folia & Folliculi.         | 454      |
| Serpillum.                       | 213      |
| Sigillum Salomonis, Polygonatum. | 242      |
| Smirniûm, Hippofelinum.          | 189      |
| Solanum.                         | 244      |
| Soldanella, Brassica marina.     | 257      |
| Sonchus levis.                   | 143      |
| asper.                           | 144      |
| Sophia Chirurgorum.              | 269      |
| Spicanardi Indica.               | 335      |
| Celtica.                         | 173      |
| Spica vulgaris.                  | 210      |
| Spinachia.                       | 126      |
| Spina alba.                      | 370      |
| Succisa, Morsus Diaboli.         | 170      |
| Symphitum, Consolida major.      | 206      |

T.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tamarisci folia.              | 451 |
| Tanacetum.                    | 166 |
| Taraxacum, Dens Leonis.       |     |
|                               | 145 |
| Tapsus barbatus.              | 311 |
| Thea.                         | 427 |
| Tbimus.                       | 213 |
| Tilia folia.                  | 445 |
| Tithymalus.                   | 277 |
| Tormentilla.                  | 230 |
| Trifolium vulgare.            | 292 |
| aureum, Epatica nobilis.      | 226 |
| acetosum, Lujula, Acetosella. | 312 |
| odoratum, Lotus urbana.       | 293 |
| Aquaticum.                    | 312 |
| Tussilago.                    | 149 |

V.

|  |       |
|--|-------|
| Valeriana, Phu.                        | 172   |
| Verbascum.                             | 311   |
| Verbena.                               | 216   |
| Veronica mas, Betonica Pauli.          | 274   |
| Fœmina, Elatine.                       | 259   |
| Violaria.                              | 304   |
| Viola tricolor.                        | 304   |
| Vinca peruvica.                        | 310   |
| Vincetoxicum, Asclepias, Hirundinaria. | ibid. |
| Virga aurea.                           | 151   |
| Vitis folia, pampini.                  | 424   |
| Ulmaria, Regina prati.                 | 231   |
| Uلمي folia.                            | 451   |
| Umbilicus veneris.                     | 248   |
| Urtica urens vulgaris.                 | 125   |
| romana.                                | ibid. |

Pp 5

mer-

# Officina Simplicium.

mortua, Lamium album.

D.

rubrum.

221

ibid.

Digitalis.

261

E.

## FLORES.

A.

**A** Bsinthii comæ floren-  
tes. 167

Agni casti, Viticis. 381

Alcanæ. 421

Amaranthi, Flores Amo-  
ris. 135

Anethi 182

Anthos, Rorismarini Fl. 211

Aquilegiæ. 251

Aurantiorum. 437

B.

Balaustia, Sylvestris Puni-  
cæ flores. 371

Betonicæ. 210

Boraginis. 204

Buglossi. ibid.

C.

Calendulæ. 160

Caprifolii, Periclymeni  
Matrisylvæ. 375

Caryophylli rubri, Tunicæ,  
Veronicæ flores. 298

Centaurii minoris. 311

Chamæmeli. 163

Cheyri, Leucii lutei. 265

Cichorii. 146

Consolidæ majoris, Sym-  
phyti maj. 206

Crocus. 318

Cyani majoris. 156

minoris. 157

Cynosbati. 373

Cytini, Sativæ Punicæ fl.  
370

Echii.

205

Ericæ.

452

Euphrasæ.

262

F.

Fabarum.

287

Fumariæ.

174

G.

Genistæ.

461

H.

Herbæ paralyseos.

309

Hyperici.

300

Hyslopi.

212

I.

Jasmini.

420

L.

Lamii albi, Urticæ mortuæ.

221

rubri.

ibid.

Lavendulæ.

210

Leucii lutei, Cheyri.

265

Ligustri, Orientalis Alcan-  
næ. 421

vulgaris.

ibid.

Lilii albi.

315

convallium.

242

Lupuli.

124

M.

Malvæ vulgaris.

237

arboreæ.

ibid.

Matricariæ.

165

Matrisylvæ, Caprifolii, Pe-  
riclymeni. 375

Meliloti.

292

Melissæ, Melissophylli.

222

N.

Nucis juglandis, Nucæ-  
menta, Juli. 351

Nym-



# Officina Simplicium.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nymphææ albæ.                | 314   |
| luteæ.                       | ibid. |
| O.                           |       |
| Origani.                     | 218   |
| P.                           |       |
| Papaveris albi.              | 275   |
| nigri.                       | 276   |
| rubri, erratici.             | 277   |
| Paralysis.                   | 309   |
| Pœoniæ.                      | 240   |
| Periclymeni, Caprifolii, Ma- |       |
| trifylvæ.                    | 375   |
| Perficæ.                     | ibid. |
| Primulæ veris.               | 309   |
| Prunellæ.                    | 220   |
| Prunellorum sylvestrium.     | 398   |
| R.                           |       |
| Rorismarini, Anthos.         | 211   |
| Rosæ albæ.                   | 347   |
| caninæ.                      | 373   |
| Damascenæ, pallidæ, ib.      |       |
| rubræ.                       | 374   |
| S.                           |       |
| Salviæ.                      | 209   |
| Sambuci.                     | 423   |
| Saxifragiæ albæ.             | 303   |
| Scabiosæ.                    | 170   |
| Siliginis, Secalis.          | 319   |
| Stœchadis Arabicæ.           | 211   |
| Citrinæ.                     | 152   |
| T.                           |       |
| Tamarisci.                   | 451   |
| Tanacetii.                   | 166   |
| Tapsi barbati.               | 311   |
| Tiliæ.                       | 445   |
| Tunica, Caryophylli horten-  |       |
| sis, Veronica rubræ.         | 298   |
| Tussilaginis, Farfaræ.       | 149   |

V.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Verbasci.                  | 311   |
| Violæ Martiæ.              | 304   |
| Vitici, Agni casti.        | 381   |
| Urticæ mortuæ, Lamii albi. | 221   |
| rubri.                     | ibid. |

X.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Xochinacaztlis Flos Au- |     |
| riculæ.                 | 459 |

## FRUCTUS.

A.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>A</b> grestæ.      | 425   |
| Alkekengi, Halicacabi |       |
| Baccæ.                | 245   |
| Amoris Poma.          | 244   |
| Amygdala dulcia.      | 393   |
| amara.                | ibid. |
| Anacardia Orient.     | 405   |
| Occid.                | 406   |
| Anthophylli.          | 377   |
| Aurantia mala.        | 437   |
| Avellane.             | 352   |

B.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Balanus myrepfica, Glans un- |     |
| guentaria.                   | 455 |
| Balsamina.                   | 236 |
| Berberis, Oxyacantha Gale-   |     |
| ni fructus.                  | 422 |

C.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Cacao.                       | 441   |
| Cappares.                    | 430   |
| Cassici filiquæ, Piper Indi- |       |
| cum.                         | 245   |
| Caricæ, Ficus arida, passæ.  | 362   |
| Cardamomum majus.            | 325   |
| minus.                       | ibid. |
|                              | grana |

# Officina Simplicium.

|                                   |       |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| <i>grana Paradysi.</i>            | ibid. | <i>Granata mala, mala punica.</i> | 370   |
| <i>Caroba.</i>                    | 463   | <i>Grossularia, uva crissa.</i>   | 374   |
| <i>Carpobalsamum.</i>             | 410   | <i>H.</i>                         |       |
| <i>Caryophylli.</i>               | 377   | <i>Hedera bacca,</i>              | 376   |
| <i>Cassia fistularis.</i>         | 457   | <i>Heliotropi tricoeci.</i>       | 127   |
| <i>Castaneæ.</i>                  | 352   | <i>Herba Paridis bacca.</i>       | 243   |
| <i>Cerasa nigra.</i>              | 403   | <i>J.</i>                         |       |
| <i>rubra.</i>                     | ibid. | <i>Juglandes.</i>                 | 351   |
| <i>Cicer album.</i>               | 289   | <i>Jujube.</i>                    | 401   |
| <i>nigrum.</i>                    | ibid. | <i>Juniperi bacca.</i>            | 360   |
| <i>rubrum.</i>                    | ibid. | <i>L.</i>                         |       |
| <i>Citria mala.</i>               | 436   | <i>Lauri bacca.</i>               | 444   |
| <i>Citrullus.</i>                 | 235   | <i>Limonia.</i>                   | 437   |
| <i>Coculus Indus.</i>             | 419   | <i>M.</i>                         |       |
| <i>Coffee.</i>                    | 445   | <i>Armeniacæ, præcocia.</i>       | 391   |
| <i>Colocynthis.</i>               | 234   | <i>Mala Aurantia.</i>             | 417   |
| <i>Corinthiaca passula.</i>       | 427   | <i>Citria.</i>                    | 436   |
| <i>Corna.</i>                     | 403   | <i>Cydonia, Cotonea.</i>          | 368   |
| <i>Cubebæ.</i>                    | 419   | <i>Granata, Punica.</i>           | 370   |
| <i>Cucumis hortensis.</i>         | 235   | <i>Limonia.</i>                   | 437   |
| <i>agrestis, aspinus.</i>         | 436   | <i>Mandragoræ.</i>                | 243   |
| <i>Cucurbita.</i>                 | 233   | <i>Persica.</i>                   | 391   |
| <i>Cynoshati fructus.</i>         | 373   | <i>Stramonium.</i>                | 258   |
| <i>Cupressi Coni.</i>             | 359   | <i>Vulgaria, poma hortensia.</i>  | 367   |
| <i>Cydonia.</i>                   | 368   | <i>Sylvestria.</i>                | 368   |
| <i>D.</i>                         |       | <i>Mecaxochitl.</i>               | 364   |
| <i>Dactylus.</i>                  | 346   | <i>Melones.</i>                   | 235   |
| <i>E.</i>                         |       | <i>Mespila.</i>                   | 369   |
| <i>Ebuli, Chamaæctes grana.</i>   | 423   | <i>Mora.</i>                      | 363   |
| <i>Euonymi.</i>                   | 428   | <i>Myrobalani Bellerice.</i>      | 399   |
| <i>F.</i>                         |       | <i>Chebula.</i>                   | 400   |
| <i>Ficus virides.</i>             | 362   | <i>Citrine, flava.</i>            | ibid. |
| <i>passæ, Carycæ.</i>             | ibid. | <i>Emblîcæ.</i>                   | ibid. |
| <i>Fraga.</i>                     | 229   | <i>Indæ, nigra.</i>               | 399   |
| <i>G.</i>                         |       | <i>Myrtilli, Myrti bacca.</i>     | 376   |
| <i>Galle communes.</i>            | 353   | <i>N.</i>                         |       |
| <i>Turcicæ.</i>                   | ibid. | <i>Nuces Aquaticæ, Tribuli</i>    |       |
| <i>Glandes quercinæ.</i>          | 353   | <i>aquatici-nuces.</i>            | 344   |
| <i>Glandium quercinorum cali-</i> |       | <i>Avel-</i>                      |       |
| <i>cule, cupule.</i>              | ibid. |                                   |       |

*Officina Simplicium.*

1757



# Officina Simplicium.

|                                   |       |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| <i>Avena.</i>                     | 342   | <i>D.</i>                         |       |
| <i>Aurantiorum</i>                | 437   | <i>Dactylorum ossa.</i>           | 346   |
| <i>B.</i>                         |       | <i>Datura.</i>                    | 258   |
| <i>Bamiae moschatae.</i>          | 306   | <i>Dauci nostratis.</i>           | 197   |
| <i>Bardana.</i>                   | 158   | <i>Cretici.</i>                   | ibid. |
| <i>Basilici, Ocimi.</i>           | 218   | <i>E.</i>                         |       |
| <i>Berberis, Oxyacantha Gal.</i>  | 422   | <i>Ebuli.</i>                     | 423   |
| <i>Bombacis.</i>                  | 305   | <i>Endiviae.</i>                  | 147   |
| <i>Brusci, Rusci.</i>             | 242   | <i>Erucæ.</i>                     | 268   |
| <i>C.</i>                         |       | <i>Erysimi.</i>                   | 269   |
| <i>Cannabis.</i>                  | 124   | <i>Ervi, Orobi.</i>               | 288   |
| <i>Cardamomi majoris.</i>         | 325   | <i>F.</i>                         |       |
| <i>minoris.</i>                   | ibid. | <i>Faba.</i>                      | 287   |
| <i>Cardui Benedicti.</i>          | 155   | <i>Feniculi vulgaris.</i>         | 196   |
| <i>Mariae.</i>                    | 156   | <i>dulcis.</i>                    | ibid. |
| <i>Carthami, Cnici.</i>           | 155   | <i>Fœnugræci.</i>                 | 293   |
| <i>Carui.</i>                     | 192   | <i>Fraxini, Lingue avis.</i>      | 448   |
| <i>Cataputiæ majoris, Ricini.</i> | 127   | <i>Fumariæ.</i>                   | 174   |
| <i>minoris, Lathyridis.</i>       | 278   | <i>G.</i>                         |       |
| <i>Caulium.</i>                   | 266   | <i>Genistæ.</i>                   | 461   |
| <i>Ceparum.</i>                   | 316   | <i>Grana Onidia, Thymeleæ</i>     |       |
| <i>Cerasorum nuclei</i>           | 403   | <i>grana.</i>                     | 415   |
| <i>Chæresolii.</i>                | 186   | <i>Grana Paradisi.</i>            | 327   |
| <i>Ciceris.</i>                   | 289   | <i>Grana Tiglia.</i>              | 128   |
| <i>Cichorii.</i>                  | 146   | <i>Granatorum.</i>                | 370   |
| <i>Cicutæ.</i>                    | 194   | <i>H.</i>                         |       |
| <i>Citrii.</i>                    | 436   | <i>Harmel, Ruta sylvestris.</i>   | 280   |
| <i>Citrulli.</i>                  | 235   | <i>Hippofelini, Smyrni.</i>       | 189   |
| <i>Cochleariæ hortensis.</i>      | 271   | <i>Hordeum.</i>                   | 340   |
| <i>Colocynthidos.</i>             | 234   | <i>Hormini sylvestris.</i>        | 219   |
| <i>Coriandri.</i>                 | 198   | <i>Hyoscyami albi.</i>            | 254   |
| <i>Crithmi.</i>                   | 195   | <i>Hyperici.</i>                  | 300   |
| <i>Cucumeris hortensis.</i>       | 235   | <i>Hyssopi.</i>                   | 212   |
| <i>sylvestris, Asinini.</i>       | 236   | <i>L.</i>                         |       |
| <i>Cucurbitæ.</i>                 | 233   | <i>Lactucæ.</i>                   | 143   |
| <i>Cydoniorum, Cotoneorum.</i>    | 368   | <i>Lapathi acuti, Oxylapathi.</i> | 132   |
| <i>Cymini.</i>                    | 187   | <i>Lathyridis, Cataputiæ mi-</i>  |       |
| <i>Cynosbati.</i>                 | 373   | <i>noris.</i>                     | 278   |
|                                   |       | <i>Laureolæ.</i>                  | 415   |

# Officina Simplicium.

|                                    |       |   |       |
|------------------------------------|-------|---|-------|
| <i>Lentes.</i>                     | 286   | <i>Macedonici.</i>                      | 198   |
| <i>Levisfici.</i>                  | 189   | <i>Pimpinella.</i>                      | 175   |
| <i>Limonum.</i>                    | 437   | <i>Pisa.</i>                            | 285   |
| <i>Linguae avis, Fraxini se-</i>   |       | <i>Plantaginis.</i>                     | 281   |
| <i>mine.</i>                       | 449   | <i>Paeonia.</i>                         | 249   |
| <i>Lini.</i>                       | 308   | <i>Porri.</i>                           | 317   |
| <i>Lithospermi, Milii Solis.</i>   | 206   | <i>Portulacae.</i>                      | 302   |
| <i>Lolii.</i>                      | 342   | <i>Psyllii.</i>                         | 282   |
| <i>Loti urbana, sativa.</i>        | 292   |   |       |
| <i>Lupini.</i>                     | 286   | <i>R.</i>                               |       |
| <i>M.</i>                          |       | <i>Rapi.</i>                            | 266   |
| <i>Magistrantia, Ostratii, Im-</i> |       | <i>Raphani, Radicula.</i>               | 267   |
| <i>peratoria.</i>                  | 188   | <i>Rhois obsoniorum, Samach.</i>        | 416   |
| <i>Majorana, Amaraci.</i>          | 217   | <i>Ricini, Cataputiae majoris.</i>      | 128   |
| <i>Malva.</i>                      | 227   |   |       |
| <i>Mandragora.</i>                 | 243   | <i>Rosarum Anthera.</i>                 | 374   |
| <i>Melonum, Melopeponum.</i>       |       | <i>Ruta hortensis,</i>                  | 280   |
|                                    | 235   | <i>sylvestris.</i>                      | ibid. |
| <i>Mespilorum.</i>                 | 369   | <i>S.</i>                               |       |
| <i>Mezerei.</i>                    | 415   | <i>Santonici, semen sanctum.</i>        | 168   |
| <i>Milii communis.</i>             | 342   | <i>Saxifragiae.</i>                     | 191   |
| <i>Solis, Lithospermi.</i>         | 206   | <i>Scariola, Seriola.</i>               | 147   |
| <i>N.</i>                          |       | <i>Secalis.</i>                         | 339   |
| <i>Napi dulcis, Buniadis.</i>      | 267   | <i>Sesami.</i>                          | 345   |
| <i>Nasturtii.</i>                  | 272   | <i>Seseleos vulgaris, Sileris</i>       |       |
| <i>Nigella, Gith.</i>              | 307   | <i>Montani.</i>                         | 190   |
| <i>Nuclei Cerasorum.</i>           | 403   | <i>Maffiliensis</i>                     | 181   |
| <i>mali Armeni.</i>                | 391   | <i>Cretici.</i>                         | 181   |
| <i>mali Persici.</i>               | ib.   | <i>Sinapios.</i>                        | 267   |
| <i>O.</i>                          |       | <i>Smyrni, Hippocelini.</i>             | 189   |
| <i>Ocimi citrati.</i>              | 218   | <i>Solani sativi.</i>                   | 244   |
| <i>caryophyllati.</i>              | ibid. | <i>Staphydis agriae.</i>                | 251   |
| <i>Oryza.</i>                      | 341   | <i>Samach, Rhois obsonio-</i>           |       |
| <i>P.</i>                          |       | <i>rum.</i>                             | 416   |
| <i>Panici.</i>                     | 341   | <i>T.</i>                               |       |
| <i>Papaveris albi.</i>             | 275   | <i>Thlaspior.</i>                       | 273   |
| <i>nigri.</i>                      | 286   | <i>Trifolii odorati.</i>                | 292   |
| <i>Pastinaca hortensis.</i>        | 180   | <i>Tritici, tum ejus farina vola-</i>   |       |
| <i>sylvestris.</i>                 | 179   | <i>tilis, fursur, &amp; ex eo para-</i> |       |
| <i>Perfoliata.</i>                 | 198   | <i>tum Amilum.</i>                      | 339   |
| <i>Petroselini vulgaris.</i>       | 193   |   | Tri-  |

# Officina Simplicium.

|                                |       |                                  |       |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| <i>Tritici Indici.</i>         | 341   | <i>Pinea.</i>                    | 356   |
| <i>V.</i>                      |       | <i>Strobilina.</i>               | ibid. |
| <i>Vicia.</i>                  | 286   | <i>Tacamabaca.</i>               | 393   |
| <i>Violarum.</i>               | 304   | <i>Terebinthina Cypria.</i>      | 411   |
| <i>Urtica vulgaris.</i>        | 125   | <i>Chio.</i>                     | ibid. |
| <i>Romana.</i>                 | ibid. | <i>Veneta.</i>                   | 358   |
| <i>Uvarum acini.</i>           | 424   | <i>Thus Masculum, Olibanum.</i>  | 472   |
| <i>Z.</i>                      |       |                                  | 356   |
| <i>Zea. Spelta.</i>            | 340   |                                  |       |
| <hr/>                          |       |                                  |       |
| <i>Gummi, Resinæ, Gum-</i>     |       | <i>Resina factitia Aloes.</i>    | 322   |
| <i>miresinæ, Balsama,</i>      |       | <i>Jalapa.</i>                   | 256   |
| <i>Succi Concreti.</i>         |       | <i>Guajaci.</i>                  | 392   |
| <i>Gummi Ammoniacum.</i>       | 184   | <i>Gutta Germanдра, Gutta</i>    |       |
| <i>Anima.</i>                  | 458   | <i>Jemou.</i>                    | 438   |
| <i>Arabicum.</i>               | 462   | <i>Mecboacanna.</i>              | 256   |
| <i>Asa foetida.</i>            | 185   | <i>Scammonii.</i>                | ibid. |
| <i>Cancanum.</i>               | 475   | <i>Turpethi.</i>                 | 257   |
| <i>Cerasorum.</i>              | 403   | <i>Pix Abietina.</i>             | 354   |
| <i>Elemi.</i>                  | 405   | <i>Burgundica.</i>               | 355   |
| <i>Galbanum.</i>               | 183   | <i>Cedria.</i>                   | 358   |
| <i>Hedera.</i>                 | 376   | <i>Laricea.</i>                  | ibid. |
| <i>Juniperi.</i>               | 360   | <i>Pinea.</i>                    | 356   |
| <i>Lacca.</i>                  | 402   | <i>Terebinthina</i>              | 358   |
| <i>Opopanax.</i>               | 180   |                                  |       |
| <i>Prunorum.</i>               | 398   | <i>Gummi - Resina, Bdellium.</i> | 474   |
| <i>Sagapenum.</i>              | 185   | <i>Benzoin.</i>                  | 395   |
| <i>Sanguis Draconis.</i>       | 418   | <i>Capbura , Camphora.</i>       | 388   |
| <i>Sarcocolla.</i>             | 465   |                                  | 412   |
| <i>Senica.</i>                 | 463   | <i>Mastiche.</i>                 | 434   |
| <i>Tragacanthum.</i>           | 291   | <i>Myrrha, Staete.</i>           | 382   |
|                                |       | <i>Styrax Calamita.</i>          |       |
| <i>Resina nativa Abietina.</i> | 354   |                                  |       |
| <i>Caranna.</i>                | 431   | <i>Balsamum Capivi.</i>          | 456   |
| <i>Colophonina.</i>            | 357   | <i>Judaicum, Gileadense.</i>     | 410   |
| <i>Copal.</i>                  | 416   | <i>Liquid-Ambar.</i>             | 365   |
| <i>Laricea.</i>                | 358   | <i>Mecha verum.</i>              | 410   |
| <i>Olibanum Thus Masculum.</i> | 472   | <i>Oleum Balsami, Balsa-</i>     | ibid. |
|                                |       | <i>melan.</i>                    | Opo-  |



# Officina Simplicium.

|                         |       |                           |       |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Opobalsamum.            | ibid. | Betula Lacryma.           | 339   |
| Peruvianum.             | 456   | C.                        |       |
| Tolutanum.              | 358   | Chermes, Grana tincturum. | 353   |
|                         |       |                           | 368   |
| Succi concreti, Acacia. | 462   | Cydoniarum.               | 368   |
| Achiottl.               | 457   | G.                        |       |
| Absinthij.              | 167   | Granatorum.               | 370   |
| Agerati, Eupatorii      | Me-   | L.                        |       |
| fues.                   | 166   | Limonum.                  | 437   |
| Elaterium.              | 136   | Lujula.                   | 312   |
| Catechu.                | 347   | O.                        |       |
| Euphorbium.             | 279   | Oleum Omphacinum,         | 404   |
| Glycyrrhizæ.            | 287   | completum, maturum re-    |       |
| Gutta Gamba, Gutta Je-  |       | cens.                     | ibid. |
| mon.                    | 418   | vetus.                    | ibid. |
| Hypocistis.             | 333   | R.                        |       |
| Opium.                  | 275   | Rosarum rubrarum.         | 374   |
| Indicum.                | 289   | damaſcenarum.             | 373   |
| Saccharum Album.        | 343   | V.                        |       |
| Rubrum.                 | ibid. | Vinum.                    | 424   |
| Crystallinum.           | ibid. | Vitis Lacryma.            | ibid. |
| Cantum, Candum album.   |       |                           |       |
|                         | ibid. |                           |       |
| rubrum.                 | 344   |                           |       |
| Viscus Aucupum.         | 411   |                           |       |
|                         | 428   |                           |       |

Succi Liquidi qui in  
rem præsentem fer-  
vari solent, tum  
Lacrymæ.

A.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>A</b> Cetum.         | 425 |
| Acetofitas Citrii, suc- |     |
| cus Citrii.             | 436 |
| Agresta, Omphacium.     | 425 |
| Aurantiorum.            | 437 |

B.

|             |     |
|-------------|-----|
| Berberorum. | 422 |
|-------------|-----|

## E Plantis Nata.

A.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>A</b> Garicus.    | 109   |
| Auriculæ Judæ, Fungi |       |
| Sambuci.             | ibid. |

C.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Calices glandium.    | 353   |
| Chermes grana.       | ibid. |
| Coccus baphica.      | ibid. |
| Cynosbati spongiolæ. | 373   |

E.

|            |     |
|------------|-----|
| Epithymum. | 382 |
|------------|-----|

G.

|        |     |
|--------|-----|
| Galla. | 353 |
|--------|-----|

M.

|         |     |
|---------|-----|
| Muscus. | 110 |
|---------|-----|

Qa

V.

# Officina Simplicium.

|                          |     |                                    |     |
|--------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| <i>V.</i>                |     | <i>Locusta.</i>                    | 488 |
| <i>Viscus Quercinus.</i> | 413 | <i>Lumbrici terrestres, Vermes</i> |     |
| <i>Uva Quercina.</i>     | 313 | <i>terrestres.</i>                 | 488 |

## A N I M A L I A.

|                                       |     |  |     |
|---------------------------------------|-----|--|-----|
| <i>A.</i>                             |     | <i>M.</i>                              |     |
| <i>A<sup>pes.</sup> Araneus.</i>      | 484 | <i>Millepedes, Aselli.</i>             | 483 |
| <i>Aselli, Millepedes, Onisci,</i>    |     | <i>Metacilla.</i>                      | 535 |
| <i>ibid.</i>                          |     | <i>Mus Araneus.</i>                    | 585 |
| <i>B.</i>                             |     | <i>Domesticus.</i>                     | 577 |
| <i>Bombyces.</i>                      | 488 | <i>Musca.</i>                          | 484 |
| <i>Bufones.</i>                       | 550 | <i>P.</i>                              |     |
| <i>C.</i>                             |     | <i>Pari.</i>                           | 535 |
| <i>Cancri fluviatiles.</i>            | 509 | <i>Passer vulgaris.</i>                | 536 |
| <i>Cantharides.</i>                   | 490 | <i>Troglodytes.</i>                    | 534 |
| <i>Catali.</i>                        | 581 | <i>Pediculi.</i>                       | 482 |
| <i>Cervus volans.</i>                 | 489 | <i>Pica.</i>                           | 537 |
| <i>Cicindela.</i>                     | 493 | <i>Proscarabai.</i>                    | 494 |
| <i>Cimex.</i>                         | 482 | <i>R.</i>                              |     |
| <i>Coccinilla, Cochinilla.</i>        | 491 | <i>Rana virides.</i>                   | 551 |
| <i>E.</i>                             |     | <i>Ricini.</i>                         | 482 |
| <i>Encrasicholi.</i>                  | 515 | <i>S.</i>                              |     |
| <i>Evinaceus.</i>                     | 584 | <i>Salamandra.</i>                     | 549 |
| <i>Eruca.</i>                         | 489 | <i>Scarabai.</i>                       | 490 |
| <i>F.</i>                             |     | <i>Scinci.</i>                         | 549 |
| <i>Formice.</i>                       | 487 | <i>Scorpiones terrestres.</i>          | 483 |
| <i>G.</i>                             |     | <i>T.</i>                              |     |
| <i>Galerita.</i>                      | 533 | <i>Talpa.</i>                          | 585 |
| <i>Grylli.</i>                        | 498 | <i>Testudines nemorales.</i>           | 550 |
| <i>H.</i>                             |     | <i>Tinca.</i>                          | 518 |
| <i>Halec.</i>                         | 514 | <i>V.</i>                              |     |
| <i>Hirundines, &amp; earum Pulli.</i> | 534 | <i>Vipera.</i>                         | 548 |
| <i>Hirudines, sanguisuga.</i>         | 481 | <i>Vulpes.</i>                         | 582 |
| <i>L.</i>                             |     |  |     |
| <i>Lacertus.</i>                      | 548 |  |     |
| <i>Limaces terrestres, Cochlea</i>    |     | <i>Animalium Partes, ex-</i>           |     |
| <i>terrestres.</i>                    | 498 | <i>crementa, aliáq; ab</i>             |     |
|                                       |     | <i>iis desumpta.</i>                   |     |
|                                       |     | <i>A.</i>                              |     |
|                                       |     | <i>A<sup>Deps.</sup> Axungia, Pin-</i> |     |
|                                       |     | <i>guedo Accipitris.</i>               | 545 |
|                                       |     | <i>a. atis.</i>                        | 532 |
|                                       |     | <i>Anseris</i>                         |     |

# Officina Simplicium.

|                                       |     |                                  |       |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|
| <i>Anseris.</i>                       | 531 | B.                               |       |
| <i>Anguille.</i>                      | 512 | <i>Bezoar occidentalis.</i>      | 567   |
| <i>Apri.</i>                          | 568 | <i>orientalis.</i>               | 564   |
| <i>Aquila Marina.</i>                 | 544 | <i>Botargum.</i>                 | 521   |
| <i>Ardez.</i>                         | 529 | <i>Butyrum insulsum.</i>         | 558   |
| <i>Aschie, Thymalli.</i>              | 520 | <i>salitum.</i>                  | ibid. |
| <i>Canis.</i>                         | 581 | C.                               |       |
| <i>Caponis.</i>                       | 539 | <i>Calculus è vesica humana.</i> | 587   |
| <i>Castoris.</i>                      | 575 |                                  |       |
| <i>Cati sylvestris.</i>               | 579 | <i>Caro viperina.</i>            | 548   |
| <i>Ceti.</i>                          | 526 | <i>Casus recens.</i>             | 558   |
| <i>Ciconia.</i>                       | 530 | <i>Castoreum.</i>                | 575   |
| <i>Coturnicis.</i>                    | 542 | <i>Caviarum.</i>                 | 515   |
| <i>Cuniculi.</i>                      | 575 | <i>Cera alba, virginea.</i>      | 485   |
| <i>Cygni.</i>                         | 531 | <i>flava.</i>                    | ib.   |
| <i>Equi.</i>                          | 555 | <i>Cerebrum Leporis.</i>         | 573   |
| <i>Erinacei.</i>                      | 584 | <i>Passerum.</i>                 | 556   |
| <i>Gallina.</i>                       | 539 | <i>Chela Cancrorum.</i>          | 509   |
| <i>Gruis.</i>                         | 529 | <i>Coagulum Agni.</i>            | 561   |
| <i>Hominis.</i>                       | 590 | <i>Equi.</i>                     | 555   |
| <i>Leonis.</i>                        | 578 | <i>Hædi.</i>                     | 562   |
| <i>Leporis.</i>                       | 573 | <i>Leporis.</i>                  | 573   |
| <i>Lucii.</i>                         | 517 | <i>Vituli.</i>                   | 558   |
| <i>Lupi.</i>                          | 580 | <i>Cor Bovinum.</i>              | ibid. |
| <i>Lutra.</i>                         | 584 | <i>Cervinum.</i>                 | 565   |
| <i>Muris montani.</i>                 | 576 | <i>Ispida.</i>                   | 533   |
| <i>Noctua.</i>                        | 546 | <i>Porcinum.</i>                 | 567   |
| <i>Pardi.</i>                         | 578 | <i>Vervecinum.</i>               | 561   |
| <i>Porci.</i>                         | 567 | <i>Cornu Alcis.</i>              | 567   |
| <i>Serpentis.</i>                     | 547 | <i>Bubali.</i>                   | 560   |
| <i>Taxi, Meli.</i>                    | 583 | <i>Cervi.</i>                    | 565   |
| <i>Trutta.</i>                        | 520 | <i>Rhinocerotis.</i>             | 569   |
| <i>Ursi.</i>                          | 579 | <i>Unicornu, Monocerotis.</i>    | 522   |
| <i>Vulpis.</i>                        | 582 |                                  |       |
| <i>Vulturis.</i>                      | 544 | <i>Cranium hominis violenta</i>  |       |
| <i>Album Gracum, stercus caninum.</i> | 581 | <i>morte extincti.</i>           | 590   |
| <i>Astragalus, Talus Leporis.</i>     | 573 | <i>Crista Galli.</i>             | 539   |
| <i>Suis.</i>                          | 568 | D.                               |       |
|                                       |     | <i>Dens Apri.</i>                | 568   |
|                                       |     | <i>Elephanti, Ebur.</i>          | 572   |
|                                       |     | Q q 2                            | Equi  |



# Officina Simplicium.

|                                  |              |                                    |              |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| <i>Equi marini.</i>              | <i>ibid.</i> | <i>è vesica humana.</i>            | 587          |
| <i>E.</i>                        |              | <i>M.</i>                          |              |
| <i>Ebur, Dens Elephanti.</i>     | 572          | <i>Mandibula Lucii.</i>            | 517          |
| <i>Exuvia serpentis, Spolium</i> |              | <i>Margarita, Uniones.</i>         | 506          |
| <i>serpentis.</i>                | 547          | <i>Medulla cruris Agni.</i>        | 560          |
| <i>F.</i>                        |              | <i>Bovis.</i>                      | 558          |
| <i>Fel Accipitris.</i>           | 545          | <i>Caprae.</i>                     | 562          |
| <i>Bovis.</i>                    | 558          | <i>Cervi.</i>                      | 565          |
| <i>Caprae.</i>                   | 562          | <i>Vituli.</i>                     | 658          |
| <i>Capreoli.</i>                 | 566          | <i>Mel commune.</i>                | 484          |
| <i>Fel Leporis.</i>              | 573          | <i>Virgineum.</i>                  | <i>ibid.</i> |
| <i>Milvi.</i>                    | 545          | <i>Moschus.</i>                    | 570          |
| <i>Suis.</i>                     | 568          | <i>Muria, Garum.</i>               | 515          |
| <i>Tauri.</i>                    | 558          | <i>Mumia.</i>                      | 590          |
| <i>Ursi.</i>                     | 579          | <i>N.</i>                          |              |
| <i>Folliculi Bombycum.</i>       | 488          | <i>Nidus Hirundinum.</i>           | 534          |
| <i>G.</i>                        |              | <i>O.</i>                          |              |
| <i>Garum, Muria.</i>             | 515          | <i>Oculi Cantorum.</i>             | 509          |
| <i>H.</i>                        |              | <i>Omentum Agni.</i>               | 560          |
| <i>Hepar Lupi.</i>               | 580          | <i>Arietis.</i>                    | 561          |
| <i>Mustele.</i>                  | 512          | <i>Vervecis.</i>                   | <i>ibid.</i> |
| <i>Ranarum.</i>                  | 551          | <i>Vituli.</i>                     | 558          |
| <i>I.</i>                        |              | <i>Ovi Gallinacei Albumen.</i>     | 540          |
| <i>Ichthyocola.</i>              | 516          | <i>Vitellus.</i>                   | <i>ibid.</i> |
| <i>Intestina Lupi.</i>           | 580          | <i>Testa.</i>                      | <i>ibid.</i> |
| <i>Vulpis.</i>                   | 582          | <i>Ova Struthionum.</i>            | 538          |
| <i>L.</i>                        |              | <i>Barborum.</i>                   | 519          |
| <i>Lac Asinae.</i>               | 556          | <i>Formicarum.</i>                 | 487          |
| <i>Caprae.</i>                   | 562          | <i>Os è Corde Cervi.</i>           | 565          |
| <i>Mulieris.</i>                 | 587          | <i>Cruris Bovis.</i>               | 558          |
| <i>Ovis.</i>                     | 560          | <i>Sepiae.</i>                     | 496          |
| <i>Vacca.</i>                    | 558          | <i>P.</i>                          |              |
| <i>Lapis Bezoar orientalis:</i>  | 564          | <i>Pellicula stomachi Gallinae</i> |              |
| <i>occidentalis.</i>             | 567          | <i>interiores.</i>                 | 540          |
| <i>è Capite Carpionum.</i>       | 518          | <i>Penna Upupa.</i>                | 537          |
| <i>Manat.</i>                    | 573          | <i>Pili Leporis.</i>               | 573          |
| <i>Asellorum.</i>                | 514          | <i>Pluma Perdicum.</i>             | 541          |
| <i>Percarum.</i>                 | 520          | <i>Propolis.</i>                   | 485          |
| <i>è felle Bovis.</i>            | 558          | <i>Priapus Cervi.</i>              | 565          |
|                                  |              | <i>Equi</i>                        |              |

# Officina Simplicium.

|                           |       |                          |         |
|---------------------------|-------|--------------------------|---------|
| Equi Marini.              | 572   | Hirundinum.              | 534     |
| Testudinis Marini.        | 550   | Hominis.                 | 587     |
| Tauri.                    | 558   | Murium.                  | 576     |
| Pulmo vulpis.             | 582   | Pavonis.                 | 541     |
| S.                        |       | Suis.                    | 568     |
| Oliva jejuni.             | 587   | Teredinis.               | 490     |
| Unguis Columbae.          | 542   | Vacca.                   | 558     |
| Corvi.                    | 536   | T.                       |         |
| Felis.                    | 579   | Talus , Astragalus Lepo- |         |
| Hirci.                    | 562   | rinus.                   | 573     |
| Leporis.                  | 573   | Suillus.                 | 568     |
| Perdici.                  | 541   | Testa Aranearum.         | 483     |
| Suis.                     | 568   | Testa Aquatiliū , Blatta |         |
| Tauri.                    | 558   | Byzantia.                | 500     |
| Taxi.                     | 583   | Buccinarum.              | 503     |
| Testudinis.               | 550   | Cancrorum.               | 509     |
| Secundina.                | 587   | Concharum.               | 508     |
| Mercurium.                | 489   | Cochlearum.              | 498     |
| Mercurium Lactis.         | 558   | Dentalium.               | 497     |
| Mercurium Bovinum.        | ibid. | Entalium.                | ibid.   |
| Bubalinum.                | 560   | Mater Perlarum.          | 506     |
| Cervinum.                 | 565   | Mytutorum.               | 507     |
| Caprinum.                 | 563   | Ostreorum.               | 505     |
| Hircinum.                 | 562   | Purpure.                 | 504     |
| Ovinum.                   | 560   | Sepiæ testa , Os sepiæ.  | 496     |
| Vaccinum.                 | 558   | Umbilicus marinus.       | 499     |
| Sperma Ceti.              | 525   | Unguis odoratus ,        | 507     |
| Splen Bovis.              | 558   | Testes Equi.             | 555     |
| Spolium Serpentis , Exu-  |       | Galli.                   | 540     |
| via Serpentis.            | 547   | U.                       |         |
| Stercus Anseris.          | 531   | Ungula Alcis.            | 567     |
| Canis , Album Græcum.     | 581   | Asini.                   | 556     |
| Capri.                    | 562   | Bovis.                   | 558     |
| Columbarum.               | 542   | Equi.                    | 555     |
| Cornicis.                 | 537   | Lyncis.                  | 578     |
| Cuculi.                   | 546   | Muli.                    | 557     |
| Equi non-castrati , Fimus |       | Urina Apri.              | 568     |
| equinus.                  | 555   | Capra.                   | 562     |
| Stercus Gallinae.         | 541   | Qq 3.                    | Hominis |

# Officina Simplicium.

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <i>Hominis Pueri impuberis.</i> |       |
| <i>adulti.</i>                  | 87    |
| <i>Uſnea cranii humani.</i>     | ibid. |
| <i>Z.</i>                       | 113   |
| <i>Zibethum.</i>                | 582   |

## M A R I N A.

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <i>A.</i>             |    |
| <b>A</b> mbra grisea. | 57 |
| Aqua marina.          | 41 |
| Arena maris.          | 82 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <i>B.</i>              |    |
| Bitumen Judaicum , Af. |    |
| phaltus.               | 54 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <i>C.</i>                |       |
| Carabe , Succinum album. |       |
|                          | 56    |
| flavum , citrinum.       | ibid. |
| nigrum , Gagates.        | 54    |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corallina.       | 107   |
| Corallium album. | ibid. |
| rubrum.          | ibid. |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <i>H.</i>              |    |
| Halcyonium , Spuma ma- |    |
| ris.                   | 58 |

|                |    |
|----------------|----|
| <i>L.</i>      |    |
| Lapis Spongiæ. | 82 |

|           |       |
|-----------|-------|
| <i>P.</i> |       |
| Pumex.    | ibid. |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <i>S.</i>          |     |
| Sal marinus.       | 41  |
| Spongia.           | 108 |
| Succinum , Carabe. | 56  |

## Mineralia , Terræ

### Officinales.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>T</b> erræ Medicamentosæ. |    |
| Ampelites.                   | 54 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Argilla.         | 44    |
| Eolus Armena.    | 43    |
| Bohemica.        | ibid. |
| Cimolia Candida. | 46    |
| Purpurascens.    | ibid. |
| Creta.           | 48    |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Creta præparata , Calx vi- |       |
| va.                        | ibid. |

|          |       |
|----------|-------|
| Exincta. | ibid. |
|----------|-------|

|         |    |
|---------|----|
| Gypsum. | 87 |
|---------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Japonica. | 347 |
|-----------|-----|

|         |    |
|---------|----|
| Lemnia. | 44 |
|---------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Melitea. | 49 |
|----------|----|

|        |    |
|--------|----|
| Ochra. | 45 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| Samia. | 47 |
|--------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Silefiaca. | 45 |
|------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tripolitana , Tripolis. |    |
|                         | 47 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rubrica Fabrilis. | ibid. |
|-------------------|-------|

## S A L E S.

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>S</b> AL Alumen Catinum. |     |
|                             | 139 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Plumeum , Plumosum , |    |
| Sciſſile.            | 85 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Rupeum , Rochi Gallis , |    |
| Officinarum.            | 63 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Zucarinum , Saccari- |    |
| num.                 | 62 |

|             |     |
|-------------|-----|
| Armoniacum. | 583 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Communis. | 59 |
|-----------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Chrysocolia factitia , |    |
| Santerna Plinii , Tin- |    |
| car , Borax.           | 63 |

|        |    |
|--------|----|
| Gemmæ. | 59 |
|--------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Marinus. | 41 |
|----------|----|

|         |    |
|---------|----|
| Nitrum. | 60 |
|---------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Tartarum. | 425 |
|-----------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Vitriolum Album. | 64 |
|------------------|----|


Cæru-



# Officina Simplicium.

|                             |       |                             |                        |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Cæruleum , Romalum.         | 64    | Buſonites, Lapis Buſonius.  | ſ13                    |
| Viride.                     | ibid. | Lapis Calaminaris.          | 83                     |
| Sulphurea Arſenicum Na-     |       | Calcarius.                  | 88                     |
| tivum Citrinum , Aure-      |       | Corallium Album.            | 107                    |
| um , Auripigmentum ,        |       | Nigrum.                     | ib.                    |
| Reſigallum.                 | ſ2    | Rubrum.                     | ib.                    |
| Rubrum , Sandaracha         |       | Granatus.                   | 96                     |
| Græcorum                    | ſ3    | Hæmatites.                  | 67                     |
| Factitium, Album Ciy-       |       | Heliotropium.               | 92                     |
| ſtallinum.                  | ſ2    | Hyacinthus.                 | 96                     |
| Rubrum.                     | ib.   | Jaspis.                     | 92                     |
| Bitumen , Ambra grifea.     |       | Judaicus Lapis.             | 90                     |
|                             | ſ7    | Lapis Lazuli.               | 84                     |
| Ampelites.                  | ſ3    | Lapis Lynceis , Belemnites. |                        |
| Asphaltos.                  | ſ4    |                             | 91                     |
| Naptha.                     | ſſ    | Magnes.                     | 66                     |
| Succinum Album.             | ſ6    | Margaritæ.                  | ſ06                    |
| Flavum , Citrinum.          | ib.   | Lapis Nephriticus.          | 93                     |
| Gagates.                    | ſ4    | Onyx.                       | 92                     |
| Oleum terræ.                | ſſ    | Opalus.                     | 98                     |
| Petroleum.                  | ib.   | Oſteocolla.                 | 83                     |
| Sulphur Nativum , Vi-       |       | Sapphirus.                  | 97                     |
| vum.                        | ſ1    | Sardus , Sârda, Carneolus.  |                        |
| Factitium , Caballinum.     |       |                             | 92                     |
|                             | ſ2    | Serpentinus , Ophites.      | 88                     |
| <hr/>                       |       | Smyris , Smerillus.         | 67                     |
| Lapides Pretioſi &          |       | Smaragdus.                  | 97                     |
| Medicamentofi.              |       | Lapis Specularis.           | 86                     |
| Ætites , Aquilæ lapis.      |       | Selenites.                  | ib.                    |
|                             | 89    | Topaſius, Chryſolithus.     | 98                     |
| Alabaſtrum , Alabaſtritis , |       | Chryſopaſius.               | ibid.                  |
|                             | 87    | Talcum.                     | 86                     |
| Amethiſtus.                 | 97    | <hr/>                       |                        |
| Amiantus.                   | 8ſ    | Metalla & Mineralia         |                        |
| Armenus Lapis.              | 8ſ    | Metallis affinia , & Re-    |                        |
| Aſteria Gemma.              | 98    | crementa Me-                |                        |
| Berillus.                   | 97    | tallica.                    |                        |
| Lezoar Occidentalis.        | ſ07   | M                           | Etalla, Aurum. ſ3 & 7ſ |
| Orientalis.                 | ſ64   |                             |                        |

Ar-



## Officina Simplicium.

|                             |       |                          |       |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Argentum.                   | 75    | Recrementum factitium.   |       |
| Æs.                         | 78    | Auri Lithargyrus.        | 71    |
| Cuprum.                     | 77    | Argentum.                | ibid. |
| Stannum.                    | 74    | Recrementum factitium.   |       |
| Plumbum.                    | 76    | Plumbi, Plumbago, Mo-    |       |
| Ferrum Nativum.             | 73    | lybdena, recrementum     |       |
| Ferrum Præparatum           |       | proveniens è purifica-   |       |
| aut factitium, Chalybs,     |       | tione auri & argenti     |       |
| ibid.                       |       | cum plumbo.              | 76    |
| Mineralia Metallis affinia, |       | Recrementum plumbi fa-   |       |
| Cinnabaris Nativa           | 68    | ctitium. E Cerussa,      |       |
| Factitia.                   | 69    | Sandix.                  | 77    |
| Mercurius, Hydargy-         |       | E plumbo calcinato,      |       |
| rus, Argentum vivum.        |       | Minium vulgare.          | ib.   |
|                             | 68    | Recrementum Æris facti-  |       |
| Antimonium.                 | 72    | tium, Diaphryges.        | 78    |
| Recrementa Metallica na-    |       | Pompholix.               | 79    |
| tiva, Cobaltum.             | 70    | Spodium.                 | ibid. |
| Chalcitis.                  | 71    | Cadmia, Tutia, Botrites. |       |
| Misy.                       | ibid. |                          | 78    |
| Sory.                       | ibid. | Ostracitris.             | 79    |
| Marcasita, Bismuthum.       |       | Placitis.                | ibid. |
|                             | 70    |                          |       |

FINIS



